# 游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用效果

郭　苗，江淼淼*

（郑州大学第五附属医院儿童康复科，河南　郑州　450052）

[摘　要] 目的：探讨游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用效果，为儿童语言障碍的康复提供新的治疗思路和方法。方法：选取 2023 年 8 月至 2024 年 6 月在郑州大学第五附属医院接受治疗的 100 例语言障碍患儿作为研究对象，随机分为对照组和观察组，每组各 50 例。对照组采用常规治疗，观察组在常规治疗的基础上加入游戏治疗。对比两组临床效果。结果：观察组临床疗效显著高于对照组（$P < 0.05$）。在语言发育水平评估中，观察组治疗后评分显著高于对照组（$P < 0.05$）。家长满意度调查显示，观察组总满意率为 96.00%，对照组为 80.00%，两组间比较差异显著（$P < 0.05$）。结论：游戏治疗在儿童语言障碍康复中展现出显著的应用效果，不仅能够有效提升患儿语言功能和发育水平，还能显著提高家长满意度，值得在临床实践中推广应用。

[关键词] 儿童语言障碍；游戏治疗；语言功能

DOI:10.16068/j.1000−1824.2025.07.005

[中图分类号] R729　　[文献标识码] A　　[文章编号] 1000-1824(2025)07-0017-04

# Analysis of the Application Effect of Play Therapy in the Rehabilitation of Children with Language Disorders

GUO Miao, JIANG Miaomiao*

(Department of Pediatric Rehabilitation, the Fifth Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China)

[Abstract] Objective: To explore the application effect of play therapy in the rehabilitation of children with language disorders and provide new therapeutic ideas and methods for their rehabilitation. Methods: A total of 100 children with language disorders treated at the Fifth Affiliated Hospital of Zhengzhou University from August 2023 to June 2024 were selected as the study subjects. They were randomly divided into a control group and an observation group, with 50 cases in each group. The control group received conventional therapy, while the observation group was treated with play therapy in addition to conventional therapy. The clinical effects of the two groups were compared. Results: The clinical efficacy of the observation group was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$). In the assessment of language development levels, the post-treatment scores of the observation group were significantly higher than those of the control group ($P < 0.05$). The parental satisfaction survey showed that the total satisfaction rate in the observation group was 96.00%, compared to 80.00% in the control group, with a significant difference between the two groups ($P < 0.05$). Conclusion: Play therapy demonstrates significant application effects in the rehabilitation of children with language disorders. It not only effectively improves children's language function and development levels but also significantly enhances parental satisfaction, making it worthy of promotion in clinical practice.

[Keywords] childhood language disorder; play therapy; language function

**项目名称：**河南省医学科技攻关计划项目（编号：LHGJ20210484）

**作者简介：**郭苗（1984—），女，汉族，河南郑州人，本科，主治医师，研究方向：儿童言语治疗

*** 通讯作者：**江淼淼（1979—），女，汉族，河南信阳人，本科，主管治疗师，研究方向：孤独症、智力低下、注意力缺陷、多动症



中国知网　https://www.cnki.net

儿童语言障碍是一种常见的发育障碍，表现为儿童在语言表达、理解或交流方面的困难。这种障碍不仅影响儿童语言发育，还可能对其社交、学习和情感发展产生负面影响。因此，寻找有效的康复治疗方法对于改善儿童语言障碍具有重要意义。近年来，游戏治疗作为一种新兴的治疗方法，因具有趣味性、互动性和创造性等特点，逐渐被应用于儿童语言障碍的康复治疗中。本研究旨在探讨游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用效果，以期为儿童语言障碍的康复提供新的治疗思路。

## 1　资料与方法

### 1.1　一般资料

选取 2023 年 8 月至 2024 年 6 月在郑州大学第五附属医院接受治疗的 100 例语言障碍患儿作为研究对象。将研究对象随机分为对照组和观察组，每组各 50 例。对照组中，男童 27 例，女童 23 例；平均年龄为（4.52 ± 0.43）岁；疾病类型包括表达性语言障碍 20 例，感受性语言障碍 15 例，混合性语言障碍 10 例，其他类型语言障碍 5 例。观察组中，男童 25 例，女童 25 例；平均年龄为（4.62 ± 0.34）岁；疾病类型包括表达性语言障碍 18 例，感受性语言障碍 16 例，混合性语言障碍 11 例，其他类型语言障碍 5 例。两组患儿在性别、年龄、疾病类型等一般资料方面相比差异不显著（$P > 0.05$），具有可比性。本研究已获得所有患儿家长或法定监护人的知情同意，并得到医院医学伦理委员会的批准。

纳入标准：（1）符合儿童语言障碍的诊断标准[1]；（2）年龄为 3 ～ 6 岁；（3）无其他严重疾病或并发症。

排除标准：（1）存在听力、视力等感官障碍；（2）存在严重智力障碍或孤独症等精神疾病。

### 1.2　方法

对照组：对本组患儿进行常规治疗，包括语言训练、认知训练等。其中语言训练由专业的语言治疗师进行，每周 3 次，每次训练时长为 45 min。训练内容侧重于语言表达、理解及交流能力的提升，包括词汇拓展、句子构造、对话练习以及语境理解等。认知训练结合患儿认知发展水平，每周 2 次，每次 60 min 的训练课程。训练内容涵盖注意力、记忆力、思维逻辑及问题解决能力等多个方面。采用图形识别、记忆游戏、排序任务及简单的问题解决任务等形式，旨在提升患儿认知加工能力和学习效率，间接促进其语言功能的恢复。

观察组：对本组患儿在进行常规治疗（方法与对照组相同）的基础上，进行游戏治疗。游戏治疗的具体方法是：（1）选择游戏类型。在游戏治疗过程中，高度重视患儿兴趣和年龄特征，以此为基础精心挑选适合的游戏类型。例如，对于喜欢模仿和表演的患儿，选择角色扮演游戏，如“小小医生”“超市购物”等，让其在游戏中扮演不同的角色，通过模仿成人的社交行为来锻炼语言表达能力。对于对图形和空间关系感兴趣的患儿，选择拼图游戏，如动物拼图、场景拼图等，让其在游戏中锻炼手眼协调能力和空间认知能力。对于喜欢音乐和对节奏较为敏感的患儿，可选择音乐游戏，如“音乐盒子”“节奏大师”等，通过音乐的节奏和旋律来刺激其听觉和语言发展。（2）融入语言元素。在游戏过程中，要融入语言元素，以促进患儿语言发展。在角色扮演游戏中，引导患儿模仿和练习语言表达，如对话、描述情感等。例如，在“小小医生”游戏中，教患儿如何说“你哪里不舒服”“我来帮你看看”等简单的医疗用语，并鼓励其与“病人”进行对话。在拼图游戏中，鼓励患儿描述图片的内容，如形状、颜色、场景等。在动物拼图游戏中，让患儿描述拼出的动物是什么、是什么颜色的、在哪里生活等。（3）社交互动。鼓励患儿在游戏中与他人进行互动和交流，以提升社交能力。在角色扮演游戏中，让患儿与同伴合作完成任务，如一起“治疗”病人、一起“购物”等，锻炼其语言表达能力，培养其合作精神和团队意识。在音乐游戏中，让患儿跟随节奏与他人一起跳舞或唱歌，通过音乐的节奏和旋律来促进与他人的互动和交流，以提高患儿社交能力，让其在游戏中感受到快乐和成就感。以上游戏治疗每周进行 5 次，每次游戏时间根据游戏类型有所不同，但总体保持在 20 ～ 30 min 之间，治疗周期设定为 3 个月，治疗过程中根据患儿进步和反馈进行适当调整。

### 1.3　观察指标

（1）临床疗效[2]。以语言发育迟缓检查法（S–S）作为主要评估工具。显效：患儿语言功能显著提升，S–S 评估结果较治疗前提高超过 1 个阶段；有效：患儿语言功能有所改善，且在 S–S 中有 2 个项目评估通过；无效：患儿语言功能未见提升，S–S 中项目评估通过数目少于 2 个。总有效率 = 显效率 + 有效率。（2）语言发育水平[3]。在两组治疗前、治疗后 1 个月、治疗后 3 个月，分别应用 Gesell 发育量表对患儿语言发育水平进行量化评估。该量表评分范围为 0 ～ 100 分，得分越高表示语言发育


中国知网　https://www.cnki.net

水平越高。（3）家长满意度。治疗后，通过问卷调查形式对患儿家长进行满意度调查，由家长亲自填写并给出反馈意见，随后收集数据进行对比分析。分为满意、一般满意、不满意 3 个选项，总满意率 =（满意例数 + 一般满意例数）/ 总例数 ×100%。

1.4 统计学方法

本研究采用 SPSS 26.0 软件处理数据。计量资料符合正态分布，用均数 ± 标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，行 $t$ 检验；计数资料以百分率（%）表示，行 $\chi^2$ 检验。$P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

## 2 结果

2.1 两组临床疗效对比

对照组中，显效 15 例，有效 20 例，无效 15 例，总有效率为 70.00%。观察组中，显效 30 例，有效 18 例，仅 2 例无效，总有效率为 96.00%。观察组临床疗效显著高于对照组（$P < 0.05$）。见表 1。

2.2 两组治疗前后语言发育水平对比

治疗前，两组语言发育水平相比，差异无统计学意义（$P > 0.05$）。治疗后，两组语言发育水平均显著提升，且观察组在治疗后 1 个月、3 个月评分均显著高于对照组（$P < 0.05$）。见表 2。

2.3 两组家长满意度对比

对照组中，满意 25 例，一般满意 15 例，不满意 10 例，总满意率为 80.00%；观察组中，满意 45 例，一般满意 3 例，不满意 2 例，总满意率为 96.00%。观察组总满意率明显高于对照组（$P < 0.05$）。

表 1　两组临床疗效对比 [$n$（%）]

| 组别 | 显效 | 有效 | 无效 | 总有效率 |
|---|---|---|---|---|
| 对照组（$n$=50） | 15（30.00） | 20（40.00） | 15（30.00） | 35（70.00） |
| 观察组（$n$=50） | 30（60.00） | 18（36.00） | 2（4.00） | 48（96.00） |
| $\chi^2$ 值 | | | | 10.365 |
| $P$ 值 | | | | < 0.05 |

表 2　两组治疗前后语言发育水平对比（分，$\bar{x} \pm s$）

| 组别 | 治疗前 | 治疗后 1 个月 | 治疗后 3 个月 |
|---|---|---|---|
| 对照组（$n$=50） | 50.22 ± 10.54 | 60.31 ± 9.85 | 65.43 ± 8.77 |
| 观察组（$n$=50） | 49.82 ± 10.23 | 70.52 ± 9.26 | 80.65 ± 7.53 |
| $t$ 值 | 0.693 | 9.665 | 12.631 |
| $P$ 值 | > 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |

## 3 讨论

游戏治疗作为一种以儿童为中心，强调通过游戏来促进其发展的治疗方法，近年来在儿童语言障碍康复中逐渐得到应用 [4]。核心理念在于，游戏不仅是儿童自然表达方式，也是学习和发展的主要途径。从神经科学角度看，游戏治疗通过神经可塑性机制促进儿童语言中枢的发育和功能 [5]。大脑语言相关脑区如布罗卡区和韦尼克区，在游戏过程中可能得到更强的连接和激活 [6]。游戏活动的多样性和复杂性要求儿童不断适应和学习，这种持续的学习刺激有助于增强神经元之间的连接，进而促进语言能力的提升 [7]。在心理学层面，游戏治疗通过提高儿童注意力分配能力、记忆编码和提取能力，促进思维灵活性，为语言学习创造了有利条件 [8]。例如，在角色扮演游戏中，儿童需要记住角色设定和对话内容，这锻炼了其记忆能力 [9]。同时，还需灵活应对游戏中的变化，要求具备较高的思维灵活性。这些认知过程的提升直接或间接地促进了儿童语言表达和理解能力的提升 [10]。从语言学角度来看，游戏治疗为儿童提供了丰富的语言实践机会，有助于其习得和运用语言规则。在游戏情境中，儿童通过模仿、对话和描述等活动，不断内化语法、词汇等语言规则，并将其自动化地运用到实际交流中 [11]。这种情境化的语言学习模式比单纯的语言训



中国知网　https://www.cnki.net

练更加生动、有趣，也更容易被儿童接受。

本研究中，观察组患儿在常规治疗的基础上接受了游戏治疗，结果显示在语言功能提升、语言发育水平以及家长满意度方面均显著优于对照组。这一结果充分说明了游戏治疗在儿童语言障碍康复中的积极作用。具体而言，观察组中显效病例数占比明显高于对照组，总有效率也显著提升，这表明游戏治疗能够更全面地促进儿童语言功能恢复。在语言发育水平方面，观察组治疗后 1 个月和 3 个月评分均显著高于对照组，说明游戏治疗不仅能在短期内改善儿童语言发育状况，还能长期持续促进其语言能力的提升。本研究结果还显示，观察组家长总满意率显著高于对照组。这一结果说明游戏治疗不仅得到了儿童喜爱和认可，还得到了家长广泛好评。家长作为儿童康复过程中的重要参与者，认可对于治疗方法的推广和应用具有重要意义。游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用前景广阔。

综上所述，游戏治疗在儿童语言障碍康复中展现出显著的应用效果，不仅能够有效提升患儿语言功能和发育水平，还能显著提高家长满意度，值得在临床实践中推广应用。

**参考文献**

[1] 刘雪曼 . 语言发育迟缓和语言障碍以及相关发育障碍性疾病的综合评估及鉴别诊断的临床思考框架 [J]. 中华儿科杂志 ,2021,59(11):901−904.

[2] 温雯 . 游戏治疗在儿童语言障碍康复中的应用 [J]. 中国听力语言康复科学杂志 ,2021,19(1):61−65.

[3] 王亚男 , 汪作朋 , 周红旗 , 等 . 体育游戏对自闭症谱系障碍幼儿群体语言能力的影响研究 [J]. 黑龙江医药科学 , 2023,46(2):97−98.

[4] 张平英 , 黄方 , 王丽 , 等 . 沙盘游戏结合康复训练对儿童语言迟缓的疗效分析 [J]. 安徽医药 ,2019,23(12):2432−2435.

[5] 滕春 . 象征性游戏测试在儿童语言发育异常临床评估中的价值分析 [J]. 中国农村卫生 ,2021,13(17):70−71+73.

[6] 翟豪强 , 刘亚迪 , 沈德新 . 游戏治疗在全面性发育迟缓儿童语言康复中的应用 [J]. 中国听力语言康复科学杂志 , 2021,19(6): 449−451.

[7] 梁亚丽 . 视听语言康复技术对语言发育迟缓儿童的影响 [J]. 中国城乡企业卫生 ,2025,40(8):106−108.

[8] 罗薇 , 史泱 , 张庆苏 . 国内儿童言语语言障碍治疗现状调查 [J]. 中国听力语言康复科学杂志 ,2024,22(4):397−401.

[9] 陈嘉颖 , 王玥 , 葛胜男 , 等 . 游戏式康复在儿童言语语言障碍中的研究进展 [J]. 中国听力语言康复科学杂志 , 2024,22(5):499−504.

[10] 李志林 , 刘振寰 , 何强勇 , 等 . 奥尔夫音乐游戏治疗对孤独症谱系障碍儿童语言与社交功能的影响 [J]. 中国妇幼健康研究 , 2025,36(2):23−31.

[11] 杨新芳 . 视听觉康复训练联合游戏治疗在语言障碍儿童中的应用效果 [J]. 临床医学 ,2024,44(11):84−86.



中国知网　https://www.cnki.net