单位代码 10635

学　　号 112018305020687

西南大學

专业学位硕士论文

特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究

论文作者：彭若婕

指导教师：李欢 副教授

专业学位类别：全日制教育硕士

专业领域：特殊教育

提交论文日期：2020 年 4 月 23 日

论文答辩日期：2020 年 5 月 31 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2020 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
Abstract.....III
第一章 绪论.....1
一、问题提出.....1
二、研究意义.....3
三、核心概念界定.....4
第二章 文献综述.....7
一、自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预的相关研究.....7
二、同伴支持的相关研究.....9
三、同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究.....14
四、已有研究述评.....23
第三章 研究设计.....25
一、研究目的.....25
二、研究场所及对象.....25
三、研究方法.....28
四、研究工具.....29
五、研究流程.....30
第四章 方案设计.....33
一、同伴培训方案.....33
二、同伴支持活动设计.....36
第五章 行动研究的实施.....45
一、第一轮行动研究.....45
二、第二轮行动研究.....48
三、第三轮行动研究.....52
四、第四轮行动研究.....56
五、第五轮行动研究.....60
第六章 研究结果分析.....63
一、行动研究概况.....63
二、各被试社交沟通障碍改善情况.....64
三、社交沟通障碍总体改善情况分析.....67
四、干预效果影响因素分析.....68
五、社会效度分析.....70

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 研究结论与建议.....73
一、研究结论.....73
二、研究建议.....75
三、研究局限.....79
参考文献.....81
附 录.....87
致 谢.....103

中国知网 https://www.cnki.net

特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究

特殊教育专业硕士研究生 彭若婕

指导老师 李欢 副教授

摘 要

社交沟通障碍一直被认定为是自闭症谱系障碍儿童的核心缺陷之一，严重妨碍其生活适应与人际交往。同伴支持，是经美国国家自闭症研究中心和自闭症国家专业发展中心等国际权威机构证实有效的自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法。当前，在国际上同伴支持已得到较为广泛的关注，但在我国特殊教育领域，鲜有研究在特殊教育学校的环境中探讨同伴支持策略。因此，本研究在特殊教育学校中培训三名特殊儿童同伴，以期通过特殊同伴的支持，采取游戏活动的方式，改善与之搭配的三名自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍。

首先，在同伴培训方案设计上，笔者依据国内外同伴支持相关研究中的培训要点，初步研制同伴培训内容。在同伴支持活动设计上，笔者参照培智学校义务课程标准、教材、学生兴趣、对一线教师发放自编问卷，确立同伴支持活动内容。

其次，本研究采取行动研究的方法，在研究实施过程中通过“计划——实施——观察——反思”如此循环反复的五轮行动研究。不断调整同伴培训内容、同伴支持活动材料、同伴支持活动环节，三组同伴分开进行十二次，共计三十六次同伴支持活动过后，最终发展出适宜于在特殊教育学校中开展的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的可行行动方案。笔者通过对每次活动各自闭症谱系障碍儿童社交发起、社交回应、同伴提示次数的分析，结合后续对家长、教师的访谈，经同伴支持过后，自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍得到了有效改善。

基于以上研究，笔者得出以下研究结论：第一，在特殊教育学校中实施的同伴支持能够有效改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍；第二，游戏活动为适合于同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的支持形式；第三，同伴培训使受训同伴的社交支持的能力提高；第四，同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的效果受自闭症谱系障碍儿童障碍程度、同伴积极性、同伴支持活动

中国知网 https://www.cnki.net

设计等多重因素影响。

基于研究结果，结合同伴支持在我国特殊教育学校中的研究现状，对在特殊教育学校中实施同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍进行了反思与建议。

关键词：同伴支持；自闭症谱系障碍；社交沟通障碍；行动研究

中国知网 https://www.cnki.net

The Action Research on the Peer-support to Improve Social Communication Disorder for Children with Autism Spectrum Disorders in Special Education Schools

Postgraduate of Special Education Major: Peng Ruojie

Directed by Prof: Li Huan

Abstract

Social communication disorder has been identified as one of the core defects of children with autism spectrum disorders(ASD), which seriously hinders their adjustment to life and interpersonal interaction. Peer Support is an effective intervention method for social communication disorders in children with autism spectrum disorders, which has been proved effective in the evidence-based practice reports on autism issued by the *National Autism Center* and the *National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders* and many other international authoritative institutions of autism. It emphasizes the training of ordinary children or special children with good social skills, the establishment of appropriate social patterns with autistic children as a partner, and the reinforcement of appropriate social behaviors of autistic children, so as to improve the social communication ability of autistic children. Currently, peer support has been paid more attention and studied in the international community, but in the field of special education in China, there are few empirical studies on the improvement of social communication disorders of autistic children by taking exceptional children as training partners in special education schools. Therefore, in this study, three special children were trained in special education schools in order to improve the social communication disorder of the three children with autism spectrum disorders through activities.

First of all, in the design of peer training program, the author supports the key points of training in the relevant research on peer support at home and abroad, and selects the higher frequency as the preliminary peer training content. In terms of the

中国知网 https://www.cnki.net

design of peer support activities, the author established the content of peer support activities by referring to the compulsory curriculum standards, teaching materials, students' interests of the school and issuing self-designed questionnaires to teachers.

Secondly, this study adopts the method of action research, and in the process of research implementation, it adopts five rounds of action research with the cycle of "planning – acting -- observing -- reflecting". The author continuously adjusted the content of peer training, materials and links of peer support activities, and the three groups were conducted 12 times separately. After 36 times of peer support activities, finally developed a feasible action plan suitable for the improvement of social communication disorders of children with ASD in special schools. By analyzing the frequency of social initiation, social response and peer prompt of each autistic child in each activity, and combining with the subsequent interviews with parents and teachers, the social communication disorder of children with autism spectrum disorder was effectively improved after peer support.

Based on the research, the author draws the conclusions: firstly, the implementation of peer support in special schools is effective in improving the social communication disorders of autistic children; Secondly, "video demonstration -- group teaching -- peer training -- peer trial teaching -- peer leadership (teacher assistance) -- peer self-assessment -- additional training" is a form of peer support activities suitable for improving social communication disorders of autistic children.;Thirdly, peer training improves the ability of trainees to assist autistic children in social communication; Fourthly, the effect of peer support on improving social communication disorders in autistic children is affected by multiple factors such as the degree of autism, peer's motivation, and the design of peer support activities.

Based on the research results and the current research status of peer support in China's special education schools, this paper reflects on and suggests the implementation of peer support in special education schools to improve the social communication disorders of autistic children.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Social Communication Disorders; peer support;Action research

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

一、问题提出

（一）自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍严重妨碍其日常生活

根据 2016 年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》，中国现有自闭症人数超过了 1000 万，并以每年十几万的速度增长[①]。自闭症人数的急剧攀升，引起了社会各界广泛关注。2013 年最新出版的《美国精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM-V）中指出自闭症谱系障碍的两大核心缺陷：社会沟通与交往障碍（social communication and interaction）及重复的刻板行为(restricted repetitive behaviors）[②]。2018 年，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）发布的《国际疾病分类（第十一版）》（ International Classification of Diseases，ICD-11）中也强调了社交沟通障碍是自闭症诊断的核心障碍[③]。由此可见，社交沟通障碍一直被认定为是自闭症谱系障碍的核心缺陷之一。由于沟通能力的缺乏，自闭症谱系障碍儿童常因无法使用有意义的口语适当表达目的、需求与想法，而出现独特、难解的说话方式，造成其缺乏使用功能性语言的能力。研究表明，如果早期对自闭症谱系障碍儿童进行干预，约有 75%-90%的自闭症谱系障碍儿童能发展出功能性语言，但 1/3-1/2 的自闭症谱系障碍患者永远无法发展出任何功能性语言[④]，而且也较少通过打手势及表情来表达自己的想法,他们往往缺乏与人主动沟通的意愿和兴趣,不愿主动与人交往[⑤]。社交沟通障碍严重妨碍了自闭症谱系障碍儿童学习、适应生活、融入社会等方面。然而，社交沟通却是自闭症谱系障碍儿童改善社交及人际互动重要的关键。虽然其口语发展受限，但仍有沟通的需求，不论有无口语能力者，皆需接受沟通训练，并且学习合理、适当且为社会所接纳之沟通方式，培养自闭症谱系障碍儿童使用多元化的沟通方式，有利于提高其沟通品质[④]。总而言之，自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍严重妨碍其日常生活，其社交沟通问题亟需关注。

（二）同伴支持能够改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍

[①]搜狐网.《中国自闭症教育康复行业发展状况报告II》蓝皮书发布专家建议:救助自闭症人群需要“生命全程”为视角[EB/OL]. (2016-12-17)[2017-12-8].http://www.sohu.com/a/121865793_529160.

[②]美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册[M].北京:北京大学出版社, 2016.

[③]WHO.ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (2018) [EB/OL]. (2018-06-18).

[④]陈墨.韦小满．自闭症儿童非语言沟通能力研究述评［J］.中国特殊教育 2013，（12）：36-14

[⑤]袁鹏.自闭症儿童主动沟通干预方法综述[J].开封教育学院学报,2017,37(06):182-183.

[④]齐红.图片交换沟通系统对一名无口语自闭症幼儿主动沟通行为的影响研究[A].中国心理卫生协会残疾人心理卫生分会第十二届年会暨中国残疾人康复协会精神残疾康复专业委员会第二届研讨会会议手册[C].,2018:9.

中国知网 https://www.cnki.net

2014 年，在美国自闭症国家专业发展中心（National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders ，NPDC）发布的第二版循证实践报告中，强调了同伴介入教学和干预（Peer-mediated Instruction & Intervention）改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的有效性。2015 年，美国国家自闭症研究中心（National Autism Center，NAC）出版的自闭症循证研究报告《国家标准化报告--阶段 2》提出同伴训练系列（Peer Training Package）是干预自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的有效方法，自闭症谱系障碍儿童难以和同伴适当互动，因此同伴训练系列培训可通过训练同伴在社交互动过程中发起和回应，从而促进自闭症谱系障碍儿童的社交沟通技能增长，该类方法已在学校和社区环境中使用[①]。该报告指出，同伴在与自闭症谱系障碍儿童互动过程中，能帮助后者通过自然环境中的社交和学习机会，学习新的行为，提升其社交沟通能力，通过成人系统地向同伴传授策略，促使同伴与自闭症谱系障碍儿童在活动中进行积极和广泛的社会互动[②]。由此可见，同伴支持可为学生提供及时、充足的反馈和平等的交往机会[③]。

同伴支持与成人主导的干预方法相比有以下优点：第一，同伴支持是一种经实证研究证明可以提高各年龄段自闭症谱系障碍儿童社交技能的策略[④]。第二，在学校环境中，同伴便于帮助自闭症谱系障碍儿童或实施干预。第三，同伴支持可以个性化，满足自闭症谱系障碍儿童的特定需求[⑤]。第四，在同伴交往过程中，同伴能够自然地影响彼此的行为。由于同伴会出现在学校各种情境中，能促进特殊儿童行为的改变，维持和泛化。同伴本身可以作为示范者，让特殊儿童记住其在干预过程中学到的适当行为[⑥]。第五，同伴可以有效地满足学生的需要，同时节省了教育资源，也使得教师有更多的时间用于教学。第六，经过同伴支持，自闭症

[①]National Autism Center . National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/.2015:43-70.

[②]National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders . Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf .2014:49-106.

[③]Fowler, S. A. (1988). The effects of peer-mediated interventions on establishing, maintaining and generalizing children's behavior changes. In R. H. Horner, G. Dunlap, & R. L. Koegel (Eds.), Generalization and maintenance (pp. 143–170). Baltimore, MD: Paul H. Brooks Publishing Co.

[④]郭丽莎. 普通小学随读自闭症儿童同伴介入的个案研究[D].四川师范大学,2015.

[⑤]Huber, H. B., & Carter, E. W. (2016). Data-driven individualization in peer-mediated interventions for students with ASD: A literature review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 3, 239–253.

[⑥]Chapin, S., Boyle, S., Babb, S., & McNaughton, D. (2018). Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Seminars in Speech and Language.

[③]Backer L D,Keer H V,Valcke M.Socially shared metacognitive regulation during reciprocal peer tutoring: identifying its relationship with students content processing and transactive discussions [J]. Instructional Science. 2015.43 (3):323-344.

[⑤]Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. A., Cox, A. W., Fettig, A., Kucharczyk, S., . . .Schultz, T. R. (2015). Evidencebased practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: A comprehensive review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 1951–1966.

[⑥]蒋婕,廖启云.我国残疾儿童教育现状探微[J].中国校外教育,2014(21):5+21.

中国知网 https://www.cnki.net

谱系障碍儿童不仅社交沟通技能有所提升，其在班级中地位也会有所提升。第七，使用同伴支持，也能够促进同伴在学业、认知、情感、社交等方面的进步[①]。

（三）特殊教育学校中的同伴支持策略有待探究

获得同伴的支持，能够很好地满足学生的社交需要、获得社会介入和安全感，同伴互动有利于儿童培养社会能力[②]。对于学生而言，学校是一个大的社交场所，在学校中，同伴资源非常丰富，并且容易获得，是一种良好的自然资源，具有重要意义和价值。培训同伴来帮助自闭症谱系障碍儿童，不仅是一种经证实有效的干预方法，同时还节约教育资源，除此之外，在实施同伴支持过程中，还能推动同伴与自闭症谱系障碍儿童共同学习进步[②]。根据第二次全国残疾人抽样调查结果：在我国残疾人口当中，学龄残疾儿童的人数共计 246 万，在特殊教育学校或普通学校接受义务教育的残疾儿童比例为 63. 19%。在这 63.19%接受教育的特殊儿童当中，仅有 54%的儿童在融合环境中接受教育，近一半的特殊儿童就读于特殊教育学校[③]。由此可见，在特殊教育学校就读的自闭症谱系障碍儿童数量众多，在特殊教育学校中重视同伴资源的利用对改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍同样重要。虽然国外已有特殊同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究。Shafer，Egel 和 Neef 训练五到八岁轻度智力障碍的儿童作为同伴，改善相仿年纪的自闭症谱系障碍儿童的社交互动能力。研究结果表明自闭症谱系障碍儿童能产生更多的社会性互动反应[④]。Odom 和 Strain 选择情绪行为障碍儿童作为同伴，支持自闭症谱系障碍儿童[⑤]，亦能提升自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力。但在我国特殊教育领域，尤其是在处于隔离环境中的特殊教育学校，其开设的各类课程，仍是教师处于主导地位，同伴资源未得到足够重视。因此，笔者尝试借鉴国际研究和实践的经验，在特殊教育学校实施同伴支持，利用特殊儿童同伴资源，来改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍，提升其社交沟通能力，帮助自闭症谱系障碍儿童积极适应生活。

二、研究意义

（一）理论意义

本研究将尝试探索出由特殊儿童执行的同伴支持，在特殊教育学校场所中，

[①]郭丽莎. 普通小学随读自闭症儿童同伴介入的个案研究[D].四川师范大学,2015.

[②]Huber, H. B., & Carter, E. W. (2016). Data-driven individualization in peer-mediated interventions for students with ASD: A literature review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 3, 239–253.

[③]蒋婕,廖启云.我国残疾儿童教育现状探微[J].中国校外教育,2014(21):5+21.

[④]阮蓝莹（2013）.同侪介入策略对增进国小高功能自闭症学生社会互动之研究。国立屏东教育大学特殊教育学系硕士班硕士论文，屏东县.

[⑤]Odom, S. L., & Strain, P. S. (1984). Peer-mediated approaches to increasing children's social interactions: a review. American Journal of Orthopsychiatry, 54, 544–557.

中国知网 https://www.cnki.net

培训特殊儿童同伴，利用特殊同伴来改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍，提升其社交沟通能力，从而扩展该领域的研究基础。

（二）实践意义

本研究通过在特殊教育学校实施同伴支持，以期提升自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力。同时，本研究尝试制定出初步的特殊同伴培训方案和特殊同伴支持方案，以期为一线教师提供经验以供参考。

三、核心概念界定

（一）同伴支持

同伴支持（Peer Support），也可以称之为同伴介入法（Peer-mediated Interventions，PMI），是由 Strain 和 Kerr 等学者在 1979 年发展起来的一种干预方法。它以行为主义心理学为理论基础，强调训练普通儿童或社交能力较好的特殊儿童，作为同伴与自闭症谱系障碍儿童建立恰当的社交模式、强化自闭症谱系障碍儿童合适的社交行为，从而提高其社交能力[①②③④⑤]，其中通过特殊儿童执行的同伴支持为特殊同伴支持。Odom 指出，同伴支持是由同伴参与技能教学，同伴可在其中扮演多种角色，包括对自闭症谱系障碍儿童提供适当行为的示范、发起互动、促进和强化目标行为的一种干预方法[⑤]。在以往研究中，证实了同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社交、学术和游戏技能的促进作用[⑥]。台湾学者钮文英指出，同伴支持是指在成人的监督与指导下邀请同伴胜任教学与中介者，给特殊需要儿童提供学业与社会性的支持，其中包括同伴网络、特殊朋友、朋友圈、合作学习、同伴伙伴、同伴分享策略、同伴监控策略、同伴示范策略、同伴调解策略、同伴教导策略等[⑦]。该方法发展至今，逐渐发展出多种变式，如角色扮演游戏、团体游戏、同伴交互指导、提供同伴互动机会等等，这些变式使得同伴支持变得更加科学和可操作。同伴为自闭症谱系障碍提供了与各种交流伙伴互动和实践技能的机

[①]田金来,张向葵.同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用[J].中国特殊教育,2014(01):35-40.

[②]Heather B H. Peer-mediated interventions to facilitate social interaction for children with autism[J]. American Psychological Association，Convention Presentation,2006

[③]Carla A D,Donald P O. Peer－mediated intervention to increase social interaction of children with autism. Focus on Autism and Other Disabilities,2002,174 (4) :198－207

[④]Choi，Serene H-J .Peer Training Methods for Children and Adolescents with Autism: A Review［J］. International Journal of Pedagogies ＆ Learning,2007（12）:92-100.

[⑤]农志学,胡晓毅.运用同伴介入法提升学龄孤独症儿童社交能力的研究[J].现代特殊教育,2017(04):32-37.

[⑤]Odom, S. L., & Strain, P. S.. Peer-mediated approaches to increasing children's social interactions: a review[J].American Journal of Orthopsychiatry,1984.54, 544–557.

[⑥]Bene, K., Banda, D. R., & Brown, D. . A meta-analysis of peer-mediated instructional arrangements and autism[J].Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014.1(2), 135–142. .

[⑦]钮文英.拥抱个别差异的新典范.融合教育[M]. 2008.

中国知网 https://www.cnki.net

会，增加了技能的泛化和维持的可能性[①]。

本研究中的特殊教育学校中的同伴支持，即特殊儿童执行的同伴支持，是指通过成人对就读于特殊教育学校的一部分特殊儿童进行相关社交沟通技能的培训，让他们作为同伴，为改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍提供帮助，即特殊儿童同伴在成人的指导与督促下，能够积极地回应以及引发自闭症谱系障碍儿童进行社会互动，此外，同伴还要能教导自闭症谱系障碍儿童社交沟通的策略，具体包括同伴培训和主题游戏活动两者的综合运用。

（二）自闭症谱系障碍

最早 Kanner 在 1943 年指出：自闭症是以社会关系和同一性需求未能得到发展为特征的疾病[②]。此后，在美国心理学会（APA）2013 年出版的《美国精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，简称 DSM-V）中，将原来的“广泛性发育障碍”（Pervasive Development Disorder，PDD）改为“自闭症谱系障碍”，并定义为：在儿童童年早期发病，以社会沟通与互动的持续性障碍和局限的、重复的行为模式、兴趣或活动为核心障碍的一系列神经系统发育障碍疾病。2018 年 6 月，世界卫生组织（WHO）出版了《国际疾病分类：精神和行为疾病分类》第 11 版（the International Classification of Diseases，ICD-11），将自闭症谱系障碍定义为以发起和维持社交互动能力出现持续性缺陷以及一系列受限制的、重复刻板的行为和兴趣模式为特征的神经发育障碍疾病[③]。

本研究中所指的自闭症谱系障碍儿童，指的是符合 DSM-V 诊断标准，同时经三甲医院鉴定，有明确诊断证明，被确诊为自闭症谱系障碍的儿童。

（三）社交沟通障碍

社交沟通障碍（Social communication disorders），也被称为社会交往障碍。1943 年，Kanner 描述了 11 名“幼儿自闭症患者”的特征，其中包括“缄默或语言显著异常”和“严重缺乏与他人的情感接触”[④]。随着学界对自闭症谱系障碍进行了广泛而深入的研究，社交沟通障碍（Social communication disorder）普遍被视为自闭症谱系障碍群体的核心障碍之一。

2013 年，DSM-V 中指出，社交沟通障碍指的是个体在使用口语及非口语沟通中所表现出来的持续性困难，而自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍是指在多个情境中，自闭症谱系障碍儿童在社会互动与社交沟通方面存在持续性缺陷，它

[①]Watkins, L., O’Reilly, M., Kuhn, M., Gevarter, C., Lancioni, G. E., Sigafoos, J., & Lang, R.. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings[J].Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015.45, 1070–1083.

[②]Kanner L.Autistic disturbances of affective contact][J].Nervous Child, 1943(2):217-250.

[③]WHO.ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics [EB/OL]. (2018-06-18) [2018-12-17]. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624.

[④]李瑞锡,江开达,彭裕.孤独症研究新进展 [J].复旦学报(医学版),2010,37(1):110-115.

中国知网 https://www.cnki.net

包括在社会互动中存在非口语沟通缺陷、社会情感互动缺陷、以及发展、维持与理解人际关系存在缺陷这三种症状：（1）在社会互动中存在着非口语沟通缺陷。例如：难以整合口语和非口语的沟通；目光接触及肢体语言异常，理解及使用手势有困难，完全缺乏面部表情及非口语沟通。（2）社会情感互动存在缺陷。例如：维持双向会话困难以及社会性互动异常；甚少分享情感、情绪或兴趣；无法主动发起或是回应社会性互动。（3）发展、维持和理解人际关系存在缺陷。例如：无法做出符合不同社交情境的适当行为，交朋友以及进行分享想象性游戏困难，对同伴缺乏兴趣[①]。2018 年，ICD-11 指出自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍是发起和维持社交互动能力出现持续性缺陷[②]。

综合 DSM-V 以及 ICD-11 对社交沟通障碍的描述，可以得知，自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍主要包括社会互动、沟通能力两大方面的缺陷，表现为主动发起与回应社会性互动异常、缺乏面部表情、目光接触困难、分享情绪或兴趣异常等。其中，社会互动（social interaction）指的是由交流的主动发起行为（initiations）以及回应行为（responses）所引起的持续性互相交流的社会行为。其中，交流的主动发起行为指的是明确地指向他人，并且试图引起对方社会反应的语言或动作行为（例如：帮助、分享、触摸），而回应行为则被认为是出现在主动发起行为过后，3 秒内开始的语言或动作行为[③]。沟通能力（communication）指的是人与人之间进行感情、消息、思想、行为、态度等信息的交流过程[④]。形式上来看，沟通能力涵盖了口语沟通以及非口语沟通这两种能力，口语沟通以语言为载体，它是人类最直接简单和最常见的沟通形式；而非口语沟通则是通过除了语言之外的符号所进行，包括了眼神、手部动作、面部表情、语调、时空运用，以及气味等符号[⑤]。

因此，本研究参照了《美国精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（DSM-V）对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的定义，即社交沟通障碍指的是自闭症谱系障碍儿童在多种情境中，在社会互动与社交沟通方面存在着持续性缺陷，包括社会互动、沟通能力两个方面。

[①]America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Arlington,VA:American Psychiatric Publishing.2013:47.

[②]WHO.ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. (2018-06-18) [2018-12-17]. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624.

[③]Kamps, Debra M, Barbetta, Patricia M, Leonard, Betsy R, Delquadri, Joseph. Classwide peer tutoring: An integration strategy to improve reading skills and promote peer interactions among students with autism and general education peers[J].Journal of Applied Behavior Analysis,1994,27(1):49-61.

[④]王国元.组织行为管理[M].北京:华夏出版社.2016:298.

[⑤]陈墨,韦小满.自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育,2013(12):36-42.

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 文献综述

一、自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预的相关研究

（一）自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力的评估工具

国内外学者设计了多种关于自闭症谱系障碍儿童的社交沟通的量表。常用于自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力评估的量表主要有社交反应量表(Social Responsive Scale, SRS)[①]、社交沟通量表(Social Communication Questionnaire, SCQ)[②]。我国台湾地区由张正芬编制的《自闭症儿童基本沟通行为量表》，对自闭症谱系障碍儿童从要求行为、拒绝行为、引人注意等六个方面进行评估。台湾学者杨宗仁编制了《自闭症儿童社会与沟通技能评量表》，此量表也可以用来评量自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力[③]。此外，由香港医学会于 2005 年 7 月出版的《自闭症儿童社交及沟通行为量表》，也可用于全面了解自闭症谱系障碍儿童的社交及沟通能力[④]。

（二）自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法

作为自闭症谱系障碍群体核心障碍之一的社交沟通障碍，针对提升自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力的研究较多，下面就主要从美国自闭症国家专业发展中心（National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders ，NPDC）与美国国家自闭症研究中心（National Autism Center， NAC）两大自闭症权威研究机构的循证报告中的社交沟通障碍干预方法进行分析，如表 2.1 所示。

表 2.1NAC 和 NPDC 第二版循证实践报告中有效的自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预方法汇总表

NAC 的干预方法（第二版）[⑤]	NPDC 的干预方法（第二版）[⑥]
同伴训练系列 （Peer Training Package）	同伴介入教学和干预 （Peer-mediated Instruction & Intervention）
自然情境教学策略	以前事控制为基础的干预

[①]Stickley A, Tachibana Y, Hashimoto K, et al.Assessment of autistic traits in children aged 2 to 4½years with the preschool version of the Social Responsiveness Scale (SRS-P) :findings from Japan[J].Autism Res, 2017, 10 (5) :852-865.

[②]Chesnut SR, Wei T, Barnard-Brak L, et al.A meta-analysis of the social communication questionnaire: screening for autism spectrum disorder[J].Autism, 2017, 21 (8) :920-928.

[③]杨宗仁.做、看、听、说:自闭症儿童社会与沟通技能介入手册[M].台北:心理.2010.

[④]樊江琴. PRT 动机程序促进自闭症儿童社交发起的成效检验及成分分析[D].浙江师范大学,2016.

[⑤]National Autism Center.National standards Project-Phase2[R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/.2015:43-70.

[⑥]National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder [R/OL].http://autismpdc.fpg. unc.edu/sites/ autism pdc. fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf .2014:49-106.

中国知网 https://www.cnki.net

（Natural Teaching Strategies）
行为干预方法
（Behavioral Interventions）
示范
（Modeling）
语言训练
（Language Training）
脚本
（Scripting）
核心反应训练
（Pivotal Response Training）
幼儿综合行为疗法
(Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children）
家长训练系列
（Parent Training Package）
自我管理
（Self-management）
认知行为干预系列
（Cognitive Behavioral Interventions）
基于故事的干预
（Story-based Intervention）
社交技能系列
（Social Skills Package）
图片交换系统
（Picture Exchange Communication System）

（Antecedent-Based Intervention）
录像示范
（Video Modeling）
视觉介入
（Visual Supports）
延迟法
（Time Delay）
消退
（Extinction）
功能性行为分析
（Functional Behavior Assessment）
离散单元训练
（Discrete Trial Training）
认知行为干预
（Cognitive Behavioral Intervention）
功能性沟通训练
（Functional Communication Training）
差别强化
（Differential Reinforcement）
家长实施的干预
（Parent Implemented Intervention）
自然干预
（Naturalistic Intervention）
核心反应训练
（Pivotal Response Training）
反应中断及转移
（Response Interruption/Redirection）
提示
（Prompting）
强化
（Reinforcement）
脚本
（Scripting）
社会故事
（Social Narratives）
自我管理
（Self-management）
结构化游戏小组教学
（Structured Play Groups）
社交技巧训练
（Social Skills Training）
任务分析
（Task Analysis）

中国知网 https://www.cnki.net

	技术辅助教学和干预（Technology-aided Instruction & Intervention）

可以看出，NAC 中的干预方法多为综合干预，即多种方法综合运用；NPDC 中的干预方法多为专项干预，也就是单独使用某一种方法进行干预。改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法多种多样，已得到国际学者的广泛关注，干预方法也日趋丰富。此外，由上表可知，NAC 跟 NPDC 的循证报告都证明了同伴支持对改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的有效性。

NAC 中的同伴培训系列强调，成人通过培训同伴怎样跟自闭症谱系障碍儿童发起交往和回应，来促进自闭症谱系障碍儿童社交沟通技能的增长。对于 3-14 岁的自闭症谱系障碍儿童，同伴培训能够提高自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力及游戏技能，改善人际关系，减少其重复行为，改变兴趣单一的状况。NAC 循证报告指出，设计一个同伴培训方案时需要考虑以下因素：（1）自闭症谱系障碍儿童和同伴的年龄要相近，要选择有良好社交技能，出勤率高，乐于参与，有能力模仿示范者的同伴；（2）教学中的活动应符合两组儿童的兴趣爱好，以确保有充足动力；（3）教导同伴怎样获得自闭症谱系障碍儿童重视，如何分享，如何提供帮助，如何示范适当的游戏技能，并帮助组织游戏活动；（4）经过同伴培训后，让同伴和自闭症谱系障碍儿童在结构化游戏情境中进行互动；（5）指导者应使用提示和反馈来促进互动；（6）在多种情境中与同伴进行练习，让儿童尽可能多的使用技能；（7）同伴训练系列包括：LEAP 项目、同伴网络、朋友圈、整合性游戏团体、同伴发起训练、同伴间的社交互动训练[①]。

二、同伴支持的相关研究

（一）同伴的类型

同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍相关研究中，同伴的选择可以是多样化的,关于同伴类型，既可以选择普通儿童，也可以选择特殊儿童。可以培训自闭症谱系障碍儿童的兄弟姐妹成为支持同伴,也可以由同班同学或跨班跨年级同学担任同伴。

1、普通儿童作为同伴

Vogt K L 的研究表明，在融合环境当中，干预学龄前的自闭症谱系障碍儿童语言行为，由发育正常的同伴担任支持者，经干预过后，被试的非口语有所增加，

[①]National Autism Center. National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/.2015:43-70.

中国知网 https://www.cnki.net

除此之外,被试的口语行为，在命名、要求、对话方面也有增加[①]。Wood 也以普通儿童作为同伴来干预学龄前自闭症谱系障碍儿童的音位分割流畅性，实施同伴支持过后，四名被试当中，有三名被试的音位分割流畅性明显提升[②]。孙美丽通过整合性游戏团体，对一名学龄前自闭症谱系障碍儿童的社会互动进行干预，以普通儿童作为同伴，结果也表明整合性游戏团体能对自闭症谱系障碍儿童的社交发起、社交回应以及社交维持三种互动行为都具促进作用[③]。

2、特殊儿童作为同伴

Egel，Shafer 和 Neef 训练五到八岁轻度智力障碍的儿童作为同伴，改善年龄相仿的自闭症谱系障碍儿童的社交互动能力。研究结果表明自闭症谱系障碍儿童产生更多的社会性互动反应[④]。Odom 和 Strain 选择情绪行为障碍儿童作为同伴，支持自闭症谱系障碍儿童[⑤]，亦能提升其社交沟通能力。Chapin 等人指出，训练同样患有自闭症谱系障碍的同伴干预另一名自闭症谱系障碍儿童社交沟通，对后者会产生显著影响；训练患有典型发育性障碍的儿童作为同伴干预自闭症社交沟通，也能产生积极影响[⑥]。

（二）同伴支持的形式

关于同伴支持的形式，暂无统一规定，通常来说，研究者应根据研究对象以及研究设计情况来安排与之适应的同伴支持的形式。Odom 和 Strain 的研究中提出了同伴支持的四种形式:强化提示型、接近型、主动发起型以及混合型。强化提示型指的是培训同伴运用强化与提示等技能，让同伴在互动过程中提示自闭症谱系障碍儿童表现正确的行为，且对自闭症谱系障碍儿童适宜的社交行为进行强化。接近型指的是让同伴与自闭症谱系障碍儿童进行自由的社交互动，研究者并不对同伴进行社交沟通技巧等方面的培训。主动发起型指的是培训同伴主动发起以及维持等社交沟通策略，使同伴使用相应策略与被试互动。Shivers 在对由自闭症谱系障碍儿童兄弟姐妹实施的同伴支持研究进行综述时，将其兄弟姐妹的角色分成干预的支持者与干预的共同接受者，其中又进一步将干预的支持者分成指导者和榜样。其中指导者指的是自闭症谱系障碍儿童的兄弟姐妹学习，并且能够使用行为矫正技术或其他特定方法来提升被试的目标技能。而兄弟姐妹在这个过程中发

[①]Vogt K L. The effect of reciprocal peer tutoring tact instruction with a yoked contingency on vocal verbal operants in a play setting[J]. Dissertations & Theses - Gradworks,2009.

[②]Wood C L, Mustian A L, Lo Y Y. Effects of Supplemental Computer-Assisted Reciprocal Peer Tutoring on Kindergarteners' Phoneme Segmentation Fluency[J]. Education & Treatment of Children,2013,36(1):33-48.

[③]孙美丽，整合性游戏团体对提高自闭症儿童社会互动能力的个案研究[D].重庆:重庆师范大学,2011.

[④]阮蓝莹.同侪介入策略对增进国小高功能自闭症学生社会互动之研究[D].国立屏东教育大学特殊教育学系硕士班硕士论文,屏东县.2013.

[⑤]Odom, S. L., & Strain, P. S.. Peer-mediated approaches to increasing children's social interactions: a review. American Journal of Orthopsychiatry, 1984.54, 544–557.

[⑥]Chapin, Shelley; McNaughton, David; Boyle, Susannah; et al. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review.2018;11:443-457

中国知网 https://www.cnki.net

挥了榜样者作用，学习目标行为是为了给被试做正确示范。

学者 Disalvo 和 Oswald 将同伴支持的形式划分为三个维度[①]，总结如下：

1、情境安排

成人安排情境以及活动，促进同伴与自闭症谱系障碍儿童互动，有三种形式：（1）团队关联（Group-Oriented Contingency）。团队关联要求整个班的学生学习某一特定的行为，促使该行为出现，从而影响自闭症谱系障碍儿童的行为，团队关联便于教师集体管理。(2)同伴小老师与同伴辅导(Peer Buddy and Peer Tutoring)。同伴小老师指的是培训同伴当小老师，与自闭症谱系障碍儿童结对子，交流玩耍。同伴辅导则是由能力低者作为被辅导者，能力高者作为辅导者，以自然互动来帮助自闭症谱系障碍儿童习得社会行为。(3)整合性游戏团体(Integrated Play Groups)。整合性游戏团体是由研究者提供结构化情境，引导同伴与自闭症谱系障碍儿童游戏互动。该方法的优点在于提供了支持性环境去优化互动，而不是由成人直接指导。整合性游戏团体的主要构成包括：大小合适的空间、自然的整合场所、促进互动的材料。

2、教导同伴与自闭症谱系障碍儿童互动的技能

成人教导同伴与自闭症谱系障碍儿童进行互动的技能并及时强化，来促进同伴与自闭症谱系障碍儿童互动，有三种形式：(1)关键反应训练（Pivotal Response Training，PRT），PRT 是整合自闭症谱系障碍儿童在较少控制或自然环境中的喜好，增加其社会行为。研究者可以通过角色扮演来教导同伴如何强化自闭症谱系障碍儿童的行为，它包括：引起注意、提供选择、示范、增加尝试机会、等待轮流、扩充对话、教导对多重线索的反映等。(2)同伴网络（Peer Networks）。又叫做朋友圈(circle of friends)，它是为自闭症谱系障碍儿童提供一个有社交能力的同伴组成的支持系统[②]。 同伴网络活动包括训练同伴的辅助性沟通技巧社交技能指令（如：发起和回应对话、交流想法、发指令）。其方式是全部同伴或轮流在固定时间和自闭症谱系障碍儿童见面，同伴、自闭症学生、教师要保证每周至少碰面一次，讨论本周团体发生的事情、解决问题、 提供建议或支持。(3)同伴引发训练（Peer Initiation Training），也被称之为同伴发起训练、同伴主动训练等，即培训同伴主动和自闭症谱系障碍儿童进行互动，主要教导同伴唤起以及维持与自闭症谱系障碍儿童进行互动所需要的技能，使后者能有适当回应，参与更多互动。同伴引发训练的内容应包含：如何引起自闭症谱系障碍儿童的注意、分享提议与

[①]Carla A.Disalvo and Donald P.Oswald.Peer-mediated Interventions to Increase the Social Interaction of Children with Autism:Consideration of Peer Expectancies[J].Focus Autism Other Disable,2002,17:198-206

[②]Sperry,L., Neitzel, J. & Wells, K. E.Peer-Mediated Instruction and Intervention Strategies for Students with [J].Autism Spectrum Disorders,2010.54(4),256-264.

中国知网 https://www.cnki.net

要求、适当进行鼓励与赞美等。Wilkerson 还提到同伴引发训练的原则包括：①同伴学生必须了解主动对话的主题；②在同伴互动的过程中，要采取同伴之间惯用的对话与互动方式；③鼓励伴同伴学生多运用提问技巧，引导对话的内容与长度；④提醒同伴学生避免做出影响对话质量的行为，如：沉默或打断他人对话[①]。

3、教导自闭症谱系障碍儿童与同伴互动的技巧

成人教导自闭症谱系障碍儿童与同伴互动的技巧，可通过以下两种方式进行：（1）培训自闭症谱系障碍儿童；（2）同时培训自闭症谱系障碍儿童和同伴。

（三）同伴选取标准

在同伴支持策略中，同伴是最为关键的干预实施者，因此对同伴的选择应有一定的标准，不同学者对此进行了不同的规定。如 Katz 和 Girolametto 认为同伴需要满足的条件：（1）教师提名；（2）较好的语言表达跟理解能力；（3）与自闭症谱系障碍儿童同班级；（4）有意愿与自闭症谱系障碍儿童交往[②]。Thiemann-Bourque 等人认为同伴应满足条件：（1）教师提名；（2）基本不缺勤；（3）具备与年龄适宜的社交技能；（4）注意力集中，在平时课堂上能够听讲 20min 以上[③]。Lee 等人认为同伴需满足条件：（1）与自闭症谱系障碍儿童未起过冲突，关系良好；（2）出勤率高；（3）在校表现良好；（4）具备与年龄匹配的社交技能[④]。Bellini 和 Hundert 等学者则认为同伴应该是与被试同班级正常发育的同伴[⑤⑥]。

通过对相关文献进行梳理后发现，同伴选取的标准应该满足的基本条件有：（1）由教师提名；（2）出勤率高；（3）与自闭症谱系障碍儿童同班级；（4）有良好的语言表达跟理解能力；（5）在校表现良好；（6）与自闭症谱系障碍儿童关系良好；（7）注意力较集中。

（四）同伴支持流程

学者 Neitzel 针对幼儿和小学、初高中学校的自闭症学生，设计出同伴支持策

[①]曾欣怡.同侪中介教学与介入策略对高职普通班听觉障碍学生人际关系成效之研究[D].国立高雄师范大学特殊教育研究所硕士论文,未出版,高雄.2009.

[②]Katz, E., & Girolametto, L.Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early chil dhood education settings[J].Topics in Early Childhood Special Education,33(3), 133–143.

[③]Thiemann-Bourque, K. S., McGuff, S., & Goldstein, H.Trainingpeer partnerstouse a speech–generatingdevice withclassmates with autism spectrum disorder: exploring commnication outcomesacrosspreschoolcontexts[J].Jo urnalofSpeech,Language,and Hearing Research,2017.60(9), 2648–2662.

[④]Lee, S. H., & Lee, L. W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian presc hool[J].Topics in Early Childhood Special Education,2015.35(2), 89–101.

[⑤]Hundert, J., Rowe, S. R., & Harrison, E.. The combined effects of social script training and peer buddies on generalized peer interaction of children with ASD in inclusive classrooms[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014.29(4), 206–215.

[⑥]Bellini, S., Gardner, L., Hudock, R., & Yashima-Ellingson, Y.. The use of video self-modeling and peer tra ining to increase social engagement in preschool children on the autism spectrum[J].School Psychology Foru m: Research in Practice, 2016.10(2), 201–219.

中国知网 https://www.cnki.net

略的实施检核表（ Implementation Checklist for PMII）[①]。该量表所制定的同伴支持实施流程如下：

（1）选择同伴（ Selecting Peers）：招募多个同伴。

（2）培训同伴（ Training Peers）：①对同伴说明希望达到的目标；②和同伴讨论自闭症谱系障碍儿童喜欢的游戏与活动；③讲解沟通技巧；④给同伴建议和提示；⑤提供强化与反馈。值得重视的是目前除少部分研究以介绍、描述或解释干预目标技能、基本原理的形式向同伴提供指导以外，大量研究都将行为技能培训（指导、示范、角色扮演、提示、纠正性反馈）纳入同伴培训的内容[②]。例如在 Lee 等人的研究中中，研究者使用木偶进行成人示范和角色扮演，向同龄人传授目标技能[③]。例如 Trembath 和 Girolametto 等学者使用插图书籍向同伴展示信息[①]。在 NPDC 循证报告中，同伴培训的内容包括教同伴如何与自闭症谱系障碍儿童互动，以系统的方式教同伴如何发起和维持互动等内容[④]。

（3）支持同伴（Supporting Peers）：①教师协助同伴，提供可用于在社交沟通的脚本、开放式的和主题卡等；②教师与同伴每周商讨，解决问题。

（4）在课堂和学校实施（Implementing in Classroom and School Settings）：①教师监控互动，并在活动结束时，反馈同伴；②教同伴与自闭症谱系障碍儿童互动技巧（如口头提示，文字和图片提示卡）。

（5）扩展机会（Extending Initiations Across the Day）：教师为自闭症谱系障碍儿童发现机会，进行互动。

综上所述，同伴支持的流程应包括以下方面：（1）前期准备：招募同伴、进行配对，征得家长同意，以同伴和被辅导学生的兴趣为基础，来选择材料；（2）培训：同伴跟被辅导学生都要进行培训，对同伴要进行沟通技巧、支持方式等多方面培训。对于被辅导学生，也要进行适当培训，以保障活动可以正常进行；（3）监督管理：对整个过程进行监督，适时解决遇到的问题；（4）奖励跟反馈：奖励跟反馈也是必不可少的环节，要明确强化方式，合理强化与反馈。

[①]Neitzel, J. . Implementation checklist for PMII: Elementary, middle, and high school. Chapel Hill, NC: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, FPG Child Development Institute, UNC-Chapel Hill.2008.

[②]Gunning, C., Breathnach, Ó., Holloway, J., McTiernan, A., & Malone, B.. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings[J].Review Journal of Autism and Developmental Disorders,2019. 6(1), 40-62.

[③]Lee, S. H., & Lee, L. W.Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool. Topics in Early Childhood Special Education,2015. 35(2), 89–101.

[④]National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders . Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf.2014:49-106.

中国知网 https://www.cnki.net

三、同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

（一）国际上同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

大量国际上的研究都表明，同伴支持是经证实有效的干预手段。表 2.2 是对国际上关于同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍相关研究的梳理和分析。

表 2.2 国际上同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

研究者	支持形式	同伴类型	平均年龄（自闭症；同伴）（单位：岁）	干预过程	因变量	研究结果
Bellini et al.（2016）	同伴训练	普通儿童	4.7;6.3	培训同伴发起指令，成人提示、角色扮演、纠正反馈	活动参与、社交发起、社交回应	被试社交技能增加
Lee and Lee（2015）	同伴训练	普通儿童	3;9.5	成人通过角色扮演、示范等方式培训同伴	言语互动	被试社交技能提升，言语互动增加
Betz et al.（2008）	联合活动时间表	普通儿童	4;5	成人指导被试与同伴玩耍直至大家可在无提示的情况下轮流、遵守规则并完成游戏	参与活动的时间间隔	干预期被试参与度明显提高，维持期被试参与度达 80%
Thiemann-Bourque et al.（2017）	同伴训练	普通儿童	4;6	成人通过示范、角色扮演、强化、反馈等方式培训同伴	社交活动参与	被试社交活动参与有所增加
Banda and Hart（2010）	直接指导和同伴培训	普通儿童	8;8	培训同伴如何与被试交谈，回答问题及评论，分享玩具	社交发起、分享、回应	所有被试的社交发起跟分享行为都有所增加
Garfinkle and Schwartz（2002）	同伴模仿训练	典型发育迟缓儿童	3.7;5.5	由教师指导、提示以促进被试模仿同伴，并表扬其模仿行为	社会交往或模仿同伴、自由玩耍	所有被试在基线期未对同伴进行模仿，经干预后被试与同伴间社会交往、模仿同伴行为有所增加

中国知网 https://www.cnki.net

Garrison-Harrell et al.（1997）	同伴网络策略	普通儿童	5.7;7.2	对同伴进行使用辅助沟通系统的培训和社会交往技能指导	社会交往时间、使用交流系统的时间、附带行为、同伴提名和友谊评分。	未知
Harper et al.（2008）	同伴中介的自然策略	普通儿童	8.6;9.1	培训同伴关键反应训练的 5 个组成部分	吸引同伴注意的次数、参与互动的次数	被试获得同伴的关注，10min 内被试 1 获得同伴注意的次数从 0 次增加到 4.8 次，被试 2 从不足 1 次增加到了 3.25 次
Kamps et al.（1999）	同伴网络系统（包含跨年龄指导）	普通儿童	9;四年级	未知	收获、社会互动	接受同伴辅导的自闭症学生社会互动和记忆单词量有所增加
Katz and Girolametto（2013）	同伴干预	普通儿童	4.1;5.1	干预计划包括教育工作者训练课程、社会技能训练、游戏课程及跟进	参与互动	4 名被试与同伴社交互动增加
Koegel et al.（2012）	午餐俱乐部形式的社交机会	普通儿童	11;14	围绕被试的兴趣爱好，为被试 1 安排电影；为被试 2 安排漫画书和纸牌游戏；为被试 3 被安排纸牌游戏。	被试与同伴接触的时间间隔的百分比	3 名被试从基线期的零参与，经干预后增加为 16 次、6.33 次、2.6 次，活动参与度达 100%
Laushey and Heflin（2000）	同伴系统训练	普通儿童	5.6;5.8	每名被试分配 1 名日常伙伴，并创建配对学生图表。每天配对卡片轮换，保证每个学生都能与不同的伙伴配对。	询问他人并作出回应、引起他人注意、朝说话人的方向看	经干预后，两名被试的社交技能均有所提升

中国知网 https://www.cnki.net

Oppenheim-Leaf,Leaf, Dozier,Sheldon, and Sherman（2012）	教学互动过程	普通儿童	4;7	在第一阶段的培训中，向同伴讲解与自闭症学生发展友谊的必要性。在第二阶段，让同伴了解被试的优势和偏好。在第三阶段，研究者与同伴就中心主题进行指导讨论	掌握技能的程度、游戏和互动水平	3 名被试都掌握并维持所学技能；根据泛化探测的表现，3 名被试都将技能高度泛化到他们的兄弟姐妹身上
Owen-DeSchryver, Carr,Cale,and Blakeley- Smith（2008）	同伴训练	普通儿童	7;10	未知	社交发起、回应	经干预后被试社交回应跟社交发起都有所增加
Petursdottir,Mc Comas, McMaster,and Horner（2007）	同伴辅导、游戏	普通儿童	5;5	教授幼儿园同伴辅助学习策略	社会交往频率	参与脚本化游戏增加被试与同伴互动
Schmidt and Stichter（2012）	同伴中介干预	普通儿童	12;13	同伴培训包括技能指导、成人示范、技能演练、反馈和强化	社交发起、响应	同伴介入提高了目标学生技能泛化，所有被试社会互动有所增加
Thiemann and Goldstein（2004）	同伴培训、书面文本处理（WTT）	普通儿童	6.8;9.1	在同伴培训期间，传授同伴五项标准技能。在 WTT 的教学过程中，同伴通过书面文字和图片提示进行授课。	沟通行为	80%的被试在接受 WTT 期间的平均出勤率有所提高
Pellecchia and Hineline（2007）	同伴训练	自闭症谱系障碍儿童	4.5;4	成人通过角色扮演、示范等方式培训同伴	社交发起	被试社交沟通能力有所提升
Nelson et al.（2007）	同伴训练	智力障碍儿童	5.3;未知	成人通过示范、发起指令、视觉提示、纠正反馈、角色扮演等方式培训同伴。	游戏参与	被试游戏参与有所增加

中国知网 https://www.cnki.net

Zanolli et al.（1996）	同伴训练	智力障碍儿童	4;6	成人通过指导、角色扮演、纠正、激励强化等方式培训同伴。	社交发起	被试社交发起有所增加
Trembath et al.（2009）	语音生成设备、同伴自然教学	普通儿童	3;5	一名同伴只实施自然教学策略，另一名同伴实施自然教学策略和语音生成设备的结合进行互动	沟通行为	使用语音生成设备的同伴中介的自然教学比单独的同伴中介的自然教学每分钟产生更多的交际行为。
Odom and Strain（1986）	同伴训练	情绪行为障碍儿童	4;4.5	成人通过角色扮演、示范、视觉提示等方式培训同伴	互动社交	被试互动社交能力提升
Lorah et al.（2014）	同伴训练	自闭症谱系障碍儿童	4.5;4	成人通过强化等方式培训同伴	社交发起	被试社交能力提升
Trottier,Kamp, and Mirenda（2011）	同伴介入教学及活动（如游戏）	普通儿童	11.4;4.5	依兴趣爱好，为被试 1 制作了两款电脑 bingo 游戏；为被试 2 设计了 18 对“星球大战”纸牌。培训同伴，让同伴教导被试用语音生成设备	社交行为、得体性	被试的自发交流行为（用 PND 分数表示）均有所增加
Whitaker,（2004）	同伴训练	普通儿童	6;7	未知	社交发起、活动参与情况；父母及同伴看法	被试共享游戏的参与度增加、被试主动要求同伴辅导的频率增加 3 倍

由上表可知，第一，同伴支持适用于各年龄段的自闭症谱系障碍儿童。第二，研究者需对同伴进行社交技能、活动主题的培训，在培训时亦可同时对自闭症进行培训。第三，培训时可采取成人示范、角色扮演等多种方式。第四，在相关研究中，大部分研究选择普通儿童作为同伴，少数研究以智力障碍儿童、自闭症谱系障碍儿童或其他典型发育迟缓的儿童作为同伴，培训特殊儿童同伴来干预自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍，同样能够产生积极影响。最后，除了采取同伴引发训练、同伴辅导等方式，同伴支持还需要结合游戏、自然教学等其他合并策略。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）国内同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

笔者在 CNKI 资源总库及台湾硕博论文加值系统中以“同伴支持”或“同伴中介”、“同伴介入”和“自闭症”以及“社交”、”沟通”、“社会互动”为关键词进行检索，发现同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的实证研究较少，现将已有研究进行归纳总结并呈现如表 2.3 跟表 2.4 所示。

表 2.3 我国大陆地区同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

研究者	研究主题	研究对象	研究设计	研究结果
孙美丽（2011）[①]	探讨整合性游戏团体对增进自闭症谱系障碍儿童社会互动次数的影响作用	1 名就读于普通幼儿园的自闭症谱系障碍儿童及 2 名同班同伴	单一被试法的倒返实验设计	1、整合性游戏团体对被试社会互动能力的发展具有促进作用 2、游戏主题的选择要参考儿童兴趣、偏好及能力外，并保证儿童对游戏主题有一定的前备经验
郭丽莎（2015）[②]	探讨同伴支持对自闭症谱系障碍儿童学业、社交的影响作用	1 名就读于普通小学自闭症谱系障碍儿童和 4 名同班普通同伴	个案研究法	1、在普通班级中实施同伴支持减轻教师的负担 2、同伴支持促进被试学业、社交等能力的发展
廖进（2019）[③]	探讨同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社会交往的干预效果	普通小学中 3 名自闭症谱系障碍儿童，每班各 3 名同伴	单一被试中的跨被试多探测实验设计	同伴支持对被试社会交往干预具有良好的立即成效、维持成效、社会效度
吕汉城（2019）[④]	探讨同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社会交往能力的提升成效，提升社会工作在自闭症谱系障碍儿童领域的服务质量	社会工作服务机构的 8 名自闭症谱系障碍儿童和 9 名大学生志愿者同伴	行动研究法	1、从量上看，自闭症谱系障碍儿童与同伴之间交往过程中，其社交发起、社交回应行为增加 2、从质上看，同伴支持过后，自闭症谱系障碍儿童能得到同伴积极评价，并且与同伴建立了良好的人际关系

由上表可知，在我国大陆地区运用同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障的相关研究中，从研究对象所处阶段上看，集中在学龄前和小学阶段；其次，同伴支持方式多样，包括社会工作、学校教学等方面；从同伴类型上看，尚缺乏

[①]孙美丽.整合性游戏团体对提高自闭症儿童社会互动能力的个案研究[D].重庆师范大学,2011
[②]郭丽莎.普通小学随读自闭症儿童同伴支持的个案研究[D].四川师范大学,2015
[③]廖进.运用同伴介入法提升普小自闭症儿童社会交往的研究[D].重庆师范大学,2019
[④]吕汉城.同伴介入对自闭症儿童社会交往能力提升的成效研究[D].长春理工大学,2019

中国知网 https://www.cnki.net

以特殊儿童作为受训同伴的相关研究。近年来，我国台湾地区运用同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的关注度逐渐增多，现将部分研究呈现如表 2.4 所示：

表 2.4 我国台湾地区同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究

研究者	研究主题	研究对象	研究设计	研究结果
吴淑敏（2003）[①]	分析同伴媒介暨社交技巧教学的重要元素，及其对自闭症谱系障碍儿童的社会能力与同伴的角色之影响	2 名自闭症谱系障碍儿童（小一、幼稚园大班），每名搭配 3 名一般同伴	质性研究法	1、同伴训练方面，使用直接教导、角色扮演、问答与讨论的策略 2、自闭症谱系谱系障碍儿童的社交技巧有显著的改变，甚至泛化至其他情境
叶琬婷（2004）[②]	探讨学前自闭症谱系障碍儿童接受整合性游戏团体结合社会故事，对促进同伴间互动的影响	1 名学前自闭症谱系障碍儿童和 2 名低年级普通儿童	个案研究法	1、互动的内容有进展，从行动互动到口语互动，也慢慢有自我主张 2、同伴给予的互动机会越多，就越能产生更多互动 3、回班级后，自闭症谱系障碍儿童依然倾向于独自游戏，不主动加入同伴游戏
陈映羽（2004）[③]	探讨 3 名自闭症谱系障碍儿童接受鹰架式游戏团体对其沟通能力的影响	3 名自闭症谱系障碍儿童及同班同伴	单一被试中的 A-B-A 实验设计	1、鹰架式游戏团体对被试的“功能性语用”与“平均句长”无明显增进作用，对“语言内容”有少量增进 2、鹰架式游戏团体提升被试的“理解表达”能力
林欣桦（2010）[④]	探讨小学中度自闭症谱系障碍儿童接受同伴支持方案后，对其社会互动的影响	1 名四年级中度自闭症谱系障碍儿童与两名普通同班同伴	单一被试中的倒返实验设计	1、提升了被试的社会互动与其他正向行为，情绪问题行为减少 2、强调成人指导的必要性，需要成人给予同伴适切协助
张月菱（2010）[⑤]	探讨小学自闭症谱系障碍儿童接受同伴小老师过后，对其社会互动的影响	1 名五年级小学轻度自闭症谱系障碍儿童和 2 名普通班同伴	行动研究法	1、能提升自闭症谱系障碍儿童共同注意力、主动发起行为、回应行为 2、能增进同伴间关系

[①]吴淑敏.同侪媒介暨社交技巧教学对增进自闭症儿童社会能力的研究[D].台湾师范大学特殊教育研究所硕士论文,台北市.2003.
[②]叶琬婷.社会性故事融入整合性游戏团体对增进高功能自闭症儿童同侪互动的个案研究[D].台湾台北师范学院特殊教育学系硕士班硕士论文,台北市.2004.
[③]陈映羽.鹰架式游戏团体对低功能自闭症儿童沟通能力影响的研究[D].台湾台东大学教育研究所硕士论文,台东县.2004.
[④]林欣桦.同侪支持方案对中度自闭症学生在融合情境中课程参与和社会互动效果的研究[D].台湾台南大学重度障碍研究所硕士论文,台南市.2010.
[⑤]张月菱.以自闭症学童为同侪小老师对增进其社会互动的行动研究[D].台湾彰化师范大学复健咨商研究所硕士论文,彰化县.2010.

中国知网 https://www.cnki.net

蔡雅文（2010）[①]	探讨在常规活动中，小学自闭症谱系障碍儿童接受同伴媒介对其沟通能力的影响	1 名普通班四年级中度自闭症谱系障碍儿童及同班同伴	行动研究法	自闭症谱系障碍儿童学生的眼神注视、主动沟通行为、回应行为有所提升，且能泛化至其他情境
阮蓝莹（2013）[②]	探讨“同伴介入策略教学”对增进高功能自闭症在普通班课后社会互动之成效	1 名国小高功能自闭症学生和 2 名一般同班同伴为主要研究参与者	行动研究法	1、研究者依示范、说明、学生试教，再给予修正的历程能增进自闭症与同伴互动技能和互动内容 2、研究者执行同伴介入策略教学的团体课程、自由活动、个别课程能增进高功能自闭症与同伴的互动技能
董姵彣（2015）[③]	探讨同伴支持方案对于自闭症谱系障碍儿童社会技巧表现的影响	1 名七年级轻度自闭症谱系障碍儿童及 6 名同班级普通同伴	行动研究法	1、在实施同伴支持方案过后，自闭症谱系障碍儿童的求助、沟通技巧以及其他互动技巧都有所改善 2、研究者应提供同伴足够的正向支持，若有必要，提供实质增强亦可维持同伴参与的动机
张镇霖（2017）[④]	探讨 1 名自闭症谱系障碍儿童在参与同伴介入策略融入整合性游戏团体方案之后，其与同伴互动能力之提升	1 名资源班二年级自闭症谱系谱系障碍儿童与 2 位同伴	单一被试中的 A-B-M 实验设计	1、同伴介入融入整合性游戏团体策略，被试的眼神接触和以口语主动回应的能力有良好的立即成效、维持效果、社会效度

由上表可知，我国台湾地区学者关于同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究中，从研究对象所处阶段上看，已有研究将同伴支持运用到幼儿园、小学、中学等不同阶段的自闭症谱系障碍儿童；从研究结果上看，多数研究在改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍上都具有一定效果；从同伴类型上看，也缺乏以特殊儿童作为受训同伴的相关研究，同伴的类型有待进一步丰富化；从同伴支持形式上看，还需要辅以游戏、自然教学等合并策略。

（三）同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预的合并策略

利用同伴支持对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍进行干预时，可以结合以下方法：（1）策略教学。例如，Nelson 等人教同伴使用“玩钥匙”策略提升自

[①]蔡雅文.在例行性活动中运用同侪媒介策略增进小学普通班自闭症儿童沟通能力的行动研究[D].国立台北教育大学特殊教育学系硕士班硕士论文,台北市.2010.
[②]阮蓝莹.同侪介入策略对增进小学高功能自闭症学生社会互动的研究[D].国立屏东教育大学特殊教育学系硕士班硕士论文,屏东县.2013.
[③]董姵彣.同侪介入方案对增进国中轻度自闭症学生社会技巧之行动研究[D].国立台湾师范大学特殊教育学系硕士论文,台北市.2016.
[④]张镇霖.同侪策略融入整合性游戏团体对小学自闭症儿童与同侪互动能力的研究[D].台北市立大学特殊教育学系身心障碍教育教学硕士学位班硕士论文,台北市.2017.

中国知网 https://www.cnki.net

闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力[①]。（2）自我监控。Lee 等人使用“好朋友板”帮助同伴记录其跟自闭症谱系障碍儿童的友好行为[②]。（3）录像示范。MacDonald 等人向同伴展示了一段使用主题剧集表演剧本的成人短片[③]，Ganz 跟 Flores 教给同伴和自闭症谱系障碍儿童特定主题的剧本，在团体游戏中进行表演[④]。

根据 Odom 和 Strain 提出的标准，在实施各方法时同伴需遵循四点原则：（1）与自闭症谱系障碍儿童互动；（2）提示自闭症谱系障碍儿童目标行为；（3）与自闭症谱系障碍儿童接触；（4）强化自闭症谱系障碍儿童的行为[⑤]。

根据 Hunt 等人提出的社会支持模型，利用同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预的合并策略可归纳为以下五类[⑥]：

（1）友谊团体（Friendship groups）：向同伴提供自闭症谱系障碍儿童的能力和友谊信息（包括其优劣势）。例如，Sainato 等人将游戏策略的卡通图片贴在墙上，并在干预措施中使用快乐/悲伤、是/否的面孔，来评价同伴行为是否恰当。与其他残障儿童相比，对自闭症谱系障碍儿童来说，建立良好的友谊关系尤为重要。将发展友谊与能力相结合的研究对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力产生了积极影响。

（2）材料选择（Material selection）:互动材料的选择有两种不同方式，基于儿童兴趣或课堂规则。根据儿童兴趣来选择活动材料比根据规则能产生更好的影响。Katz 等人认为，活动使用的材料通常是可获得的，通常是儿童护理中心最受欢迎的玩具[⑦]。

（3）辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication，AAC）：AAC 指的是任何能够帮助一个人提高沟通能力和效率的设备、系统或方式。

[①]Nelson C, Nelson AR, McDonnell AP, Johnston SS, Crompton A. Keys to play: a strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers[J]. Educ Train Dev Disabil 2007;42(02):165–181

[②]Lee SH, Lee LW. Promoting snack time inter- actions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Top Early Child Spec Educ 2015; 35:89–101

[③]MacDonald R, Sacramone S, Mansfield R, Wiltz K, Ahearn WH. Using video modeling to teach reciprocal pretend play to children with autism[J]. J Appl Behav Anal 2009;42(01):43–55

[④]Ganz JB, Flores MM. Effects of the use of visual strategies in play groups for children with autism spectrum disorders and their peers[J]. J Autism Dev Disord 2008;38(05):926–940

[⑤]Chapin, S., Boyle, S., Babb, S., & McNaughton, D.. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review[J]. Seminars in Speech and Language.2018.

[⑥]Hunt P, Alwell M, Goetz L. Interacting with peers through conversation turn taking with a communication book adaptation[J].Augmentative & Alternative Communication 1991;7:117–126

[⑦]Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Top Early Child Special Education 2013;33:133–143

中国知网 https://www.cnki.net

Trembath 等人发现，使用语音生成设备来帮助自闭症谱系障碍儿童交流，能产生很好的效果[①]。

（4）互动活动（Interactive activities）：通常涉及到的互动游戏有艺术、戏剧、自由活动、粗大动作、操作性游戏、主题游戏、吃零食小吃等。其中操作性游戏（如玩面团、积木、拼图）为自闭症谱系障碍儿童与同伴提供了大量交流机会，这对促进其社交沟通有很大影响。这类游戏的共同特征是社会规则少，等待时间断。除此之外，吃零食小吃活动也能产生很大积极影响。

（5）成人支持（Adult Support）:成人在整个过程当中起着连接同伴跟自闭症谱系障碍儿童的桥梁作用。在整个同伴支持过程中，自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力的提升很大程度取决于训练有素，反应灵敏的同伴，这依赖成年人的培训跟监督[②]。

大量研究表明，运用同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍时，需要其他合并策略，现将相关合并策略做出梳理和分析，如表 2.5 所示：

表 2.5 同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的合并策略相关研究

作者	友谊团体	材料选择	辅助沟通系统	互动活动	成人支持
Ganz and Flores（2008）	√	兴趣爱好	×	主题游戏	示范、强化
Garfinkle and Schwartz（2002）	×	课堂规则	×	美术、操纵性游戏	示范、强化
Goldstein et al.（1992）	×	×	×	戏剧、粗大动作、操纵性游戏	示范、强化、监督
Hundert et al.（2014）	√	兴趣爱好	×	戏剧、操纵性游戏、主题游戏	示范、强化
Katz and Girolametto（2013）	√	课堂规则	图片交换沟通系统	美术、操纵性游戏	示范、强化
Kohler et al.（2007）	√	兴趣爱好	图片交换沟通系统	主题游戏	示范、强化、监督
Lee and Lee（2015）	√	×	×	小吃零食	示范、强化

[①]Trembath D, Balandin S, Togher L, Stancliffe RJ. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J].Journal of Intellect Development Disability 2009; 34:173–186 28.

[②]Thiemann-Bourque K. Peer-mediated AAC instruction for young children with autism and other developme ntal disabilities[J].Perspectives on Augmentative and Alternative 2012;21(04):159–166.

中国知网 https://www.cnki.net

Lorah et al.（2014）	×	×	图片交换沟通系统	操纵性游戏	强化
MacDonald et al.（2009）	×	×	×	主题游戏	强化
McGee et al.（1992）	×	兴趣爱好	×	操纵性游戏	示范、强化、监督
Nelson et al.（2007）	×	兴趣爱好	×	自由活动	强化
Odom and Watts（1991）	×	课堂规则	×	×	示范、强化、监督
Pellecchia and Hineline（2007）	×	兴趣爱好	×	操纵性游戏	示范、强化、监督
Sainato et al.（1992）	√	×	×	戏剧、主题游戏	示范、强化
Sawyer et al.（2005）	√	×	×	自由活动	示范、强化、监督
Strain et al.（1994）	×	×	×	操纵性游戏	示范、强化、监督
Trembath et al.（2009）	√	课堂规则	语音生成设备	自由活动	示范、强化、监督
Zanolli et al.（1996）	×	兴趣爱好	×	美术、操纵性游戏	示范、强化

由上表可知，大量研究都表明了合并策略的必要性，尤其需要互动活动和成人支持，同时应该基于自闭症谱系障碍儿童兴趣爱好或者课堂规则，选取互动材料，必要时还需要辅助沟通系统。

四、已有研究述评

（一）改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究述评

通过对改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究的梳理，可以得知，社交沟通能力是一种影响自闭症谱系障碍儿童适应社会的重要能力，自闭症谱系障碍儿童的社交沟通问题已经得到一定程度重视，已有研究对自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力的评估、干预方法等方面都进行了探讨，不仅包括在特殊教育学校就读的自闭症谱系障碍儿童，还包括随班就读的自闭症谱系障碍儿童。在既往研究中，除了传统行为疗法以外，已有研究通过社会故事法、录像示范法、同伴支持等多种方法来提升自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力。在评估工具上，主要参考已有的社交沟通评量工具。但已有研究也有不足，我国大陆地区运用同伴支

中国知网 https://www.cnki.net

持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的实证研究较少，重视程度还不够，有待更多研究加入。

（二）同伴支持的相关研究述评

通过对同伴支持相关文献进行梳理发现，同伴支持的方式有同伴辅导、同伴引发训练、同伴训练、同伴网络等。有着较明确的同伴培训步骤、实施流程及遵循原则。在维持学生的学习动机、社交互动方面都有不同作用。我国台湾地区已经将同伴支持运用于普教各年龄段的教学领域中，包括小学、初高中的语数外等各学科的教学，也将此策略运用在特殊儿童语言发展、社交沟通、学业参与等领域，已逐见成效，且相关研究日益成熟，但是仍存在不足。首先，在特殊教育领域中，同伴支持用于改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍，提升其社交沟通能力的研究较少；其次，既往研究中，同伴一般为普通学生且在融合环境中进行研究，较少以特殊儿童作为同伴并在特殊教育学校进行。

（三）同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的相关研究述评

通过对同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍相关文献梳理发现：首先，在运用同伴支持策略时，通常需要与其他方法进行结合，即需要合并策略。其次，在整个实施过程中，还需要研究者提供其他协助。但是，以往研究也有不足之处，既往研究很大部分干预学龄前自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍，年龄稍长的自闭症谱系障碍儿童的相关研究较少，以期更多研究进行深入探讨；最后，国内外相关研究中，在特殊教育学校中，由特殊儿童作为同伴改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的研究较少，本研究培训特殊儿童作为同伴，对在特殊教育学校环境中提升自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 研究设计

一、研究目的

本研究旨在探讨在特殊教育学校中实施同伴支持，对改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的有效性；其次，发展出在特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍可行的支持形式；第三，探讨特殊儿童同伴经培训过后，协助自闭症谱系障碍儿童的社交沟通支持能力有无提高；最后，探讨本研究的干预效果可能受哪些因素影响。

二、研究场所及对象

（一）研究场所

本研究的研究场所为重庆市某特殊教育学校，该校为全日制综合性特殊教育学校，共有八个培智班，正式教职工 30 余人，学生 118 人，主要类型有智力障碍、自闭症和其他障碍类型的学生。

（二）研究对象

本研究依据以下条件在该校不同的三个年级中选取三名自闭症学生，从每一名自闭症谱系障碍儿童的班级再选择一名同伴与之搭配。

1、研究对象选择条件

本研究中的自闭症谱系障碍儿童需要满足的选择条件有：①符合DSM-5标准，有三甲医院明确诊断证明的自闭症谱系障碍儿童；②出勤率较高，一周出勤天数达四天及以上；③家长同意参与本研究，并签署家长同意书；④存在明显的社交沟通困难。

同伴的选取参考本研究中文献探讨的结果，同伴需要满足的条件有：①由教师提名；②出勤率高（一周出勤达四天以上）；③与自闭症谱系障碍儿童同班级；④语言表达跟理解较好；⑤在校表现良好；⑥与自闭症谱系障碍儿童关系良好；⑦注意力较集中。

2、选取过程：

（1）访谈教师。首先通过访谈教师，说明向其说明研究本研究的研究对象选取标准、研究目的、研究方法。即本研究中的自闭症谱系障碍儿童是在社交沟通方面存在一定困难的自闭症谱系障碍学生，同伴则是同班级中程度较好，社交能力较强的学生。通过与教师访谈，由教师推荐自闭症谱系障碍儿童和同伴。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）观察。结合教师意见，研究者深入到每个班级中，对该班教师推荐的自闭症谱系障碍儿童及其同伴，对其课堂课后的表现进行有针对性地深入观察。

（3）访谈学生。研究者主要对教师所提名的学生进行访谈，着重访谈同伴，考察其社交能力和认知情况，以便及时更换同伴。

结合访谈教师、深入观察、访谈学生的结果，确定研究对象。

3、研究对象确定

（1）自闭症谱系障碍儿童

基于上述标准，并通过两周的持续观察和教师的访谈推荐，最终选择 3 名就读于重庆市某特殊教育学校不同班级的自闭症谱系障碍儿童。通过研究者观察、对家长和教师的访谈、《自闭症儿童沟通行为评量表》和《强化物调查表》获得 3 名自闭症谱系障碍儿童的基本信息，如表 3.1 所示。

口语沟通方面，被试 A 会重复他人的语言，会仿说简单的词语，但很少与人交流；被试 B 会重复他人的语言，有仿说能力，较少主动与人交流，但自言自语情况较多;被试 C 会说简单的词语和句子，偶尔会主动发起对话，但语音语调存在问题。

非口语沟通方面，A 常以动作来代替口语，目光注视或回应情况较少；B 与人互动时甚少出现目光注视或回应和动作；C 会用口语或动作表达需求，有目光注视和回应。

社交回应方面，A 能听从老师的简单指令，在提示下有反应，但注意力差;B 能理解简单指令并作出相应动作；C 能理解较复杂指令并作出相应动作；

社交发起方面，AB 大多数用动作代替口语表达自身需求，但缺乏与人主动沟通的能力；C 会用简单的词语或动作主动表达需求.

综上所述，3 名自闭症谱系障碍儿童都存在着不同程度的社交沟通障碍，与他人互动和沟通情况还有待提升，并存在一定的情绪行为问题，可见，他们的口语沟通、非口语沟通、社交回应和社交发起能力还需提升。为此，本研究根据研究对象的现有能力设计活动方案，以进一步提升 3 名自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力。

表 3.1 自闭症谱系障碍儿童基本信息表

代号	A	B	C
性别	男	男	男
年龄	13 岁	12 岁	10 岁
年级	七年级	六年级	四年级
确诊年龄	2 岁	1 岁多	2 岁多

中国知网 https://www.cnki.net

教育史	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校
主照料者	继父、母亲	姑姑	母亲
视知觉与听力	良好	良好	良好
喜好	糖果、积木、零食、绘画、奶类	饼干、猪肉、积木、汽车、口头表扬	香蕉、积木、糖果
沟通方式	言语、动作	言语、动作	言语、动作
游戏特征	喜好独自游戏，允许他人观看，但模仿能力较好，可以掌握简单的游戏规则	允许他人加入游戏，主动参与意识较差，能听从老师指导	能与同伴进行游戏互动，但离开活动的现象较多
情绪行为	专注度不高，喜欢蹦蹦跳跳，偶有离座行为	有离座行为，偶有大叫、自言自语行为	遇到感兴趣的事物时会有争夺行为

（2）特殊同伴

通过教师提名符合同伴选择标准的学生，及研究者跟班观察，从每一位自闭症谱系障碍儿童所在班级中挑选出一名同伴，最后挑选出与研究对象 A、B、C 对应的三名同伴 P1、P2、P3。三名同伴基本信息如所示。

表 3.2 同伴基本信息表

代号	P1	P2	P3
性别	男	男	女
年龄	15 岁	12 岁	11 岁
年级	七年级	六年级	四年级
残障类型	智力障碍	智力障碍	智力障碍
教育史	普校“回流”学生	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校
社交能力	**情绪：**稳定； **友谊：**常面带笑容，能跟班上同学和谐相处。 **教师看法：**胜任该班班长，是老师的得力助手，懂事，时常帮助教师管理纪律。 **与 A 关系：**同班，同铺午睡，教室座位相近，在老师的指导下会经常帮助 A，较开朗、活泼；	**情绪：**较稳定； **友谊：**与班上同学相处融洽，待人友善，喜欢与同学玩耍； **教师看法：**热心、尽心尽责，常帮助同学参加集体活动。 **与 B 关系：**同班级，与 B 前后桌，比较热心、爱帮助同学；	**情绪：**较稳定； **友谊：**开朗健谈，活泼热情，经常主动发起谈话； **教师看法：**对教师的指令领悟力较好，能较好完成交代的任务。 **与 C 关系：**同班同学，与 C 住址相近，偶尔一同回家；

中国知网 https://www.cnki.net

沟通能力	说话、问答均流畅；	说话、问答均流畅；	说话、问答均流畅；

三、研究方法

（一）行动研究法

本研究所采用的最主要研究方法是行动研究法。行动研究是由教育情景的参与者本人，为了提高对其所从事教育工作的理性认识，为了加深对其所参与的教育实践及依赖背景的了解，从而开展的反思性质性研究。即教育工作者本人，在其教育实践情境中，对自身在教育活动中遇到的问题进行研究，探讨解决该问题的策略与途径，再通过实际行动付诸实践，实践过程中观察反馈，进行自我反思，调整解决问题的方式方法，再实施，直到问题得以解决。行动研究是一个反复、循环的过程[①]。

行动研究的重点在于“螺旋循环”（spiral of cycles），即：（1）研究者在情境中探究，从而形成研究计划；（2）实施确定的计划；（3）观察实施过程；（4）进行反思、调整，再重新计划、实施和观察、反思，以此循环[②]。“计划-实施-观察-反思”是行动研究的经典表述，本行动研究也遵循“计划-实施-观察-反思”四个环节。

（二）文献研究法

文献研究法指的是研究者通过搜集、鉴别、整理、研究文献，从而形成对事实的科学认知方法[③]。在本研究中，笔者通过对收集到的相关文献整理分析，明确了培训同伴的流程、评价自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力的相关方法、同伴支持方案的制定、干预流程的实施与调整。

（三）观察法

观察法指的是研究者根据观察表或研究目的，利用自身感官或者辅助工具来对研究对象进行直接观察，从而获得所需资料的一种研究方法[③]。本研究有目的地对研究中出现的情况进行系统性的观察、记录、分析，对自闭症谱系障碍儿童及其同伴的具体表现进行详细观察。

（四）访谈法

访谈法也被称之为晤谈法，它指的是通过访谈人员与受访者面对面进行交流，

[①]刘良华.校本行动研究[M].成都:四川教育出版社, 2002.44-46.
[②]杨晓萍.教育科学研究方法[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2012. 161
[③]荆玲玲.社会研究方法[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社.2016.

中国知网 https://www.cnki.net

从而了解受访者行为与心理的心理学研究方法[④]。本研究拟采用自编访谈提纲，对教师、家长、学生进行访谈，了解自闭症谱系障碍儿童社交沟通基本情况，了解其存在的困难和问题，明确其需要增加的社交沟通行为。除此之外，还应了解同伴对自闭症谱系障碍儿童的态度与接纳度。除此之外，综合家长、教师的意见，制定同伴支持方案，在方案实施之后再对各方进行访谈，调整方案。在研究结束之后，进行访谈，了解自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升情况，从而构成本研究的社会效度。

四、研究工具

（一）自闭症儿童沟通行为评量表

为了解研究对象的社交沟通能力，本研究将《自闭症儿童沟通行为评量表》（见附录七）作为评量工具之一。该量表是由台湾学者张正芬和王华沛编制的，主要用于评量言语能力很少或尚未发展出言语的自闭症谱系障碍儿童[②]。该量表由社交性沟通和游戏活动、回答问题时，自闭症谱系障碍儿童表现怎样等六个维度组成，每题依据研究对象出现的行为频率进行勾选。本研究用此量表，在行动研究开展前施测，了解研究对象的社交沟通基本情况；行动研究结束过后施测，用于了解研究效果[①]。

（二）强化物调查表

《强化物调查表》（见附录一）由十方教育中心编制，用以了解研究对象喜好的物品，为本研究过程中强化物的选择和方案制定提供依据[②]。

（三）自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求问卷

该问卷用于了解被试社交沟通能力的提升需求，通过查阅相关文献，自编《自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求问卷》（见附录五），由特殊教育学校教师填写自闭症谱系障碍儿童亟需提升在何种情境下的社交沟通能力，将占比较高的几个情境纳入本研究同伴支持方案的游戏主题。

（四）学生兴趣及游戏活动调查表

研究者自编兴趣活动调查表（见附录四），由家长和教师填写，用于了解同伴及自闭症谱系障碍儿童的游戏偏好，为本研究设计主题游戏提供参考。

（五）自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力观察评量表

《自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力观察评量表》（见附录八）是根据本研究

[①]彭燕.循证理念下录像示范法对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预研究[D].西南大学,2019.
[②]张文京.弱智儿童个别化教育与教学[M].重庆: 重庆出版社,2005.80.

中国知网 https://www.cnki.net

中对社交沟通能力的细化目标来编制，此观察评量表包括自闭症谱系障碍儿童对同伴社交沟通发起与回应的次数记录，以及同伴对自闭症谱系障碍儿童社交沟通发起与回应的次数记录。用以检验每一轮行动研究的效果，也为下一轮行动研究的改进提供依据。

（六）访谈提纲（教师版、家长版）

研究者自编访谈反馈表（见附录二），用于了解自闭症谱系障碍儿童在行动研究实施后，其社交沟通能力提升情况，访谈提纲包括教师、家长。主要对自闭症谱系障碍儿童与教师同学、家人同伴之间的社交沟通情况进行了解，从而构成本研究的社会效度。

五、研究流程

（一）准备阶段

首先，提出问题：自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍是其核心缺陷之一，严重妨碍了其正常生活，其社交沟通问题亟需关注。而同伴支持有着经济方便、节约教育资源、促进共同进步等优点，且由特殊儿童作为同伴在特殊教育学校改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能障碍，提升其社交沟通品质相关的实证研究较少，由此可以凸显本研究的必要性。

其次，研究相关文献，梳理国内外关于同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通能障碍相关研究，借鉴现有研究，与导师讨论，拟定初步框架与方法。

（二）行动研究的实施

行动研究是一个螺旋式反复的过程，每一轮循环都包括计划、行动、观察、反思四个环节。

计划——第一，通过观察、访谈，了解自闭症谱系障碍儿童所存在的社交沟通需求与困难；第二，分析借鉴相关研究，初步拟定干预方案；第三，选择辅助策略、干预材料。

行动——第一，培训同伴和自闭症谱系障碍儿童；第二，结合其他方法实施干预，并收集相关数据和资料。

观察——第一，监控整个实施过程，第二，重点观察自闭症谱系障碍儿童的社交沟通行为。

反思——第一，根据观察结果，对整个实施过程进行反思，遇到了什么问题；第二，思考如何调整。

每四个环节代表一个循环结束，根据反思的结果，对干预方案、实施步骤、辅助策略等进行调整，进入下一个循环，如此循环往复。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）资料收集与结果分析

本研究需要对研究过程中涉及的社交沟通行为观察记录表、自闭症儿童基本沟通行为评量表、访谈提纲、访谈记录、反思记录等资料进行收集整理。

1、资料收集

（1）观察记录

观察记录是指在研究各阶段对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通行为和具体表现进行记录，以收集研究对象的具体表现和实施效果。

（2）访谈记录

访谈教师同学家长，对同伴和自闭症谱系障碍儿童的访谈是在其出现不适当的行为时进行访谈，了解行为出现的原因。对周围教师同学进行访谈，了解实施效果。

（3）反思记录

研究者对每一轮行动的实施效果进行反思，将观察、访谈中的思考记录，为行动研究中的方案的修改调整提供依据。

2、资料分析

研究者在每一轮行动研究过后都收集相应资料，对访谈、观察、反思资料进行整理，删除无关信息，进行分析。除此之外，还要对评量表进行分析，对自闭症儿童基本沟通行为量表、观察记录表等量表进行分析，以便后续调整及检验效果。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 方案设计

本研究的方案设计包括同伴培训方案和主题游戏活动设计两个重点，下面分开阐述。

一、同伴培训方案

通过梳理文献发现，大多数相关研究中，同伴培训都包含教学内容、对话和演练实践，并结合关键反应训练、同伴引发训练等多种方式来进行。训练内容包含了提供强化与回馈、示范与其年龄相符且适当的沟通技能，以及如何调整活动来促进自闭症谱系障碍儿童参与、促进自闭症谱系障碍儿童与同伴的互动、协助自闭症谱系障碍儿童达到目标[①]。

根据美国自闭症国家专业发展中心（National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders ，NPDC）循证报告的内容，同伴经培训需要达成的目标有：（1）组织活动（提出建议）；（2）介入分享（提供、给予、接受）；（3）提供协助（完成任务、使用游戏设备、响应请求）；（4）提供关爱、表扬和鼓励（例如，击掌）。此外，在培训同伴时，一次教授一个特定的行为，并在成人介入下练习：（1）描述行为；（2）示范；（3）与同伴练习；（4）提供提示或反馈；（5）提供强化（表扬，击掌）[②]。美国国家自闭症研究中心（National Autism Center， NAC）循证报告也指出，培训伴如何获得自闭症谱系障碍儿童的关注，促进分享，提供帮助，示范适当的游戏技能，并帮助组织游戏活动。使用提示和反馈来促进互动[③]。

有研究指出，同伴培训重点有：（1）培训目的(如何增进自闭症的社交沟通行为)；（2）进行方式，根据 Gunning 等人提出的行为技能培训，采取指导、示范、角色扮演、提示、纠正性反馈的方式进行；（3）达成的期望(同伴们都知道应怎样协助以增进与自闭症谱系障碍儿童的互动)。此外，经过培训之后同伴需要达到什么样的程度，怎么衡量培训的效果。因此本研究依据以上同伴培训要点并结合自闭症谱系障碍儿童的优劣势、喜好、社交沟通特点等，来设计同伴培训方案，见表 4.1。

[①]Rashed Aldabas (2019): Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2019.1580275

[②]National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders . Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder [R/OL] . http://autismpdc.fpg. unc.edu/sites / autism pdc. fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf .2014:49-106.

[③]National Autism Center . National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/.2015:43-70.

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 同伴培训方案

培训主题	重点	具体内容	培训达成标准
	引起注意	教导同伴如何引起自闭症谱系障碍儿童注意的策略(例如:叫对方名字、牵手、拍肩膀、用物品吸引等);教师示范并与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“引起注意”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为
技巧训练	恰当回应方式	教导同伴回应自闭症谱系障碍儿童的策略(简单口语回应、眼神回应、肢体动作回应等);教师示范并与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“恰当回应方式”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为
	给予选择机会	教导同伴给予自闭症谱系障碍儿童选择的机会（例如：选游戏角色、选道具等）；教师示范并与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“给予选择机会”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为
	示范帮助	教导同伴怎样正确给自闭症谱系障碍儿童示范，如何及时提供帮助;教师设计多种示范帮助情境，与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“示范帮助”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为
	轮流等待	教导同伴如何引导自闭症谱系障碍儿童在活动中轮流等待;教师设计多种情境，与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“轮流等待”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为
	扩充对话	教导同伴在与自闭症谱系障碍儿童互动过程中，怎样扩充对话(问当前活动相关问题、适当表扬鼓励等)；教师示范，与同伴练习。	2min 内，教师示范三次“扩充对话”，同伴可以在无提示情况下独立完整完成目标行为

以上内容为主题游戏活动进行之前对同伴进行的技巧训练，达到规定标准之后才可进行之后游戏。在游戏中应根据需要对培训内容进行调整，增添额外的同伴技巧训练，具体的同伴培训流程如图 4.2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.2 同伴培训流程图

总的来说，首先，要让同伴掌握社交沟通策略，即“做什么”和“说什么”。“做什么”（肢体）同伴可以采取的策略有：看、站近一点、拍肩膀、拉手、用手指、 给玩具、轮流等待。关于“说什么”（口语），同伴使用的策略可以是：同伴叫被试名字、你想玩吗、你想玩什么、你在做什么、我可以和你一起玩吗、现在该谁了、你好棒。其次，在互动游戏时，研究者也需全程监督，出现下列情况时成人需提示同伴[①]：（1）当 5 秒以上没有互动时；（2）当同伴请求帮助时。成人提示是明确的语言提示、图片提示或手势，如果同伴 5 秒内没有响应成人提示，则需要再次提示并提供指导。最后，在整个培训过程中，值得重视的是，同伴也需要强化，研究者应根据同伴年龄来选择强化方式。对于年龄较小的同伴可采取奖励贴纸、代币制等方式。对于年龄稍大的同伴，可以奖励休息时间、具体口头表扬[①]。

通过同伴培训，为方便观察，笔者将社交沟通行为划分为游戏活动过程中的社交发起和社交回应两种行为，每种都包括言语跟动作两类表现形式。除此之外，还需对同伴提示的次数进行观察，对规定观察时间内行为出现的次数进行记录，作为后续改进行动研究以及检验研究效果的依据。具体定义如表 4.2 所示。

[①]Missouri Autism Guidelines Initiative (MAGI) http://autismguidelines.dmh.mo.gov/

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 观察记录表

类型	记录对象	定义
社交发起	自闭症谱系障碍儿童	通过口语或者非口语（肢体动作、眼神注视等）的方式吸引同伴注意力跟同伴回应行为的次数 （例如：询问对方、提供帮助、递东西给对方、问候等）
社交回应	自闭症谱系障碍儿童	通过口语或者非口语的方式对同伴面向自身的社交行为产生积极反应或关注的行为次数；如在连续性对话当中，从第一次社交发起之后的每次反应都为社交回应；社交回应应发生在社交发起过后 5 秒钟之内。 （例如：被叫名字能眼神注视对方、对方打招呼时挥手服从要求、用口语回答问题）
同伴提示	同伴	同伴提示被定义为每次活动过程中，同伴对自闭症谱系障碍儿童口头或动作提示的次数。 （例如：叫对方名字、牵着对方的手进行下一步）

二、同伴支持活动设计

在众多同伴支持的合并策略中，游戏是最理想的方式之一。通过游戏活动，可以不断给同伴与自闭症谱系障碍儿童提供互动机会与多元互动形式。游戏符合儿童的游戏特性，且是一种自然情景中的干预形式，有利于自闭症谱系障碍儿童的接受和泛化[①]。本研究的游戏活动设计主要从游戏主题的确定、游戏内容的确定、主题游戏活动方案几方面来阐释，如图 4.3 所示。

（一）同伴支持活动主题的确定依据

本研究游戏活动主题的确定将参照《培智学校义务教育生活适应课程标准（2016 版）》跟《培智学校义务教育生活语文课程标准（2016 版）》以及相应教材涉及社交沟通的课程内容，同时结合对教师问卷调查的结果，选取 4-5 个生活化的社交沟通情境作为本研究游戏的主题。

1、培智学校义务教育课程标准

根据《培智学校义务教育生活适应课程标准（2016 版）》课程开发建议，应合

[①]Oppenheim, M.L.Teaching Typical Developing Children to Promote Social Play with Their Siblings with Autism[J].Research in Autism Spectrum Disorders, 2012 (6) :777-791.

中国知网 https://www.cnki.net

理利用家庭资源与社区资源，社区公共场所与公共设施，如超市、文化体育场馆、公园、校外教育基地、银行、餐厅、小区跟家庭、理发店等都是可利用资源。

除此之外，还应充分开发与利用社会资源与学校相关联的社会资源，例如来自各界的人力资源，如与学生学习生活密切相关的各从业人员、志愿者、家长等，还包括社会生活事件、环境资源事件等[①]。

《培智学校义务教育生活语文课程标准（2016 版）》课程开发建议也提到生活语文的课程资源不仅包括课堂教学资源，还应包括课外资源，如：社会实践跟社会生产劳动场所，如广告牌、报廊、布告栏等各标牌或博物馆、展览馆、纪念馆、图书馆等场所。应充分利用班级、校园、家庭、社区等资源，让学生体验、感受生活，积累生活经验，增强感性认识[①]。

生活适应跟生活适应课程标准都强调了积极利用家庭、班级、学校、社区等资源，利用各从业人员及社会生活事件，让学生适应生活。因此，本研究的游戏主题的素材也应贴近学生生活经验。

2、学生兴趣及游戏活动调查

研究者对自闭症谱系障碍儿童及同伴日常所从事的游戏活动进行了调查，了解到大部分学生对画画、积木、玩玩具、电子游戏这类操作性强的游戏较感兴趣，因此研究者在设计游戏时，会将有关内容纳入。

[①]中华人民共和国教育部.教育部发布实施盲、聋和培智三类特殊教育学校义务教育课程标准. http://www.moe.gov.cn/was5/web/search?channelid=255182,2016-12-13.

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.3 同伴支持活动设计

3、培智学校生活语文、生活适应教材

笔者访谈了三位具备丰富教学经验的一线教师，与三位教师一起对部编版及重庆版本的培智学校生活语文、生活适应、生活与品德教材社交沟通相关内容进行梳理，共同整理出以下与问卷中涉及到的社交沟通情境联系较为密切的课文内容，如表 4.3 及表 4.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 部编版生活适应和生活语文教材相关课文

生活适应		生活语文	
部编版一年级上册	元旦	部编版一年级上册	元旦
部编版一年级下册	六一儿童节	部编版一年级下册	打电话 过生日 儿童节
部编版二年级上册	团圆过中秋 我生活的小区	部编版二年级上册	表达需求 中秋节
部编版二年级下册	多彩的活动 身体不舒服 三八妇女节 五一劳动节	部编版二年级下册	操场上

表 4.4 重庆版本生活品德和生活语文教材相关课文

生活品德		生活语文	
重庆版本三年级上册	借文具 超市 公交车站 冬天的活动	重庆版本三年级上册	教师节 看病
重庆版本四年级上册	国庆节 发生事故的求救方法	重庆版本三年级下册	蔬菜 买菜
重庆版本四年级下册	挑选商品 购物结算 寻求帮助	重庆版本四年级上册	社区 百货商场 买衣服
重庆版本五年级上册	暑假的活动 认识站牌 认识购物场所 买东西	重庆版本五年级上册	打电话 购物能手 赶集
重庆版本六年级上册	存钱 取钱 拨打银行电话		

由表 4.3 及表 4.4 可知，在生活适应和生活语文教材当中，节日活动、打接电话、休闲娱乐、寻求帮助、购物、乘坐交通工具、看病、存取钱等内容在教材中占有重要地位，部编版及重庆版本教材都有所涉及，因此，笔者将高频社交沟通相关教材内容作为设计同伴支持活动的重要依据。

中国知网 https://www.cnki.net

4、教师问卷调查

结合生活语文与生活适应课标、教材内容以及三位具备丰富教学经验的一线教师意见，共同筛选出自闭症谱系障碍儿童亟需提升社交沟通的九类情境，编制《自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求调查》问卷，为确定活动的主题跟内容提供依据。

综合部编版和重庆版本生活语文生活适应教材与社交沟通联系较为密切的课文内容，针对自闭症谱系障碍儿童的具体情况，为了提升其社交沟通能力，应选择何种教学内容向一线教师及特教专业学生发放了三十份简易问卷。问卷回收结果显示，认为教学内容中应该包含“寻求帮助” 的教师占 64.71%，认为应该包含“购物”的教师占比 61.76%，有 58.82%的老师认为“社区生活”应该纳入教学活动内容，50%的教师认为课外休闲娱乐应纳入活动内容。20%-50%的教师认为打接电话、节日活动等应纳入教学活动内容。详情见图 4.4：



图 4.4《自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求调查问卷》结果分析

因此，笔者根据生活适应、生活语文课程标准及教材，结合问卷《自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求调查》回收意见，以及学生兴趣活动偏好的调查结果，初步将主题游戏活动主题定为：（1）寻求帮助；（2）购物；（3）社区生活；（4）休闲娱乐；（5）打接电话。综合部分教师对问卷中选项提出的见解，将“看医生”归纳至“社区生活”，乘坐交通工具（询问站牌、路线）可归纳至“寻求帮助”当中，笔者在游戏内容确定时作出了相应调整。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）同伴支持活动内容确定

根据对学生的兴趣及游戏活动调查、对教师问卷调查、对教材课标相关内容的梳理结果，确定了活动的具体内容，即对相应主题的扩展，如表 4.5 所示。

表 4.5 游戏内容

主题	内容
1.购物	1-1 农贸市场购物
	1-2 超市购物
	1-3 大商场购物
2.社区生活	2-1 看医生
	2-2 点餐
	2-3 存取钱
3.休闲娱乐	3-1 绘画涂色
	3-2 搭积木
	3-3 拼图
4.寻求帮助	4-1 问路、乘车
5.打接电话	5-1 拨打求救电话、给亲朋好友致电

以下对活动内容做简要阐释：

第一单元：购物。本单元参考培智学校生活语文、生活适应教材相应内容，选取了几种有代表性的购物场景，结合“认识购物场所”、“买东西”等与生活联系密切的课文内容，利于自闭症谱系障碍儿童发展在各种购物情境下的社交沟通技能。

第二单元：社区生活。本单元结合教材内容以及生活经验，选取社区生活当中存取钱、点餐、看医生等较常见的事件，结合“看病”、“存钱”、“取钱”、“我生活的小区”等课文内容来进行游戏活动设计，同时也是对第一单元内容的延续，加大难度，对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力提出更高要求。

第三单元：休闲娱乐。从特殊教育学校的课程设置及学生的兴趣爱好出发，研究者结合对家长、教师的访谈，以及日常观察。第三单元选取了同伴跟自闭症谱系障碍儿童都比较感兴趣的“搭积木”、“绘画涂色”、“拼图”作为游戏内容。

第四单元：寻求帮助。本单元的内容遵循实用性原则，选取了需要求助的“问路、乘车”场景，自闭症谱系障碍儿童通过与同伴游戏，提升其社交沟通能力的同时能够增强向他人寻求帮助的意识。

中国知网 https://www.cnki.net

第五单元：打接电话。本单元紧密结合教材中“打电话”及“发生事故的求救方法”等内容来设计了“拨打求救电话”和“给亲朋好友致电”的游戏内容，富有趣味性。

（三）活动策略

本研究采用主题游戏活动进行同伴互动，依据确立的主题和内容结合脚本、角色扮演、录像示范等策略，完善整体同伴支持方案。

脚本干预法是一种从上个世纪 80 年代开始应用于自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预的方法。通过图、文字或者音频等方式呈现脚本，使脚本作为协助自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通的提示，Garcia-Albea 等人认为脚本促进了儿童自发性[①]。Petursdottir 等人通过脚本游戏，增加了自闭症谱系障碍儿童与同伴互动。脚本干预法的优势在于不仅仅只训练社交对话中单一的一个部分。其训练内容可以是自闭症谱系障碍儿童对同伴的发起和回应，同时可以改善其提问和回答的技能[②]，因此借助脚本增进互动。

角色扮演(role play)也被称之为戏剧性游戏、模仿性游戏、装扮游戏等。角色扮演游戏是提升自闭症谱系障碍儿童儿童社交沟通能力的重要手段,还能促进其社会性的发展[③]。通过梳理文献，角色游戏也常用于同伴与自闭症谱系障碍儿童互动。

录像示范法（Video Modeling），也被称之为影片示范教学、视频示范法，它是示范的表现形式之一。美国自闭症国家专业发展中心（NPDC）在 2014 年出版的《自闭症谱系障碍儿童、青少年及成人的循证实践报告》中把录像示范法定义成一种使用录像录制、录像播放设备为干预对象提供目标行为或者技能训练的视觉支持教学方法，录像示范法是被循证证实有效的自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法[④]。

本研究所采取同伴干预策略与脚本、角色扮演、录像示范法等多种方法相结合，进一步提升同伴沟通效果。

（四）活动组织

笔者将游戏活动的主要形式分成两种：首先是教师主导的团体教学跟同伴培训，由教师向同伴和自闭症谱系障碍儿童讲解、示范每次游戏内容以及需要完成的任务，再按照同伴培训方案确立的内容来培训同伴，教师与同伴采取角色扮演

[①]王颖.运用脚本干预法对自闭症儿童开展口语沟通行为干预的案例研究[D].华东师范大学,2016.

[②]Koegel, L. K., Park, M. N., , Koegel, R. L.. Using self. management to improve the reciprocai socialconversation of children with autism spectrum disorder[J]. Journal Of Autism And Developmental Disorders. 2014,44 (5):1055-1063.

[③]黄俊洁.社会故事角色扮演法干预自闭症谱系障碍儿童行为问题的研究[D].西南大学,2018.

[④]连福鑫.美国自闭症儿童融合教育研究综述及其启示[J].中国特殊教育,2011,(4):30-36+47.

中国知网 https://www.cnki.net

的方式进行练习，来培养同伴帮助改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的技能；其次是以同伴为主导的游戏活动，让同伴把从团体教学及同伴培训中学习到的策略方法运用到帮助自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通上来，促进同伴与自闭症谱系障碍儿童的互动，即大致遵循“团体教学——同伴培训——同伴主导”的活动组织顺序。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 行动研究的实施

本行动研究历时三个半月，包括前两周的观察访谈、选取研究对象、准备及三个月行动研究的实施，在前期研究阶段，着重对研究对象的基本个人信息、强化物和游戏偏好等进行调查。

在行动研究的实施过程中，游戏活动时间为每周一至周四下午，教师为笔者本人。三组学生分开进行活动，即 A 跟 P1、B 跟 P2、C 跟 P3 各为一组，每组各进行十二次游戏，共计三十六次游戏活动。笔者在每一次游戏时，记录自闭症谱系障碍儿童 A、B、C 社交发起、社交回应、同伴提示的次数，便于检验研究效果。研究者在整个行动研究过程当中不断地进行修改、调整、完善每次活动。考虑到同伴支持活动有五个单元主题，因此本行动研究循环共计五轮，经过五轮研究，三名自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力都得到了不同程度的提升。

一、第一轮行动研究

（一）计划

首先，本轮行动研究活动内容为第一单元《购物》。内容包含模拟在农贸市场、超市、大商场的购物情形。根据研究正式开始前一周，笔者与教师一起用《自闭症儿童沟通行为评量表》对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力进行初测的结果得知，三名自闭症谱系障碍儿童都存在不同程度的社交沟通障碍，甚少与他人互动沟通，并存在不同程度的问题行为，由此可见，他们的口语及非口语沟通能力、社交发起跟社交回应能力都亟需提升。

其次，参照初测结果，笔者进行了本轮游戏活动的设计。课堂开始时，教师以自身购物照片导入，并展示物品；进入活动后，由教师向同伴讲解本次活动的任务，即物品配对、扮演商贩跟顾客；紧接着研究者按照同伴引发训练所确立的步骤培训同伴，采取讲解、示范、角色扮演的方式，与同伴进行练习，培训内容达到同伴培训的标准过后，再进入下一培训内容；最后，由同伴来主导完成“商品—场所配对”及“扮演顾客—商贩”的购物游戏。即“培训同伴——同伴主导”的形式。

最后，考虑到培智学生的教学应遵循直观性原则，本轮行动研究所采用的教学材料主要有实物及图片。根据本次研究所涉及的“农贸市场”、“超市”、“商场”等不同场景，选择与之相对应的“水果”、“日用品”的实物、“衣服裤子”图片来教学。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）实施

以教师本人的购物照片作为课堂引入，能够吸引学生注意，但笔者发现，学生仅在图片及实物出示的前几秒兴趣较高。在进行同伴培训时，给同伴讲解本次活动的任务时，几名自闭症谱系障碍儿童开始出现了尖叫、蹦跳等问题行为。

讲解任务过后笔者按照之前确立的同伴培训要点，结合此次内容来进行同伴培训：（1）引起注意。引导同伴观察自闭症谱系障碍儿童有无注意到准备的水果等教学材料，通过叫名字或拍肩膀等方式邀请其一起“购物”。（2）恰当回应。当自闭症谱系障碍儿童注视时，要目光回应。（3）给予选择机会。询问同伴想要扮演哪个角色（顾客或商贩）（4）示范。当自闭症谱系障碍儿童不知道下一步如何进行时（如扮演顾客需要结账），同伴需进行示范，示范过后不会时，则动手协助。（5）轮流等待。教同伴引导自闭症谱系障碍儿童学会轮流等待，例如他人说话时仔细聆听，安静等待。（6）扩充对话。在自闭症谱系障碍儿童正确配对物品或正确完成一次“购物”过后，用说“你真棒”或竖大拇指等方式鼓励同伴，根据实际情况灵活应变，扩充与当前活动的对话。教师与同伴进行角色扮演，进行练习，达到之前确立的标准过后，即由同伴进行主导后续活动，同伴与自闭症谱系障碍儿童进行配对及模拟购物。

或许是同伴培训时间较短，受训同伴也未能很好地将自己从“学生”的角色中脱离出来，常常是完成一次“购物”之后就不再继续，等待教师指示下一步，导致气氛有些“冷场”，教师也感到有些吃力。

图 5.1 笔者培训同伴及“购物游戏”照片

（三）观察

课堂中：由同伴主导的活动对于学生来说是一次全新的体验，在活动过程中，我看到自闭症孩子们脸上有些许迷茫与不理解。对于受训同伴来说，笔者了解到他们虽然平时课堂上有过当“小老师”的经历，但经过短暂培训之后来主导活动，也是一个巨大的挑战，时常出现等待老师指示或是“瞎指导”的情况。

1、同伴支持情况

在互动过程中笔者也有观察到积极的同伴支持情况，例如在 A 和同伴 P1 此次互动过程中，A 在回答问题时声音较小，P1 会鼓励其大声说话；当 A 出现错误，如将“买”说成“卖”时，P1 会纠正，并要求 A 跟着再说一遍；当发现 A 目光游

中国知网 https://www.cnki.net

离，注意力不集中时，P1 会呼喊 A 名字；在 A 正确完成一次“购物”过后，P1 会竖大拇指表扬。但是在整个互动过程中，P1 表现出来不够自信，较依赖教师指令。

在受训同伴 P2 跟自闭症 B 的互动过程当中，P2 观察到 B 不能说出一句完整的话时，会用夸张的口型无声提醒；在“购物”时，B 扮演顾客不能把钱递给对方，拿走物品时，P2 会走到 B 身旁，拉着他的手，递出钱，再引导他取走物品。

P3 跟 C 互动过程中，C 不配合时，P3 吸引同伴注意的方式不恰当，出现了大声吼叫的情况。

2、自闭症谱系障碍儿童社交沟通情况

笔者对此次干预研究中，A、B、C 三名自闭症谱系障碍儿童的社交发起和回应、同伴提示次数做了记录，如表 5.2 所示。

表 5.2 观察记录表 1

互动类型 / 对象	社交发起（次数）		社交回应（次数）		同伴提示（次数）	
	购物		购物		购物	
	①	②	①	②	①	②
A	3	5	13	10	9	13
B	3	4	5	10	10	16
C	7	8	12	18	8	15

注：编号①②代表该内容下第一次、第二次课

可以看出，第一次进行游戏时，同伴对各项技能还未掌握好就开始运用，同伴提示的效果不如人意，第二次课进行强化复习过后，可见同伴提示的次数有所增加，同伴培训的效果初显成效。

课后：在对研究对象的跟班观察中，笔者发现受训同伴对自闭症谱系障碍儿童的关注有所增加，所以对同伴的提示次数也有所增加。例如在上课时 A 忘记拿出课本，P1 会出声提醒。在课间休息时，同伴也会邀请自闭症谱系障碍儿童加入课间游戏。

（四）反思

总的来说，本轮行动研究，不论是活动氛围，还是材料选取、预期效果，都瑕疵较多。但通过第一轮特殊同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍行动研究的实施，计划当中许多不够恰当合理，有必要再进行商榷、修改的地方便显现出来，其中包括活动形式的调整、教学材料的选取、辅助策略的调整等等。笔者与该特殊教育学校一线教师进行了交流探讨，并积极思考解决方案，为开展下一轮的行动研究提供经验。

首先，活动形式的调整。本轮研究主要采取“同伴培训——同伴主导”的形

中国知网 https://www.cnki.net

式，在讲解内容、要求时，忽略了自闭症谱系障碍儿童，导致在进行后续活动时，三名自闭症谱系障碍儿童出现了不知所措的状况。因此，在下一轮研究中，应兼顾双方，即先采取“团体教学”的形式，说明任务和要求，对同伴及自闭症谱系障碍儿童都要进行与活动内容相关的培训讲解，再进入同伴培训。即“团体教学——培训同伴——同伴主导”的形式。

其次，教学材料的选取。考虑到配置教学应遵循的直观性原则，本轮行动研究选取了“水果”、“糖果”等实物用于模拟购物。导致在活动过程中屡次发生有学生抢夺水果零食，注意力被分散的情况；此外，为了便于学生理解各场所，教师准备了对应的词卡和图片，导致同伴 P1 在主导活动时，将大量时间花在教 A 读词，偏离重点。因此，在下一轮研究当中，笔者将谨慎选取道具，既要能吸引学生注意力，便于学生理解，又不至于偏离活动目的。

第三，环境控制。由于事先未跟科任教师协商好时间地点，A 跟 P1 的活动在该特校书吧中进行。整个互动过程中 A 易被周围摆放的绘本所吸引。因此，在后续研究中会尽量避免环境变换所带来的干扰。

最后，辅助策略的调整。对于同伴来说，独立主导整个活动过程，难度较大，尤其是在开启话题时感到无所适从，仍需要教师大量的言语提示，就出现了教师干涉过多，时常打断互动进程的情况。因此，为保证同伴互动的顺利进行，笔者将采取脚本作为辅助策略，并尽量减少言语提示。

二、第二轮行动研究

（一）计划

本轮行动研究的内容为第二单元“社区生活”，基于第一轮行动研究的经验与教训，在第二轮行动研究中进行了修正。

第一，在教学材料上，吸取之前的教训，进行了调整。笔者选取了贴合主题、便于学生操作的道具及图片。根据“看医生”内容选择操作性较强的玩具，根据“点餐”选取了内容丰富的菜单，使学生有直观认识，吸引学生注意。

第二，在教学形式上，在进行同伴培训之前，教师先进行团体教学，即先向同伴和自闭症谱系障碍儿童讲解活动内容和要求。教师进行示范，让双方初步感知，再进入同伴培训环节，达成熟练度要求过后，由同伴主导后续环节，即“团体教学——培训同伴——同伴主导”的形式。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.2 部分活动材料展示

第三，在辅助策略上，本次研究主要采取了脚本策略，脚本替代了传统提示，成为协助自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通的提示。研究表明，脚本在促进自闭症谱系障碍儿童对同伴、对成人的社交发起及社交回应，改善其提问跟回答技能，对关注的要求，谈论物品或抽象事件等方面，都有着较好的效果[①②]，故本次将研究结合脚本策略来进行。如表 5.3 所示，为本轮行动研究所使用“看医生”文字脚本。

表 5.3 脚本示例：看医生

脚本名称	看医生	
角色人物	医生　　病人	
教具	听诊器、针筒、药丸、体温计、角色卡片等	
场景一:挂号		
角色	**对话**	**动作**
病人：	我要挂号	
医生：	挂号费十元	
病人：	给你十元	拿钱给医生
医生：	病人请进	作出手势

[①]Garcia-Albea, E., Reeve, S. A., Brothers, K. J., , Reeve, K. F.. Using audio script fading and multiple- exemplar training to increase vocal interactions in children with autism[J]. Journal Of Applied Behavior Analysis.2014,47（2）:325-343

[②]Koegel, L. K., Park, M. N., , Koegel, R. L.. Using self. management to improve the reciprocai socialconversation of children with autism spectrum disorder[J]. Journal Of Autism And Developmental Disorders. 2014,44 (5):1055-1063.

中国知网 https://www.cnki.net

场景二：问诊

角色	对话	动作
医生：	哪里不舒服	
病人：	我头痛	手扶额
医生：	我帮你检查	用听诊器、温度计
医生：	需要打针	拿针筒给病人打针
病人：	好痛	手抚摸打针处
医生：	我帮你揉一揉	手揉病人打针处
病人：	谢谢医生	
医生：	不客气，药拿好	给病人药
病人：	好的，拜拜	向医生挥手
医生：	拜拜	向病人挥手

第四，在教学环境控制上，经过与任课教师协商，教学活动安排在教室进行，避免了无关因素带来的不良影响。此外，通过使用与游戏内容密切相关的道具，在促进同伴互动的同时，亦能训练手部精细动作。

（二）实施

与第一轮直接切入主题培训同伴相比，本轮新添加团体教学环节，通过教师对双方的示范讲解，提升了学生的参与度，也加深其对游戏内容的理解。在培训同伴时，仍然按照“引起注意——恰当回应——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话”的内容来进行培训。此外，针对上节课出现的不恰当互动行为，即大声吼叫的情况，增添了额外的同伴培训，告知同伴应面带笑容、亲切和蔼。大家对笔者此次准备的道具也表现出较大的兴趣。

图 5.3“看病”“点餐”游戏部分照片

（三）观察

课堂中：第二轮行动研究的效果要显著好于第一轮，因为活动材料、活动形式的改进，特别是对“团体教学——培训同伴”环节的调整，自闭症谱系障碍儿

中国知网 https://www.cnki.net

童注意力不集中的情况有所减少。此外，丰富多样、操作性强的道具很好地吸引了学生注意力。P1、P3 提到有过与弟弟妹妹玩“看医生”游戏的经验，并表示会操作各道具，在“点餐”游戏中 A 跟 C 会主动拿起菜单，会指着图片说“鱼”“洋芋”。

1、同伴支持情况

本轮研究在培训同伴时，通过再次复习强化，同伴对各项技能的掌握程度也有了明显的提升。尤其是在扩充对话方面，如在“点餐”游戏中，当自闭症谱系障碍儿童没有回应时，在教师未提示的情况下，笔者观察到同伴 P1、P2 会使用“你要不要吃 XX”或“XX 菜要不要来一个”的提问方式来扩充对话，对之前同伴培训的技能逐渐能独立运用。

相较于第一轮毫无章法的自由发挥而言，文字脚本的使用也增添了同伴间的对话机会，并在脚本基础上，也同伴能对当前活动进行扩展，如 P2 在“看医生”游戏中，用手探对方额头，P3 在点餐游戏中，扮演服务员时，拿出纸笔记菜名。这更加充实了游戏内容，自闭症谱系障碍儿童的参与度也有所提升。

2、自闭症谱系障碍儿童社交沟通情况

笔者同样对本轮研究中，被试 ABC 三人的社交发起、社交回应、同伴提示次数做了记录，如表 5.4 所示。

表 5.4 观察记录表 2

互动类型 / 对象	社交发起（次数）		社交回应（次数）		同伴提示（次数）	
	看医生	点餐	看医生	点餐	看医生	点餐
A	5	8	14	18	15	20
B	6	4	17	13	19	21
C	8	9	20	19	18	16

课后：在本轮研究结束时，三名同伴逐渐体验到同伴主导的成就感，活动结束时有同伴表示“玩不够，还想玩”。笔者观察到，各同伴在日常生活中也会对自闭症谱系障碍儿童多加关注，偶尔会将习得的“引起注意”“扩充对话”用于日常生活，也会在时常在课间邀请对方加入游戏。

（四）反思

此轮研究的可取之处在于，同伴主导的游戏活动，教学设计一定要可操作化，要有清晰的讲解与示范。采取脚本的方式，代替了传统的成人提示，学生互动过程更加流畅。但以下几个方面仍需改进：

第一，提示策略的更改。虽然脚本的使用使得成人的口头提示有所减少，教师为了避免干扰也尽量使用肢体动作提示。但笔者发现，同伴在互动过程中，对教

中国知网 https://www.cnki.net

师的依赖性较强。要达到同伴支持的要求，成人提示应逐步退出，因此，提示策略亟需做出更改，在下一轮研究当中，教师的口头和动作提示尽量减少，并增加视觉提示，将用于提示的图片张贴在教室休闲活动区域，图片上的策略根据活动具体设计，方便同伴更好的使用各项技能。

第二，辅助策略的多元化。此轮研究让笔者深刻领悟到培智儿童的教学一定要直观形象。仅以文字脚本的形式呈现，学生来进行扮演，起初效果较为明显，但对于较为复杂的对话，自闭症谱系障碍儿童未能很好掌握。因此，在下一轮研究中，笔者将采取脚本结合录像示范的方式来进行，以更直观清楚的方式来呈现。

三、第三轮行动研究

（一）计划

第三轮行动研究的内容包括第二单元“社区生活”中的“存取钱”以及第三单元“休闲娱乐”“绘画涂色”。本轮行动研究在提示和辅助策略上，很大程度汲取了前两轮的经验教训。

首先，在提示策略上，本轮新增加了图片提示的方式，笔者针对同伴在前两轮出现的情况制作了视觉提示卡，用于在活动中进行提示，并且在同伴所在班级的教室进行展示，便于同伴复习巩固。吸取前两轮研究的经验教训，为达到同伴支持的标准，将辅以最少提示的原则，即在游戏进行中，成人需做到：（1）当自闭症谱系障碍儿童有主动回应时不给予提示；（2）当自闭症谱系障碍儿童超过 5 秒无回应时，才给予角色对白内容及动作的提示，由最少到最多包括使用“视觉提示（图片）——肢体提示——口语提示（对白）——示范”；（3）当研究对象离开游戏区域到其他处时，需引导其回到游戏区域继续游戏；（4）在游戏过程中同伴之间发生争执，有人情绪失控时，此时暂停游戏，成人介入，待情绪平复之后继续游戏。

其次，在辅助策略上，为了使得能更好吸引学生注意力，以更加直观形象的方式展示，本轮研究采取录像示范的方式来进行。用于录像示范视频是根据本轮游戏“存取钱”“绘画”内容，笔者与同专业同学一起拍摄视频进行示范。

最后，在活动形式上，前两轮研究笔者已初步探索出了需先进行团体教学，再培训同伴，培训依然按照“引起注意——恰当回应——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话”的要点进行，最后由同伴主导，兼顾成人辅助，即“录像示范———团体教学——同伴主导（教师辅助）”的形式。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.4 用于提示同伴的图片

图 5.5 物理环境创设图片

图 5.6 部分示范视频截图

（二）实施

在本轮主题游戏活动中，由于使用的是教师本人参与拍摄的录像，学生们事先并不知情，在展示视频时同学们都感到十分兴奋，观看时注意力较为集中，在教师展示视频之后便迫不及待想要模仿。

首先，通过观看视频内容，学生对游戏内容有了大致印象过后，再进行团体教学和同伴培训，以及教师的现场示范。通过多次同伴培训，三位同伴逐渐对自己在每次游戏中扮演的角色有了较为深刻的认识，但在方式方法上还存在问题，

中国知网 https://www.cnki.net

针对此前频繁出现的问题，本轮研究笔者增加视觉提示图片，向同伴讲解每张图片含义过后，尽量用图片进行提示。图片的使用降低了教师使用言语、动作提示的频次，避免了频繁中断游戏活动所带来的不良影响。

其次，在“绘画涂色”游戏中，学生对教师准备的涂色画本表现出极大兴趣，大家对教师在视频中所展示的如何发起邀请、要求物品、展示物品，模仿积极性也很高。但是，在同伴主导的“存取钱”游戏环节，明显感到部分学生互动卡壳，游戏内容的选取，很大程度影响了互动效果。由于部分学生没有独立存取钱的经验，不熟悉流程，加之用于示范的视频角度不够清晰，有学生看到视频里面出现钞票，就与之前进行过的“购物”游戏产生混淆，注意力也开始出现游离。

图 5.7“绘画涂色”及存“存取钱”游戏图片

（三）观察

课堂中：本轮的主题游戏活动总的来说大家参与度较高，气氛很活跃，每次教师在呈现视频时，学生注意力都很集中，积极发言说出看到的画面，大家对于录像示范这种形式似乎十分乐于接受，尤其是自闭症谱系障碍儿童，会主动要求再看视频。

1、同伴支持情况

由于在提示策略上，教师使用了视觉提示卡，同伴也更加清楚应该怎么做，对于如何引导自闭症谱系障碍儿童参与游戏也更为熟练，此外，笔者在活动结束过后将视觉提示图片张贴在教室墙壁上，用做环境创设，便于同伴时常能看见，潜移默化中巩固复习。

笔者观察到，在进行“存取钱”游戏时，学生的注意力并不是很集中。可能是由于大家前备经验不够充足，学生感到游戏内容不够有趣，道具也比较单调，吸引力不够。P1 跟 A 互动时，A 有时漠然注视地板，即使在观看视频时也有走神，

中国知网 https://www.cnki.net

同伴 P1 开始烦躁不安，开始抱怨“他根本就不听我话”；在 P2 与 B 互动过程中，P2 对于 B 在游戏道具上乱涂乱画的行为没有及时制止，并跟笔者反映“存取钱”游戏不够好玩；在 P3 跟 C 互动 ，C 开始离开座位，在教室里面翻箱倒柜，经 P3 大声提醒过后才有所改善。

2、自闭症谱系障碍儿童社交沟通情况

本轮研究中自闭症孩子的社交发起、社交回应、同伴提示情况如表 5.5 所示。

表 5.5 观察记录表 3

互动类型 对象	社交发起（次数）		社交回应（次数）		同伴提示（次数）	
	存取钱	绘画涂色	存取钱	绘画涂色	存取钱	绘画涂色
A	7	10	19	22	29	26
B	6	8	21	24	17	21
C	13	11	20	26	22	28

课后：笔者观察到受训同伴会偶尔去看贴在墙上的视觉提示卡片，口中也会念念有词“不能骂人”、“要微笑”，而教室环境创设的目的就是为了让同伴支持的想法深入人心，在三名同伴的日常生活中，张贴视觉提示卡片便于他们经过、抬头就可以看见，在潜移默化之中就能够加深同伴的印象。

（四）反思

学生注意力集中与否，跟学生的前备经验、活动形式的设计、活动内容都有很大关系。关于本次行动研究，笔者主要的反思有以下几点：

第一，循序渐进。考虑到部分游戏内容学生理解较为困难，因此应遵循“小步子”原则，循序渐进，信息量过大导致自闭症孩子接受不了，切忌急于求成，下一轮笔者将对游戏内容也增加相应视觉提示。

第二，活动材料应重点突出，直观具体。学生在观看“存取钱”示范视频时，动作幅度不够明显，且拍摄角度不够清晰，导致部分学生很难读取视频信息。因此在下一轮研究当中，笔者将吸取教训，在拍摄示范视频时突出重点，直观具体，便于学生理解。

第三，在形式、内容上增加趣味性。在本轮研究中笔者观察到学生对“存取钱”游戏的兴致明显不如“绘画涂色”游戏高。在下一轮研究中，笔者将从内容和形式上增加游戏趣味性。

第四，增加试教环节。通过观察发现，在进行同伴培训时，通过教师讲解示范、角色扮演，同伴在教师引导下能顺利练习，但在同伴主导环节仍存在遗漏，因此在下轮研究中将增加“试教”环节，加深印象。

第五，增添额外的同伴培训，巩固强化。在前几轮研究当中，笔者只是在活

中国知网 https://www.cnki.net

动结束之后对同伴的总体表现作出点评，并未对同伴存在的问题进行培训，而是遗留问题，将额外培训放在下一次活动中，不具备时效性。因此在下一轮研究中笔者将在每次活动结束之时，及时增添额外的同伴培训，确保时效性。

四、第四轮行动研究

（一）计划

鉴于第三单元“休闲娱乐”的内容还没有完成，故本轮行动研究的游戏活动内容为“积木”和“拼图”。根据前三轮行动研究的经验，本轮行动研究在活动材料、活动形式、及教学原则上都做出了相应改进。

首先，活动材料的改进。通过前一轮的实践，录像示范能够很好地吸引学生注意力，因此本轮研究延用录像示范的方式进行团体教学和培训同伴，视频仍由笔者和本专业同学示范，笔者在视频拍摄上做了调整：一是动作幅度放慢，清晰呈现；二是利用短视频 APP，给人物加上动画头像，增加趣味性。视频画质清晰，将游戏内容进行了直观、具体、生动、形象地展示。

其次，活动形式的调整。鉴于前几轮研究中培训同伴都是放在每次活动前，即时性不强，因此在本轮中将在每次游戏结束后再对同伴进行额外技能的培训。此外，为使得同伴更好掌握各项技能，新增“同伴试教”环节，便于及时纠错，及时强化练习。即整体按照“录像示范———团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——额外培训”的模式来进行。

图 5.8 用于示范的动画头像视频（部分截图）

最后，遵循循序渐进原则。鉴于上一轮经验，视觉提示图片的使用效果较好，在本轮研究中笔者对提示图片进行了扩充，除了用于提示同伴的图片之外，还增

中国知网 https://www.cnki.net

添了与游戏内容相关的视觉提示图片，对游戏内容进行提示，便于同伴更好地引导自闭症谱系障碍儿童，循序渐进地进行活动，图 5.9 为积木游戏中所使用视觉提示图片。



图 5.9 积木游戏所使用视觉提示图片

（二）实施

第三单元的游戏内容趣味性较强，用动画人物进行录像示范，极大地激发了学生的兴趣，尤其是自闭症谱系障碍儿童，在观看视频时十分专注。

首先，在进行同伴培训时，除了按照“引起注意——恰当回应——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话”的要点进行外，还对用于提示同伴的图片进行了复习。

其次，与之前不同的是，本轮在对每个要点进行培训过后，新增了一个试教环节，每一个技能同伴跟教师进行练习过后，再对自闭症谱系障碍儿童进行试教，掌握过后再进入下一技能培训。增加试教环节过后，可观察到同伴对各项技能的运用更加有针对性。

第三，关于游戏内容的视觉提示图片的使用也能激发学生兴趣，在教师出示图片之后，就有学生迫不及待根据图片提示开始游戏。

最后，针对每次游戏出现的不恰当行为，在结束的时候当堂对同伴进行额外培训，及时强化巩固，笔者针对在活动中出现的 P3 与 C 出现争夺积木的情况，对 P3 进行“学会分享，融洽相处”的额外培训，针对 P2 与 B 互动过程出现的“你真笨”等负面用词，进行纠正，教师再次与同伴进行情景演练，教导同伴应耐心引导，以鼓励为主。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.10 搭积木、拼图活动照片

（三）观察

课堂中：总的来说，学生对于以动画头像展示的视频关注度更高，在教师出示视频时，有学生看到动画头像后直呼“真好玩”，从这一点可以反映出学生对活动材料的喜爱。自闭症谱系障碍儿童能够对视频中所呈现的动作、对话进行直接的模仿，但停止观看录像后，会出现无所适从的情况，同伴引导就发挥了重要作用。

1、同伴支持情况

笔者观察到三名同伴对所培训的各项要点，在使用时频率、流畅度上都有所提升，尤其是在“示范帮助”上，三名同伴都更为频繁地要求自闭症谱系障碍儿童关注自己，时常跟对方说“看我的”“我来教你”，例如在 P1 跟 A 互动过程中，P1 未再出现不耐烦情绪，语调温和，多次耐心示范，直至 A 学会为止；P2 跟 B 互动过程中，为了让 B 观察得更清楚，P2 还多次要求 B 到身边来；P3 跟 C 互动过程中，P3 逐渐领略到“当小老师”的乐趣，热衷于纠正 C 做得不恰当的地方。此外，在“轮流等待”上，三名同伴也更加愿意给自闭症谱系障碍儿童机会，告知其“轮到你了”，并经常鼓励“来试一下”，由多处细节上可见同伴对于各项技能的运用更为熟练，同伴培训效果显著，相应地，教师介入的情况也有所减少，同伴越来越能够独立引导游戏。

2、自闭症谱系障碍儿童社交沟通情况

本轮研究中笔者观察到的 ABC 三人的社交发起、社交回应、同伴提示情况如表 5.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.6 观察记录表 4

互动类型 对象	社交发起（次数）				社交回应（次数）				同伴提示（次数）			
	搭积木		拼图		搭积木		拼图		搭积木		拼图	
	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
A	7	5	8	9	17	18	20	19	21	28	24	30
B	8	11	7	10	28	23	26	30	31	30	24	22
C	14	11	13	14	23	26	31	28	29	25	17	19

注：编号①②代表该内容下第一次、第二次课

课后：经过多次共同游戏，笔者观察到自闭症谱系障碍儿童对于同伴的接纳程度有所提升，尤其是 A，由一开始的习惯侧坐回避同伴，变得不再逃避与同伴目光接触，姿态更放松自然，偶尔还会主动与同伴结伴回教室。除此之外，还观察到自闭症学生乐意模仿同伴行为，如在食用完教师奖励的糖果后，在 P3 将包装纸扔进垃圾桶过后，C 未经提示，也主动扔掉垃圾，这说明同伴“示范”的效果显著，并能够泛化至其他情境。

（四）反思

首先，第四轮行动研究的效果说明了“录像示范———团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——额外培训”的同伴支持活动形式对于改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍具有良好效果。增加动画元素的视频能对学生注意力的保持及促进学生模仿都颇具成效。经过改进，新增加“同伴试教”及每次活动结束过后的“额外培训”，督促同伴多次练习各项技能，在反复中加深印象。同伴们在这种活动形式中逐步掌握同伴支持的要领，对于该如何支持自闭症谱系障碍儿童有了更深入理解。

其次，经过几轮研究探索，已初步得出较为有效的同伴支持活动形式，但仍有需进一步改进的地方。在本轮研究中，笔者每次对同伴进行额外培训前，先要求同伴总结今日表现，本意是督促同伴自我反思、纠错，但实施效果却不尽如人意，同伴为了得到奖励，在总结时皆表示“我今天完成得很好”，并未反思到自身不足之处。为便于同伴更好地进行自我评价、反思，在下一轮研究中，笔者将对活动过程中的不恰当行为及时录像、拍照记录，同伴观看过后再进行自我评价，最后针对性地进行额外培训。

中国知网 https://www.cnki.net

五、第五轮行动研究

（一）计划

第五轮行动研究的游戏活动内容为第四单元“寻求帮助”以及第五单元“打接电话”。具体包括“问路、乘车”、及“拨打求救电话、给亲朋好友致电”与社交沟通密切相关的内容，本轮研究历时两周。

首先，历经前四轮研究的不断调整，笔者已经得出较为有效的同伴支持活动形式。即按照“录像示范———团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——额外培训”的流程，教师作为协助者全程参与，且较之口头阐述，学生们更喜欢观看趣味生动的视频。因此，学生观看视频过后教师再要求模拟练习，能提高学生积极性。

其次，鉴于上一轮研究中，进行额外培训时，同伴自我反思不够到位，在本轮活动中，笔者将采取对活动过程进行录像、拍照的方式，记录同伴的不恰当行为，在互动结束后对同伴进行针对性培训。即采取“录像示范——团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——同伴自评——额外培训”的方式。其中“同伴自评”环节要求同伴观看自身“不恰当行为”的视频或照片，加深印象，再由笔者进行纠正，针对性练习。

（二）实施

首先，本轮研究的活动活动内实用性强，贴近生活，对学生的认知水平则也提出了更高要求。通过笔者与学生的交谈、观察，“乘车、问路”所模拟情境选自学生较为熟知的地点和公交线路。大部分学生都有去过，离特校不远的人民医院和永辉超市。“打接电话”则参考教材，模拟遇坏人、遇火灾、生病等情境下拨打110、119、120求救电话，以及与亲朋好友的日常通话。鉴于学生普遍对带动画头像的示范视频很感兴趣，本轮依旧采取该方式，并针对不足之处做了调整，在拍摄时做到声音洪亮、动作明显，且对教学材料视频进行了慢放处理，使人物之间的动作更加清晰明了，有利于学生更好地捕捉信息，便于观察学习。

其次，经过多次课程的磨合，三名同伴对整个同伴支持的流程有了较为明确的认知，在观看视频之后常会主动要求与教师练习，且随着同伴之间的熟悉程度加深，自闭症谱系障碍儿童配合度明显提升，增加“同伴试教”环节后，在后续“同伴主导”活动时，同伴间互动也更为流畅，而同伴对成人提示的依赖显著地也有所减少。

最后，为了准确捕捉同伴出现的“不恰当行为”，在同伴试教和主导环节，教师对互动过程进行录像，最后截取出现“不恰当行为”的录像片段给同伴多次观看，让其自我总结。在观看录像之后，P1意识到自己推搡A的行为错误，P2也表

中国知网 https://www.cnki.net

示“他不听我的，我也不该对 B 这么凶”，有了录像辅助，同伴能反思到自身存在的问题，加深印象过后再进行额外培训，更具有针对性。

（三）观察

课堂中：本轮行动研究中几次活动均较顺畅、愉快，笔者还观察到 P2、P3 喜欢观看用于自评的视频片段，在活动前常提醒教师记得拍摄视频，看见自己出现在画面中会异常兴奋、专注，因此教师将视频也作为强化物，引导同伴好好表现，在最后奖励学生观看视频，这也可以反应出学生对这种方式的认可。

1、同伴支持情况

随着三名同伴对互动技巧的运用更加娴熟，游戏活动过程中的互动更加流畅，此外，同伴还能根据游戏内容活跃气氛，调动自闭症谱系障碍儿童的积极性。例如在“打接电话”游戏中，P1 根据自己以前观看过的拨打求救电话有关电视剧情节，对游戏内容进行发散，语气生动，增加了游戏趣味性，很好地吸引 A 的注意力，也提升了 A 参与游戏的积极性；而 P2 跟 B 互动时，除了完成教师所准备互动内容外，在模拟与朋友打电话时也能自然地过渡到日常话题，增加了与 B 的互动机会；在“问路、乘车”游戏中，P3 模仿公交车报站“前方到站 XX，请抓好扶手”，继而模仿公交车左右晃动，抓扶手动作，惹得 C 大笑，跟着模仿。

2、自闭症谱系障碍儿童社交沟通情况

而笔者发现经过多次同伴支持活动，自闭症谱系障碍儿童在教师和受训同伴之间，更倾向于与同伴交流。表 5.7 对本轮研究中自闭症谱系障碍儿童社交发起、社交回应、同伴提示次数也做了详细记录。

表 5.7 观察记录表 5

互动类型 / 对象	社交发起（次数）		社交回应（次数）		同伴提示（次数）	
	寻求帮助	打接电话	寻求帮助	打接电话	寻求帮助	打接电话
A	8	10	19	20	30	31
B	11	13	28	31	19	19
C	13	16	33	29	22	20

课后：经过几轮同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究，笔者观察到在同伴支持活动结束过后，同伴及自闭症谱系障碍儿童回到原班级，仍能在其他情境中维持积极互动，同伴在在日常生活中会对自闭症谱系障碍儿童多加关照，例如同伴会提醒其上课回教室、拿语文书等，也能得到自闭症谱系障碍儿童的积极回应。此外，在课间玩耍及体育课自由活动时，相较于原班级其他同学，自闭症谱系障碍儿童也更加倾向于与主动与受训同伴结对，这也反应同伴支持效果良好。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）反思

经过多次活动的巩固练习，同伴不仅对“引起注意——恰当回应——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话”六个要点基本掌握，还能根据每次活动出现的“不恰当行为”，及时纠错，积极配合教师练习。本轮行动研究不论是互动效果，还是活动氛围，同伴对各技巧运用程度，都显著优于前几轮。此外，对培智学生而言，越直观具体的展现方式，以行为层面为主的游戏活动内容设计，更有助于学生理解。多次活动表明，在特殊教育学校中，以特殊儿童作为受训同伴，改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍，同样能取得良好成效。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 研究结果分析

一、行动研究概况

在特殊教育学校中实施的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究顺利结束，经过为期三个月的探索，笔者在行动研究过程中不断地修改、完善，历经五轮行动研究，三名被试 ABC 的社交沟通障碍得到有效改善，也发展出由特殊儿童执行的的同伴支持较为成熟、完整的活动形式。每轮行动研究的课时安排、活动内容以及活动环节如表 6.1 所示。

表 6.1 行动研究概况

行动研究程序	时长	活动内容	活动形式
第一轮	2 周	第一单元	培训同伴———同伴主导
第二轮	2 周	第二单元	团体教学———培训同伴——同伴主导（教师辅助）
第三轮	2 周	第二单元 第三单元	录像示范———团体教学——培训同伴——同伴主导（教师辅助）
第四轮	3 周	第三单元 第四单元	录像示范———团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——额外培训
第五轮	2 周	第四单元 第五单元	录像示范——团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——同伴自评——额外培训

通过本次行动研究，最终探索出了一系列完整的由特殊同伴支持，有效改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的活动形式，即“录像示范——团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——同伴自评——额外培训”。

笔者根据在每次活动中观察到的各被试的社交发起、社交回应及同伴提示次数，利用 Excel 绘制了折线图，横坐标为“活动次数”，纵坐标为“该行为发生次数”。（如图 6.1—图 6.6 所示），笔者将结合折线图呈现的结果和行动研究过程中的所见所思进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

二、各被试社交沟通障碍改善情况



图 6.1 被试 A 社交发起、社交回应、同伴提示次数折线图

如图 6.1 所示，随着活动次数的增加，被试 A 的社交发起、社交回应次数有所增加，尤其是社交回应，变化较显著。根据《自闭症儿童基本沟通行为量表》的初测结果及在同伴支持初期的表现，被试 A 会重复他人的语言，回应几乎都是仿说且比较简短甚至无回应，甚少与人交流。在实施同伴支持过后，被试 A 在社交发起、社交回应及同伴提示上发生以下变化：

在社交发起上，从折线图记录次数上看，被试 A 的进步不大明显，但通过笔者在活动过程的日常观察，A 在表达需求、打招呼等社交发起行为方面，也有积极变化。在同伴支持中后期，A 时常会主动提醒“该下课了”，由一开始逃避与笔者接触转变为每次主动说“你好”、“再见”。

在社交回应上，在同伴支持初期，被试 A 对于同伴发起的互动，回应很少甚至没有，多在同伴要求被试 A 拿物品时会有相应动作，几乎没有口语回应。在实施同伴支持的中后期，被试 A 回应同伴及研究者的内容逐渐增加，偶尔还会回应完整句子，对同伴关注度也有所提升，特别在同伴进行示范、演示过后，也乐于模仿。

在同伴提示上，从图 6.1 可看出在同伴支持初期，同伴提示次数呈现上升趋势，可见同伴 P1 通过培训、练习，逐渐开始掌握同伴支持的各项技能，在中后期，同伴 P1 对被试 A 的提示仍维持较高水平，这一方面反应了同伴 P1 对各项支持技能的掌握日益娴熟，另一方面反应了被试 A 能力还有所不足，仍然需要同伴较多提示。笔者认为这与被试 A 的认知水平密切关联，在研究过程中笔者发现，被试 A

中国知网 https://www.cnki.net

认知水平有限，尤其是抽象思维较差，对于较复杂的指令，理解困难，需要同伴反复提示才能进行互动。



图 6.2 被试 B 社交发起、社交回应、同伴提示次数折线图

如图 6.2 所示，可以看出被试 B 的社交发起、社交回应进步明显。根据初测结果及初期表现，被试 B 能够重复他人的语言，有仿说能力，但较少主动与人交流，自言自语情况较多，常以动作来代替口语，目光注视和回应较少。被试 B 在社交发起、社交回应及同伴提示上发生以下变化：

在社交发起上，从发起次数上可以观察到较明显的上升趋势，随着活动次数的增加，被试 B 使用口语发起互动的情况有所增多，尤其体现在分享方面，乐于主动向同伴分享自己感兴趣的事物。在同伴支持的中后期，被试 B 时常主动向同伴 P2 描述自己喜欢的《熊出没》《奥特曼》等动漫人物。

在社交回应上，从图中可以看出被试 B 回应方面进步明显。在非口语沟通方面，在同伴支持初期，被试 B 十分逃避与同伴及笔者目光接触，甚至会转身逃避，在中后期，被试 B 能够较为自然地与他人进行目光接触；在口语沟通上，被试 B 初期时常会选择忽视他人提问，在中后期，被试 B 能够较及时地口语回应，但在内容上需要同伴或是笔者提供比较适当的回应内容来将其拉回主题。

在同伴提示上，从图 6.2 可以看出对被试 B 的同伴提示呈现先上升后下降的趋势。结合同伴 P2 在活动过程中的表现，笔者认为这可以归结为随着活动次数的增多，同伴 P2 逐渐掌握各项技能，所以在同伴支持的前期至中期，提示次数增多，在后期，随着被试 B 社交沟通情况的改善，被试 B 不再需要大量提示，所以同伴提示的情况有所下降，这也从侧面反映了同伴支持有效改善了被试 B 的社交沟通障碍。

中国知网 https://www.cnki.net



图 6.3 被试 C 社交发起、社交回应、同伴提示次数折线图

由如图 6.3 可知，被试 C 在实施同伴支持过程中，社交发起跟社交回应情况都有明显提升。根据初测及前期表现，被试 C 会说简单的词语和句子，偶尔主动发起对话，但语音语调存在问题，C 倾向于用简单口语表达需求，有目光注视和回应且能够理解较复杂指令。在同伴支持过程中，被试 C 在社交发起、社交回应、同伴提示上发生以下变化：

在社交发起上，由图 6.3 可知，被试 C 的社交发起呈现积极的上升趋势。这与笔者在研究过程中的观察是一致的。在干预前期，被试 C 虽偶尔主动发起对话，但不能完整成句，且内容常脱离当前活动；在干预中后期，被试 C 主动发起对话时，句子长度有所增加，遇到问题时，也能根据当前活动，主动求助他人。

在社交回应上，由上图可见，上升趋势明显。在同伴支持初期，被试 C 时常忽略同伴的加入，自顾自玩耍；在同伴支持中后期，对于同伴邀请、示范等提示，能及时给予积极的回应，响应频率变高，且在进行回应以口语回应为主，吐词清楚，在回应时也能直视他人目光。

在同伴提示上，从图 6.3 可知，P3 对被试 C 的同伴提示先上升后下降。也同样说明同伴 P3 随着练习较好地掌握了同伴培训技能，在同伴支持后期，随着被试 C 社交沟通情况的改善，所需要的同伴在后期同伴 P3 的提示次数也相应地有所下降。

中国知网 https://www.cnki.net

三、社交沟通障碍总体改善情况分析



图 6.4 社交发起次数总体分析折线图

如图 6.4 所示，从实施同伴支持后各被试社交发起的总体趋势可以看出，三名被试的社交发起情况都有不同程度的提高，被试 B 跟被试 C 的社交发起改善情况稍好于被试 A，这与笔者在研究期间的观察相吻合。被试 A 除表达需求或打招呼以外，主动与人沟通意愿较小，表现出对物品比对人的兴趣更大；相较之下，被试 B 与被试 C 在主动发起时口语代替动作的情况有所增多，与同伴及研究者沟通的意愿也有所增强。总的来说，三名被试的社交发起情况都有所改善，但被试 B 跟被试 C 改善情况稍好于被试 A。



图 6.5 社交回应次数总体分析折线图

从图 6.5 可以看出，三名被试在实施同伴支持过程中，社交回应次数上都有不

中国知网 https://www.cnki.net

同程度的提升。但被试 B 跟被试 C 的社交回应情况从折线图看，改善情况明显好于被试 A,。在研究过程笔者发现，被试 A 认知水平相对较差，有时对于稍复杂的指令无法理解，需要多次演示，反复提醒才能有所回应，被试 A 常以动作代替口语回应；而被试 B 与被试 C 相对来说立即给予积极回应的频率更高，且主要以口语回应为主，在吐词的清晰程度及句子完整性方面较好。总而言之，三名被试的社交回应情况都有所改善，被试 B 与被试 C 的改善情况也稍好于被试 A。



图 6.6 同伴提示次数总体分析折线图

由图 6.6 可知，对被试 A 的同伴提示呈现上升趋势，且在后期维持在较高水平；而被试 B 跟被试 C 都呈现较明显的先上升后下降的趋势。从同伴提示前中期的上升趋势可以看出三名同伴对同伴培训的各项技能掌握程度有所加深；被试 B 跟被试 C 在同伴支持后期出现同伴提示有所减少的情况，这可以归结为被试 B 跟被试 C 能力的提升，社交沟通障碍得到有效改善，对被试 A 的同伴提示未出现下降趋势，这说明被试 A 的社交沟通障碍虽也得到改善，但对同伴提示的依赖性较强，其社交沟通能力还有待进一步提升。

综上所述，在特殊教育学校中实施同伴支持对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍具明显改善作用，但各被试的改善程度有所差异，而影响干预效果的影响因素也有很多，自闭症谱系障碍儿童自身能力水平、活动设计、同伴积极性等都有影响，在下文中，笔者将对重要影响因素进行讨论分析。

四、干预效果影响因素分析

在特殊教育学校实施同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的研究过程中，干预效果受多方面因素影响，导致各被试社交沟通障碍的改善情况参差

中国知网 https://www.cnki.net

不齐，现就其重要影响因素进行分析讨论。

（一）自闭症谱系障碍儿童自身能力的影响

从各研究对象的基本资料以及《自闭症儿童基本沟通行为量表》的初测结果可以得知，被试 A 的社交沟通能力最差，干预过程中，被试 A 在社交发起上进步较小，所需的同伴提示一直保持较高频次。而被试 B 跟被试 C 基本能力较好，经同伴提示后能维持互动，且观察到后期同伴提示有所减少，社交沟通仍保持较高水平。因此可以推断，研究对象自身的能力水平对干预效果有一定影响。笔者在活动过程中也发现，对于被试 A，需要多次提醒、并且重复示范多次，才会有所反应；而对于认知最好的被试 C 来说，同伴所说的话基本都能够理解，而被试 A 有时候表现出很茫然，不知所措，只能机械仿说。因此在对不同程度的研究对象进行干预时，要引导同伴根据对象的基本能力组织语言或者发出指令，如对于程度较重的被试 A，指令尽量简单明确，且都较为单一，如给我，坐下等，而对于能力较好的被试 C，可适当增加句子长度，督促其用语言回复。

（二）自闭症谱系障碍儿童情绪行为问题的影响

三名自闭症谱系障碍儿童有着不同程度的情绪行为问题，有时一旦出现情绪行为问题，就会持续很长时间，会出现不配合、拒绝参与游戏等行为。而导致三名自闭症谱系障碍儿童出现情绪问题的原因也各不相同，如被试 A 不喜欢轮流等待，如让其等待时间过长，就会出现争抢物品的情况，对后续任务也不配合；被试 B 在紧张时会出现不停拍手，模仿公交报站等刻板行为；被试 C 不喜欢被忽略，若教师没有给予其足够的关注，就会大吼大叫。因此，研究者在进行干预之前要充分了解研究对象在哪些情况下会出现情绪问题，从而尽量避免引发其情绪行为问题。

（三）同伴支持活动设计的影响

在干预过程中，笔者观察到，活动设计对互动情况影响颇大，尤其是在游戏内容、材料、形式上，几位研究对象对于操作性强、道具丰富、富趣味性的游戏，例如“搭积木”、“拼图”、“看医生”，参与积极性很高，对于“存取钱”这类前备经验较为缺乏，道具不够多样化的游戏则感到兴致缺缺。因此，在设计游戏活动时应综合考虑以上因素，在实施过程中及时调整活动设计，增加游戏对学生的吸引力。

（四）同伴积极性的影响

与自闭症谱系障碍儿童相比，三名同伴的都是班级里面的 A 层学生，认知水平较好，情绪行为问题较少，能够较好服从指令，但也偶尔会出现不配合的情况。影响三名同伴积极性的因素也各不相同，如对于 P1 而言，未得到被试 A 满意回应

中国知网 https://www.cnki.net

时会感到烦躁；对 P2 而言，活动时间安排在喜欢的手工课前会催促教师加快进度，态度敷衍。因此，研究者也需要充分了解同伴特点，合理调整，提升趣味性及针对性制定规则、采取不同激励方式来提升同伴的积极性。

综上所述，在特殊教育学校中实施特殊同伴支持来改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍，受自闭症谱系障碍儿童自身能基本力及情绪行为问题、活动设计、同伴积极性的影响。除此之外，学生前备经验、干预环境等因素也有一定的影响，在实施同伴支持时需要结合实际情况综合考虑，灵活调整。

五、社会效度分析

行动研究结束后，笔者对三名自闭症谱系障碍儿童的教师与家长进行了访谈，了解本研究的社会支持度，验证本行动研究的社会效度。

从对家长的访谈结果来看，三名被试的家长皆十分认可同伴支持这种干预方式。被试 A 家长提到："我们平时也经常鼓励被试 A 多跟同龄人接触，会带他到小区跟其他孩子玩，这段时间也能感受到他的进步，最近在家他经常主动拉着妹妹一起玩"开心消消乐"。"被试 B 家长也表示："被试 B 最近进步很大，比如他会主动说'我要 XX'。面对他较熟悉的人，基本上都能明确表达自己的需求，比如说'我要看动画片'。"被试 C 家长："有感觉到他最近话有变得多一些。"三位家长都表示在今后会考虑带孩子们多跟同伴接触。

从对教师的访谈结果来看，三名被试所在班级的班主任也赞同本研究同伴支持的干预方法。被试 A 老师表示："以前他只跟特别熟的老师、同学才打招呼，最近发现他对其他班的同学也偶尔会主动打招呼"。还表示经过同伴支持过后，被试 A 除了在眼神注视跟回应以及注意力上有较大进步外，其情绪问题行为也有所减少。被试 B 的班主任老师提到："以我的观察来讲，被试 B 的进步是很大的，经过同伴支持后，被试 B 在学校中的社交回应行为有明显进步，社交发起行为也有进步，比如说他现在会主动加入同学们的游戏，下课也会跟同学打闹，以前他都是自己在座位上画画的。"被试 C 的老师表示："在学校被试 C 的口语比以前好了很多，他以前经常发出一些无意义的音节，主动发起一些有意义语言的比较少，眼神注视情况也比以前要好。"三名被试的老师都表示，在未来教学及学校生活中会考虑积极利用同伴资源，采取"结对子"的方式，来帮助自闭症谱系障碍儿童更好地融入学校生活。

从笔者自身观察经验来看，大家都较喜欢去上同伴支持活动课，尤其在干预的中后期，参与度特别高。在干预初期，从教室带走被试略困难，尤其是被试 A，起初还会乱跑。一段时间过后，只要笔者出现在教室门口，被试们及三名同伴都会主动朝我走过来，在活动过程中，同伴之间的相处也越来越融洽。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，本研究具有较高的社会效度。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 研究结论与建议

一、研究结论

（一）在特殊教育学校中实施的同伴支持能够改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍

在特殊教育学校中实施同伴支持，由成人提供同伴支持的方式方法，通过角色扮演、情境模拟来进行练习，经培训再后由受训同伴主导游戏，同伴跟自闭症谱系障碍儿童能从游戏活动中练习社交沟通技能，研究过程中成人干涉慢慢减少，最终能实现同伴独立引导和帮助自闭症谱系障碍儿童。通过观察、访谈等多元资料收集的结果显示，三名自闭症谱系障碍儿童在社交发起、社交回应上都有了不同程度及不同方面的改善。在特殊教育学校中培训特殊儿童作为受训同伴来改善自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍同样具有有效性。

（二）游戏活动为适合于同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的支持形式

通过本次行动研究，笔者也探索出了一系列完整的在特殊教育学校中实施同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的有效游戏活动形式，即“录像示范——团体教学——培训同伴——同伴试教——同伴主导（教师辅助）——同伴自评——额外培训”。

首先，“录像示范”的视频，可以以真人或动画形式呈现，但需遵循直观性、吸引性、具体性原则。视频要清晰直观，并针对学生喜好，视频要具有趣味性，可以添加学生喜爱的动画元素，语气语调上要生动，想办法吸引学生注意力，视频内容根据活动内容紧扣主题。

其次，“团体教学”环节，对同伴跟自闭症谱系障碍儿童都要讲解每一次的活动内容，仅靠视频展示，学生们尤其是三名自闭症谱系障碍儿童很难对活动内容完全理解，因此，由教师来主导的团体教学环节成为连接同伴支持活动内容与学生理解的重要桥梁。考虑到培智学生的特点，教学用语应尽量做到简洁性、直观性、准确性。

第三，“培训同伴”、“同伴试教”环节，是按照事先确立的同伴培训方案中的内容对同伴进行社交沟通技能的培训，通过与教师角色扮演、情景模拟练习，再通过试教巩固强化，纠错，目的是能使同伴更准确运用各项技能，降低成人提示的频率。

第四，“同伴主导（教师辅助）”环节，由同伴担任主导者进行游戏活动，给

中国知网 https://www.cnki.net

予自闭症谱系障碍儿童适当提示，出现突发状况时教师再进行干涉，确保活动顺利进行，以期自闭症谱系障碍儿童在与同伴过程中也能提升社交沟通能力。

最后，“同伴自评”跟“额外培训”环节，在每次活动结束之后，教师带领同伴观看自身出现“不恰当行为”的视频片段及照片，督促其进行自我评价、自我反思，再根据出现的问题增加额外培训，针对性练习，鞭策同伴进步。

综上所述，适用于同伴支持的游戏活动包含以下特点：①游戏活动设计应该贴近现阶段学生能力与认知水平，同时能满足同伴间进行社交沟通互动的需要。②活动所采用的实物、视频等材料要做到直观、具体、有吸引力。③在同伴进行主导活动的前后都要进行培训，强化练习，根据所出现的问题还要及时进行调整，随机应变，目的是为了使同伴最终能基本独立主导与自闭症谱系障碍儿童进行互动，将成人干涉的影响降到最小化。

(三)同伴培训使受训同伴协助自闭症谱系障碍儿童的沟通支持能力提高

同伴培训之后，三位同伴都较能了解自闭症谱系障碍儿童的特质，从而调整自身互动方式，从支持前与自闭症谱系障碍儿童单一的口头互动方式发展到能较熟练运用口头、动作、口头加动作等多种互动方式。大家逐步学会了协助自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通的方法，如：“引起注意——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话——自然增强”等社交沟通技能，以及在每次活动结束后针对当时出现的问题及时增加额外的培训。大家对培训内容掌握之后，也有助于增强信心，对开展同伴支持的游戏活动也有一定的助益作用。三名同伴都知道在不同情形下该如何给予指导，并泛化至日常学习、生活中多种情境，量化和质性研究结果都表明，同伴培训使受训同伴协助自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通的能力得到提高。

（四）特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的效果受多重因素影响

从在不同游戏活动中表现出来的同伴支持效果来看，培训特殊同伴改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍，受自闭症谱系障碍儿童自身能基本力及情绪行为问题、同伴积极性、学生前备经验、干预环境、游戏活动设计等多方面影响。尤其是活动设计的内容、材料、形式对同伴间互动效果影响颇大。因此，在设计游戏活动时应综合考虑上述因素，在实施过程中也要及时发现问题、及时调整，并综合运用角色扮演、脚本、录像示范等多种辅助策略，以增加同伴间互动机会。

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究建议

（一）相关教学建议

1、将同伴支持纳入教学

根据本研究的研究结果，在特殊教育学校中实施同伴支持对改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍具有效性，且同伴是十分便利的资源，有效运用同伴资源在学校环境中也能减少教师压力。因此，研究者建议，在特殊教育学校中，有关教师可充分利用课堂上及课外多种情境，将同伴支持纳入教学，采用同伴支持策略事先培训同伴，再由同伴对自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通教学。

在各情境下都要充分考虑到同伴及自闭症谱系障碍儿童的现有能力、认知水平，教师要对其提供足够支持，比如，可为学生提供必要的说明讲解、肢体辅助、视觉提示卡、同伴示范协助等支持。教师在不同场景中也要给学生提供充足同伴交往机会，有意识地让同伴之间“结对子”，保证自闭症谱系障碍儿童能很好地与同伴练习社交沟通技能，并为学生提供及时地反馈。此外，教师在情境创设上考虑学生现有能力及需求，选择学生亟需提高的内容进行教学，做到真正满足学生需求，充分提高同伴协助能力、提高自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力。

总的来说，在特殊教育学校中实施同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍，将同伴支持纳入日常教学，教师可采取以下建议：

第一，依照出勤率高、有良好的语言表达跟理解能力、在校表现良好、与自闭症学生关系良好、注意力较集中的标准选取一名或多名特殊同伴。

第二，实施同伴支持活动前安排适当的同伴培训，如“引起注意——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话——自然增强”等社交沟通技能，并在活动中跟踪观察，适当增减培训内容，成人遵循“最少提示”的原则，适当给予口头或动作、视觉提示等辅助，教师逐步引导同伴能独立主导与自闭症谱系障碍儿童进行互动。

第三，教师应及时给予同伴与自闭症谱系障碍儿童适当强化，针对不同的对象，应采取不同的强化方式。例如对于年龄较小的同伴，可采取给零食、看动画片等方式进行强化，对于年龄稍长的同伴，可采取言语鼓励等方式。

2、互动情境应多元化

同伴支持活动要保证活动情境的多元化。《培智学校义务教育新课标（2016）》生活语文课程标准指出“在进行倾听与说话的教学时，要根据真实生活，设计教学活动，使用模仿、表演、示范、游戏等手段，结合学生生活情境体验来进行语

中国知网 https://www.cnki.net

言训练；为学生创造丰富的语言环境，提供充足的倾听和交谈机会”[①]。由此可见在社交沟通教学中情境的重要性。本研究也依据学生兴趣爱好、课标、教材内容以及教师问卷调查结果来设计的游戏活动，利用下午课时间在教室进行，但在游戏活动中所涉及的超市、医院、餐馆等情境上尽量做到采用实物或道具模拟真实情境。由于时间限制，本研究所涉及情境也有限，然而在校内、家中及其他多种情境中也不可避免的需要进行社交沟通，如食堂进餐、课堂学习、家庭聚会、户外游玩等。

建议在设计同伴支持活动时可以结合多种情境，避免单一、结构化，有条件的情况下最好在真实情境中进行。通过在不同情境中由受训同伴对自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通的训练，有利于自闭症谱系障碍儿童进行泛化，提升其在自然情景中的社交沟通能力，因此，同伴支持的互动情境应做到多元化。

3、同伴支持活动设计应合理化

在众多影响同伴与自闭症谱系障碍儿童互动效果的影响因素当中，同伴支持活动设计影响颇大，因此合理的同伴支持活动设计至关重要。在设计同伴支持活动时，教师可综合考虑以下建议：

第一，学生兴趣爱好。在设计活动前，对学生家长进行游戏偏好调查结合教师日常观察，将学生感兴趣的内容纳入其中。

第二，学生认知水平。所设计的同伴支持活动应遵循特殊学生身心发展规律，活动设计要兼顾不同障碍程度学生，尤其要考虑程度较差自闭症谱系障碍儿童的认知水平和知识体系，在同伴和自闭症谱系障碍儿童原有认知层面基础上，遵循小步子原则设计同伴支持活动，降低学生接收难度。

第三，学生前备经验。学生前备经验对同伴支持活动是否能顺利进行尤其重要，如涉及“购物”、“看医生”等符合学生前备经验，有过切身体验的活动，学生参与程度、配合度会更高，而对于前备经验较缺乏，学生未实际操作过的活动，如“存取钱”，学生参与热情会明显降低。因此，在设计同伴支持活动时，需从学生日常所见所闻出发，对学生进行深入了解，设计贴合学生日常生活，符合其前备经验的同伴支持活动。

第四，材料、形式的吸引性。同伴支持活动所涉及的材料、形式对学生而言要具有足够的吸引力。首先，在材料上，可选取操作性强、种类丰富的活动材料；其次，在形式上，可采取角色扮演、用动画人物录像示范等多种形式，增加对学生的吸引力。

总的来说，在进行同伴支持活动设计时要综合考虑学生兴趣爱好、认知水平、

[①]中华人民共和国教育部．教育部发布实施盲、聋和培智三类特殊教育学校义务教育课程标准. http://www.moe.gov.cn/was5/web/search?channelid=255182，2016-12-13.

中国知网 https://www.cnki.net

前备经验、活动材料及形式对学生的吸引力等多方面因素，这样的同伴支持活动实施起来才能保证同伴与自闭症谱系障碍儿童能产生良好互动效果，因此，同伴支持活动的设计应做到合理化。

4、加强与家长合作

根据对家长们的访谈结果，可以得知，各位家长对同伴支持这种干预自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的方法认可度很高，也意识到同伴执行的干预效果良好。自闭症谱系障碍儿童的兄弟姐妹亦可以作为同伴支持的榜样和示范者[①]，家人与自闭症谱系障碍儿童相处时间多，对孩子也有足够了解。因此，对于有兄弟姐妹的自闭症谱系障碍儿童家庭，可让家长参与到同伴支持策略教学过程中来，对家长进行培训，使家长掌握指导同伴“引起注意——给予选择机会——示范——轮流等待——扩充对话——自然增强”等社交沟通技能，再培训自闭症谱系障碍儿童的兄弟姐妹，由其兄弟姐妹来执行同伴支持，这样能够便于实现在不同的情境中进行泛化教学，从而更好地提升自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力。

5、同伴支持结合需其他干预方法使用

同伴支持虽是被美国国家自闭症中心（National Autism Center， NAC）、美国自闭症国家专业发展中心（National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders ，NPDC）等国际权威机构确认为符合循证实践的干预方法，众多国内外学者也相继将此方法运用于自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预当中，但有研究显示，单独使用同伴支持还不能充分提高自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力[②]。因此，同伴支持还需结合其他经循证实践证实有效的干预方法来使用，如与策略教学、自我监控、录像示范、戏剧治疗、关键反应训练、辅助沟通系统[③]等方法结合。结合其他方法运用，可以有效避免单独使用同伴支持所带来的一些弊端，例如，结合戏剧治疗法可以使得干预过程变得生动有趣；结合辅助沟通系统，可以更好地帮助沟通困难的自闭症谱系障碍儿童与同伴进行互动；结合关键反应训练，对提高自闭症谱系障碍儿童社交发起能力有益。建议根据研究对象及干预环境等特点，尝试将同伴支持结合其他干预方法。此外，在结合其他方法使用时，同伴需遵循四点原则：①与自闭症谱系障碍儿童互动；②提示自闭症谱系障碍儿童目标行为；③与自闭症谱系障碍儿童接触；④强化自闭症谱系障碍儿童的行为。

[①]Chapin, Shelley; McNaughton, David; Boyle, Susannah; et al. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review .2018;11:443-457

[②]National Autism Center.http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/phase-2/.

[③]Gunning, C., Breathnach, Ó., Holloway, J., McTiernan, A., & Malone, B. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings[J].Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019.6(1), 40-62.

中国知网 https://www.cnki.net

（二）未来研究建议

1、研究设计

本研究采用行动研究法，以就读在特殊教育学校的三名自闭症谱系障碍儿童及与之搭配的三名特殊儿童同伴为研究对象，探讨在特殊教育学校中实施同伴支持策略对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预成效。本研究所有的数据采集均在每次下午同伴支持活动过程中，对于三名自闭症谱系障碍儿童在其他情境以及其他时间段的表现并未详细观察了解，难以判断泛化效果。因此，在后续研究中，可在条件允许的情况下，研究者对多个情境、多个时间段的数据进行收集，进一步提高研究的信效度。

2、研究对象

（1）考虑特殊同伴的障碍类型

本研究在特殊教育学校所选取的三名特殊同伴皆为智力障碍儿童，两男一女。在选取同伴时着重考察了配合程度、社交沟通能力、认知水平等因素。但有关障碍类型、性别这样的潜在因素欠缺考虑。后续相关研究中，可选取不同障碍类型的儿童作为受训同伴，甚至可选取相似特质但程度较好的自闭症谱系障碍儿童作为同伴，甚至已有研究选取相似特质但程度较好的自闭症谱系障碍儿童作为同伴[①]，因此，在后续研究中，可选取不同障碍类型的特殊儿童作为同伴，比较不同障碍类型的特殊儿童作为同伴所产生的影响，在特殊教育学校环境中实施同伴支持，选取同伴时也需将障碍类型也纳入考虑因素。

（2）扩大受训的特殊同伴数量

由于时间限制，本研究仅为每名自闭症谱系障碍儿童选择了一名特殊同伴与之搭配，受训同伴经由教师推荐结合笔者观察选取，皆符合同伴标准，数量较少。但在研究过程中，笔者发现每名自闭症谱系障碍儿童原班级中，有其他同学自告奋勇也想担任同伴，参与研究的积极性很高。因此，在后续研究中，可适当增加符合条件受训同伴的数量，让更多的有意愿的同伴跟自闭症谱系障碍儿童进行互动。

3、研究内容

（1）多维度评量自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍改善情况

在研究内容上，本研究旨在探讨在特殊教育学校中实施同伴支持干预自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的成效。而对其社交沟通能力的评量，则通过每次活动中社交发起、社交回应、同伴提示次数来评量。且未将口语沟通、非口语沟通分开记录。在后续研究中，研究者可以将社交沟通能力的评量进一步进行划分，

[①]Chapin, Shelley; McNaughton, David; Boyle, Susannah; et al. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review.2018;11:443-457

中国知网 https://www.cnki.net

如社交发起、社交回应、社交维持与结束等多方面综合评量，并且分开记录口语沟通、非口语沟通的频次，从而更加系统地衡量自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍的改善情况。

（2）关注同伴社交沟通能力的提升情况

由于精力有限，本研究仅对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通改善情况进行了评量。已有研究指出，使用同伴支持策略，亦能够促进受训同伴在学业、认知、情感、社交等方面的进步[①]。在研究过程中，笔者也发现随着受训同伴对各项社交沟通技能掌握日趋成熟，他们在社交发起、社交回应等方面也有进步，三名同伴的社交沟通能力都有不同程度的提升。因此，在未来研究中，研究者也应系统性评量同伴社交沟通能力的提升情况，从社交发起、社交回应、社交维持以及口语、非口语沟通情况等方面进行观察记录，以全面了解实施同伴支持对同伴的社交沟通能力提升的具体效果。

三、研究局限

笔者对整个行动研究的过程进行了回顾以及反思，发现还存在着以下局限：

首先，活动时长略有不足。本行动研究历时三月有余，三组同伴各进行了十二次，共计三十六次的同伴支持活动，除去寒假与特殊教育学校集体活动的影响，同伴支持活动期间还包含笔者对同伴培训指导，因此相对来说，同伴支持活动时间略有所不足。

其次，观察的时间地点受限。本研究中的三名自闭症谱系障碍儿童分别来自不同的班级，笔者主要对同伴支持活动过程中的相关社交沟通、社交发起、同伴提示数据进行记录。由于研究对象回到各自班级过后，笔者观察时长有限，不能对自闭症谱系障碍儿童的社交沟通和同伴提示的情况做出全面的观察与记录，而对于学校之外的家庭、社区等环境中，也没办法亲自参与观察自闭症谱系障碍儿童的社交沟通表现。

最后，评量干预效果的信效度上，有待进一步提升。本研究所采用的是质性研究中的行动研究，主要是通过活动过程所收集的相关数据结合对家长、教师的访谈，来评量在特殊教育学校中实施同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通的效果，未进行更多维度地考察，在评量干预效果的信效度上，还有待进一步提升。

[①]Chapin, Shelley; McNaughton, David; Boyle, Susannah; et al. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review.2018;11:443-457

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

中文参考文献

著作

魏寿洪.自闭症谱系障碍儿童社会技能的评估与干预[M].北京:科学出版社,2017.

荆玲玲.社会研究方法[M].哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社.2016.

美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册[M].北京:北京大学出版社, 2016.

五彩鹿儿童行为矫正中心.中国自闭症教育康复行业发展状况报告[M].北京：北京师范大学出版社,2015.

世界卫生组织.国际功能、残疾和健康分类(国际中文增补版)[M].邱卓英,译.日内瓦:世界卫生组织,2015.

吕梦,杨广学.如何发展自闭症谱系障碍儿童的社会交往能力[M].第一版,北京：北京大学出版社，2013.

王攀峰.新世纪本科教材·行动研究的理论与方法[M].北京:首都师范大学出版社,2013.

杨晓萍.教育科学研究方法[M].重庆:西南师范大学出版社,2012.

杜晓新，宋永宁.特殊教育研究方法[M].第一版，北京：北京大学出版社，2011.

凯瑟琳·安·奎尔. ——做、看、听、说:自闭症儿童社会与沟通技能介入手册[M].杨宗仁，等，译.台北：心理出版社，2010.

钮文英.拥抱个别差异的新典范——融合教育[M].北京:心理出版社.2008.

魏惠萱.社会故事·特殊教育丛书：特殊教育现在与未来（9601 辑）[M].台中：台中教育大学特殊教育中心，2007.

张文京. 弱智儿童个别化教育与教学[M].重庆: 重庆出版社，2005.

丹尼尔·P·哈拉汉，詹姆士·M·考夫曼，佩吉·普伦著.特殊教育导论（第 11 版）[M].肖非等译,北京:中国人民大学出版社，2011.

期刊

陈墨.韦小满. 自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育,2013,(12):36-14

蒋婕,廖启云.我国残疾儿童教育现状探微[J].中国校外教育,2014(21):5+21.

田金来,张向葵.同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用[J].中国特殊教育,2014(01):35-40.

农志学,胡晓毅.运用同伴介入法提升学龄孤独症儿童社交能力的研究[J].现代特殊教育,2017(04):32-37.

李瑞锡,江开达,彭裕.孤独症研究新进展[J].复旦学报(医学版),2010,37(1):110-115.

中国知网 https://www.cnki.net

罗洁兰,郑宏智,谭健忠.同伴介入法辅助治疗儿童自闭症的临床疗效观察[J].临床合理用药杂志,2016,9(19):140-141.

李雪.同伴介入法应用于自闭症谱系障碍儿童社交能力干预的综述[J].现代特殊教育,2018(08):75-80.

连福鑫,王雁.融合环境下自闭症谱系障碍儿童社会交往同伴介入干预研究元分析[J].教育学报,2017,13(03):79-91.

魏寿洪.孤独症儿童社会技能评定量表的编制[J].中国康复理论与实践,2017,23(04):449-454.

邹小兵,邓红珠.美国精神疾病诊断分类手册第5版“孤独症谱系障碍诊断标准”解读[J].中国实用儿科杂志,2013,28(8):561-563.

潘素阳.“同伴介入”,提高自闭症儿童的综合能力[J].辽宁教育,2017(14):34-36.

陈静,韩宇翊.促进自闭儿童社交能力的空间设计策略研究[J].设计,2019,32(05):67-68.

魏寿洪,牟映雪.学前普通儿童与自闭症儿童社会互动现状及促进策略[J].学前教育研究,2017(06):40-48.

袁鹏.自闭症儿童主动沟通干预方法综述[J].开封教育学院学报,2017,37(06):182-183.

郭晓倩,李欢,杨爱佳,彭燕,汪甜甜.我国自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预研究的系统评价[J].现代特殊教育,2018(12):57-69.

杜青,何宏祥.孤独症谱系障碍儿童语言和社交沟通障碍相关问题[J].中国实用儿科杂志,2019,34(08):632-637.

郑群山,胡晓毅,刘全全.以同伴介入式游戏干预孤独症幼儿社交沟通的个案研究[J].现代特殊教育,2017(08):33-40.

魏寿洪,王雁.美国整合性游戏团体疗法在自闭症谱系障碍儿童干预中的应用[J].中国特殊教育,2015(03):39-45.

汤欣,汤颖.同伴介入法辅助治疗自闭症儿童的临床疗效观察[J].数理医药学杂志,2020,33(02):297-298.

张珍珍,连福鑫,贺荟中.小学随班就读自闭症谱系障碍儿童同伴关系现状研究——以浙江省杭州市为例[J].中国特殊教育,2019(09):28-34.

连福鑫,王雁.融合环境下自闭症谱系障碍儿童社会交往同伴介入干预研究元分析[J].教育学报,2017,13(03):79-91.

鲍慧娟,于素红.美国高功能自闭症青少年社交技能的教育与增进方案[J].中国特殊教育,2017(10):19-24.

学位论文

郭丽莎.普通小学随读自闭症儿童同伴介入的个案研究[D].四川师范大学,2015.

廖进.运用同伴介入法提升普小自闭症儿童社会交往的研究[D].重庆师范大学,2019

中国知网 https://www.cnki.net

阮蓝莹.同侪介入策略对增进国小高功能自闭症学生社会互动之研究[D].屏东教育大学，2013.

樊江琴. PRT 动机程序促进自闭症儿童社交发起的成效检验及成分分析[D].浙江师范大学,2016.

孙美丽，整合性游戏团体对提高自闭症儿童社会互动能力的个案研究重庆[D].重庆师范大学，2011.

曾欣怡.同侪中介教学与介入策略对高职普通班听觉障碍学生人际关系成效之研究[D].高雄师范大学,2009.

吴淑敏.同侪媒介暨社交技巧教学对增进自闭症儿童社会能力之研究[D].台湾师范大学,2003.

吕汉城.同伴介入对自闭症儿童社会交往能力提升的成效研究[D].长春理工大学,2019

叶琬婷.社会性故事融入整合性游戏团体对增进高功能自闭症儿童同侪互动之个案研究[D].台北师范学院,2004.

陈映羽.鹰架式游戏团体对低功能自闭症儿童沟通能力影响之研究[D].台东大学教育研究所,2004.

林欣桦.同侪支持方案对中度自闭症学生在融合情境中课程参与和社会互动效果之研究[D].台南大学，2010.

张月菱.以自闭症学童为同侪小老师对增进其社会互动之行动研究[D].彰化师范大学复健咨商研究所，2010.

蔡雅文.在例行性活动中运用同侪媒介策略增进国小普通班自闭症儿童沟通能力之行动研究[D].台北教育大学，2010.

董姵彣.同侪介入方案对增进国中轻度自闭症学生社会技巧之行动研究[D].台湾师范大学，2016.

彭燕.循证理念下录像示范法对自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预研究[D].西南大学,2019.

王颖.运用脚本干预法对自闭症儿童开展口语沟通行为干预的案例研究[D].华东师范大学,2016.

黄俊洁.社会故事角色扮演法干预自闭症谱系障碍儿童行为问题的研究[D].西南大学,2018.

张镇霖.同侪介入策略融入整合性游戏团体对国小自闭症儿童与同侪互动能力之研究[D].台北市立大学,2017.

会议文献：

齐红.图片交换沟通系统对一名无口语自闭症幼儿主动沟通行为的影响研究[A].中国心理卫生协会残疾人心理卫生分会第十二届年会暨中国残疾人康复协会精神残疾康复专业委员会第二届研讨会会议手册[C].,2018:9.

中国知网 https://www.cnki.net

外文文献：

Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. A., Cox, A. W., Fettig, A., Kucharczyk, S., . . .Schultz, T. R. Evidencebased practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: A comprehensive review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015,45, 1951–1966.

Rashed Aldabas: Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review, Early Child Development and Care.2019, 22(5):534-551.

Huber, H. B., & Carter, E. W. Data-driven individualization in peer-mediated interventions for students with ASD: A literature review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016,3, 239–253.

Chapin, S., Boyle, S., Babb, S., & McNaughton, D. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Seminars in Speech and Language.2018, 14(3):139-152.

Backer L D,Keer H V,Valcke M.Socially shared metacognitive regulation during reciprocal peer tutoring: identifying its relationship with students content processing and transactive discussions [J]. Instructional Science. 2015.43 (3):323-344.

Chapin, Shelley; McNaughton, David; Boyle, Susannah; et al. Effects of Peer Support Interventions on the Communication of Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review .2018;11:443-457

America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Arlington,VA:American Psychiatric Publishing.2013:47.

Wood C L, Mustian A L, Lo Y Y. Effects of Supplemental Computer-Assisted Reciprocal Peer Tutoring on Kindergarteners' Phoneme Segmentation Fluency[J]. Education & Treatment of Children,2013,36(1):33-48.

Thiemann-Bourque, K. S., McGuff, S., & Goldstein, H. Trainingpeer partnerstouse a speech–generatingdevice withclassmates with autism spectrum disorder: exploring commnication outcomes across preschool contexts.Journal of Speech,Language,and Hearing Research,2017, 60(9), 2648–2662.

Lee, S. H., & Lee, L. W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool. Topics in Early Childhood Special Education,2015, 35(2), 89–101.

Hundert, J., Rowe, S. R., & Harrison, E. The combined effects of social script training and peer buddies on generalized peer interaction of children with ASD in inclusive classrooms. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2014, 29(4), 206–215.

中国知网 https://www.cnki.net

Bellini, S., Gardner, L., Hudock, R., & Yashima-Ellingson, Y. The use of video self-modeling and peer training to increase social engagement in preschool children on the autism spectrum. School Psychology Forum: Research in Practice, 2016,10(2), 201–219.

Gunning, C., Breathnach, Ó., Holloway, J., McTiernan, A., & Malone, B. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019,6(1), 40-62.

Trembath D, Balandin S, Togher L, Stancliffe RJ. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism. Journal of Intellect Development Disability 2009;34:173–186 28

Watkins, L., O'Reilly, M., Kuhn, M.,Gevarter, C., Lancioni, G. E., Sigafoos, J., & Lang, R. . A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings. Journal of Autism and Developmental Disorders,2015,45,1070–1083.

Sperry,L., Neitzel, J. & Wells, K.E.Peer-Mediated Instruction and Intervention Strategies for Students with. Autism Spectrum Disorders,2010,54(4),256-264.

Odom, S. L., & Strain, P. S. Peer-mediated approaches to increasing children's social interactions: a review. American Journal of Orthopsychiatry, 1984,54, 544–557.

Oppenheim, M.L.Teaching Typical Developing Children to Promote Social Play with Their Siblings with Autism[J].Research in Autism Spectrum Disorders, 2012 (6) :777-791.

Neitzel, J. Implementation checklist for PMII: Elementary, middle, and high school. Chapel Hill, NC: The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, FPG Child Development Institute, UNC-Chapel Hill,2008,17:198-206

Nelson C, Nelson AR, McDonnell AP, Johnston SS, Crompton A. Keys to play: a strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers. Educ Train Dev Disabil 2007;42(02):165–181

Katz, E., & Girolametto, L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings. Topics in Early Childhood Special Education,2013,33(3), 133– 143.

Garcia-Albea, E., Reeve, S. A., Brothers, K. J., , Reeve, K. F.. Using audio script fading and multiple- exemplar training to increase vocal interactions in children with autism[J]. Journal Of Applied Behavior Analysis.2014,47（2）:325-343

Thiemann-Bourque K. Peer-mediated AAC instruction for young children with autism and other developmental disabilities. 2012;21(04):159–166

MacDonald R, Sacramone S, Mansfield R, Wiltz K, Ahearn WH. Using video modeling to teach reciprocal pretend play to children with autism. J Appl Behav Anal 2009;42(01):43–55

中国知网 https://www.cnki.net

Koegel, L. K., Park, M. N., , Koegel, R. L.. Using self. management to improve the reciprocai social conversation of children with autism spectrum disorder[J]. Journal Of Autism And Developmen tal Disorders. 2014,44 (5):1055-1063.

WHO.ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (2018) [EB/OL]. (2018-06-18) [2018-12-17]. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624.

National Autism Center . National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautism center.org/national-standards-project/.2015:43-70.

National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders.Evidence-Based Pra ctices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http:/ /autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf .2014:49-106.

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

附录一《强化物调查表》

学生姓名_____ 性别_____ 年龄_____

孩子喜欢吃什么：

主餐食物_____

水果_____

零食_____

其他_____

最不喜欢吃什么_____

孩子喜欢喝什么：

饮料_____

奶类_____

果汁_____

其他_____

最不喜欢喝什么_____

孩子喜欢做什么：

玩耍_____

做家务_____

绘画_____

音乐_____

其他_____

最不喜欢做什么_____

孩子最喜欢的游戏、文体活动是什么：

玩水_____

滑梯_____

跳绳_____

球类_____

其他_____

最不喜欢做的活动_____

孩子最喜欢的物品、玩具是：

积木_____

洋娃娃_____

汽车_____

枪_____

其他_____

最不喜欢的东西_____

孩子最喜欢获得哪些鼓励：

口头赞扬_____

糖果_____

书_____

拥抱_____

其他_____

孩子最怕何种惩罚_____

其他情况说明_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录二　访谈提纲

教师版访谈提纲

一、经过同伴支持后，自闭症谱系障碍儿童在学校的社交回应行为有什么进步？请举例说明。

二、经过同伴支持后，自闭症谱系障碍儿童在学校的社交发起行为有什么进步？请举例说明

三、经过同伴支持后，除了社交沟通行为外，自闭症谱系障碍儿童还在哪些行为上有所改善？请举例说明。

四、您会将同伴支持应用到今后的教学工作中吗？为什么？

家长版访谈提纲

一、经过同伴支持后，孩子在日常生活中的社交回应行为有什么进步？请举例说明。

二、经过同伴支持后，孩子在日常生活中的社交发起行为有什么进步？请举例说明

三、经过同伴支持后，除了社交沟通行为外，孩子还在哪些行为上有所改善？请举例说明。

四、您以后会利用同伴资源来教育孩子吗？为什么？

中国知网　https://www.cnki.net

附录三 家长同意书

尊敬的家长：

您好！我是西南大学特殊教育学 2018 级研究生彭若婕。在导师李欢副教授的指导下，将运用同伴支持对自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通能力的训练。希望通过此次实践，能进一步改善您孩子的社交沟通能力，同时为您孩子所在学校以及教师提供一些实践经验的参考。

本研究所有资料仅供研究使用，不予公开；此外对您孩子的姓名及相关资料，都将以匿名方式呈现，确保您孩子的隐私。请您放心！

真心期盼您能同意孩子参与此项研究，如有疑问，欢迎与本人联系。在此，十分感谢您的支持与配合。

敬祝：

阖家幸福！

西南大学特殊教育学 2018 级研究生

彭若婕

敬上

中国知网 https://www.cnki.net

附录四 学生兴趣及游戏活动调查表

学生姓名：　　日期：

下面有几个小小的问题，是有关孩子平常和下课经常会从事的活动，现邀请您帮忙回答，而下面也提供一些选项让你填选：

一、平时的兴趣活动（例如：玩电脑游戏）

□看电视　□玩电子游戏　□听音乐　□画画　□看书　□玩玩具　□运动 □逛街

□其他

二、平时及学校的游戏喜好

1.最喜欢什么玩具：

□积木　□发光物品　□各种汽车　□毛绒玩具　□其他

2.怎么操作这些玩具：

□相应的功能性玩法　□闻或者尝　□抛或扔　□敲打　□旋转　□其他

3.喜欢哪些游戏活动：

□身体动作 □感官探索 □结构性游戏 □音乐游戏 □社会性游戏 □其他

4.喜欢与谁玩游戏：

□没有特定的游戏对象 □一个以上的成人 □一个或一个以上的同伴 □自己

5.在游戏中的社交互动如何：

□单独玩 □看别人玩 □主动参与 □被动反应 □不会响应 □能短暂互动 □主动组织游戏

三、下课期间从事的活动：

□聊天 □坐在座位上 □玩玩具 □追逐游戏 □看书 □其他

四、下课一般与谁玩：

□自己 □老师 □同伴

中国知网 https://www.cnki.net

附录五 自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求调查问卷

亲爱的老师：

您好！为了更好地了解自闭症谱系障碍儿童需要提升在何种情境下社交沟通能力，我们特做此问卷调查。请您根据学生情况如实填写，在此对您的参与表达衷心感谢！

一、基本情况

1、您所教年级：___年级。

2、您班上有多少名自闭症谱系障碍儿童？____名。

二、自闭症自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力提升需求调查问卷

下列情境中，你认为自闭症谱系障碍儿童最应该提升在哪一类情境下的社交沟通能力：（多选）

（1）购物

（2）乘坐交通工具（询问站牌、路线等）

（3）看医生

（4）打接电话

（5）课外休闲娱乐（去电影院、游乐园等场所玩耍）

（6）节日活动

（7）社区生活（存取钱、理发等）

（8）学校活动

（9）寻求帮助（遇火灾、抢劫等情况）

其他（请写出）：

_____。

中国知网 https://www.cnki.net

附录六 游戏活动设计（部分）

<table>
<tr><th>活动内容</th><th>活动时间</th><th>活动地点</th></tr>
<tr><td>购物</td><td>40min</td><td>教室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">活
动
设
计</td><td colspan="2">教学目标
1.通过示范、角色扮演，让同伴学习与自闭症学生互动的技巧；
2.由同伴主导，与自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通；
3.自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力（社交发起、社交回应）有所提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学准备：词语卡片、水果抽纸等实物、衣服裤子图片</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学重点：自闭症谱系障碍儿童能在同伴引导下进行购物对话，完成模拟购物游戏。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学过程</td></tr>
<tr><td>教师活动</td><td>学生活动</td></tr>
<tr><td>一、导入
师：同学们，老师前两天去购物啦，想不想知道老师买了什么？
（以教师购物照片导入，并出示物品）
师：今天咱们就一起来玩一个购物小游戏。
二、培训同伴
（一）讲解任务
跟同伴讲解这节课需要完成的任务：物品配对、扮演顾客跟商贩。
（二）培训
老师来扮演自闭症谱系障碍儿童，告知同伴需要引导其加入游戏中来。(一一按照同伴训练所确定的策略进行同伴培训）
1、引起注意
引导同伴观察自闭症谱系障碍儿童有无注意到准备的水果等教学材料，通过叫名字或拍肩膀等方式邀请其一起玩耍。
2、恰当回应
例如当自闭症谱系障碍儿童注视时，要目光回应。
3、给予选择机会</td><td>学生回答

仔细聆听</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

	询问同伴想要扮演哪个角色（顾客或商贩） 4、示范 当自闭症谱系障碍儿童不知道下一步如何进行时，（如扮演顾客需要结账）就进行示范，示范过后不会时，则动手协助。 5、轮流等待 教同伴引导自闭症谱系障碍儿童学会轮流等待，例如他人说话时仔细聆听，安静等待。 6、扩充对话 在自闭症谱系障碍儿童正确配对物品或正确完成一次“购物”过后，用说“你真棒”或竖大拇指等方式鼓励同伴，根据实际情况，扩充与当前活动相关的对话。 （三）角色扮演，进行练习 三、同伴主导 （一）配对 1、出示商场、农贸市场、超市的字卡和图片，展示准备的水果、抽纸、衣裤图片等物品。 2、同伴引导自闭症谱系障碍儿童将相应的物品与地点配对 3、对话示例：“这个可以在哪里买到？” “在超市（农贸市场或商场） 将物品放到相应位置。 （二）演一演 1、由同伴和自闭症谱系障碍儿童来扮演顾客和商贩，模拟购物。 2、可使用对话：“这个多少钱？” “5 块。” “给你。” 3、顾客给钱，拿走物品，完成“购物”。 四、小结 1、 总结学生今天的表现，进行给学生喜欢的强化物，给予表扬。	与教师角色扮演，回顾之前同伴培训的内容，进行练习 同伴主导，协助自闭症谱系障碍儿童参与游戏，同伴实时给予反馈 模拟购物

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><th>活动内容</th><th>活动时间</th><th>活动地点</th></tr>
<tr><td>看病游戏</td><td>40min</td><td>教室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">活
动
设
计</td><td colspan="2">教学目标
1.通过示范、角色扮演，让同伴学习与自闭症谱系障碍儿童互动的技巧；
2.由同伴主导，与自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通；
3.自闭症谱系障碍儿童的社交沟通能力（社交发起、社交回应）有所提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学准备：听诊器、针筒、输液瓶等</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学重点：自闭症谱系障碍儿童能在同伴引导下进行看病对话，完成模拟看病游戏。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学过程</td></tr>
<tr><td>教师活动</td><td>学生活动</td></tr>
<tr><td>五、导入
今天老师带领大家来玩看病小游戏。
六、团体教学
（一）讲解任务
跟同伴和自闭症谱系障碍儿童讲解需要完成的任务：扮演病人跟护士。
（二）培训同伴
老师来扮演自闭症谱系障碍儿童，告知同伴需要引导自闭症谱系障碍儿童加入游戏中来。（一一按照同伴训练所确定的策略进行同伴培训）
1、引起注意
2、恰当回应
3、给予选择机会
4、示范
5、轮流等待
6、扩充对话
7、针对上节课表现与同伴交流，指出需要改进的地方，进行额外培训。
（三）角色扮演，进行练习
练习脚本内容</td><td>仔细聆听

与教师角色扮演，回顾之前同伴培训的内容，进行练习</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

	场景一：挂号 角色　　对话　　动作 病人　我要挂号 医生：　挂号费十元 病人：　给你十元　　拿钱给医生 医生：　病人请进 场景二：看病 角色　　对话　　动作 医生：　哪里不舒服 病人：　我头痛、咳嗽　　手扶额 医生：　我帮你检查　　听诊器、温度计 医生：　需要打针　　拿针筒给病人打针 病人：　好痛　　手抚摸打针处 医生：　我帮你揉一揉　　手揉病人打针处 病人：　谢谢医生 医生：　不客气，药拿好　　给病人药袋 病人：　好的，拜拜　　向医生挥手 医生：　拜拜　　向病人挥手 七、同伴主导 （一） 场景一：挂号 （二） 场景二：看病 八、小结 2、 总结学生今天的表现，进行给学生喜欢的强化物，给予表扬。	同伴主导，协助自闭症谱系障碍儿童参与游戏，同伴实时给予反馈

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><th>活动内容</th><th>活动时间</th><th>活动地点</th></tr>
<tr><td>点餐游戏</td><td>40min</td><td>教室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">教
学
设
计</td><td colspan="2">教学目标
1.通过示范、角色扮演，让同伴学习与自闭症谱系障碍儿童互动的技巧；
2.由同伴主导，与自闭症谱系障碍儿童进行社交沟通；
3.自闭症谱系障碍的社交沟通能力（社交发起、社交回应）有所提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学准备：菜单图片</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学重点：自闭症谱系障碍儿童能在同伴引导下根据脚本进行点餐。</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学过程</td></tr>
<tr><td>教师活动</td><td>学生活动</td></tr>
<tr><td>导入
今天老师给大家带来了一个点餐小游戏。
九、团体教学
（一）讲解任务
跟同伴和自闭症谱系障碍儿童讲解这节课需要完成的任务：扮演服务员跟客人，进行点餐。
（二）培训同伴
老师来扮演自闭症谱系障碍儿童，告知同伴需要引导其加入游戏中来。（一一按照同伴训练所确定策略进行同伴培训）
1、引起注意
2、恰当回应
3、给予选择机会
4、示范
5、轮流等待
6、 扩充对话
7、针对上节课表现与同伴交流，指出需要改进的地方，进行额外培训。
（三）角色扮演，进行练习
练习脚本内容
角色　　对话　　动作
服务员：欢迎光临！
客人：　我要点菜
服务员：给您菜单　　递菜单
客人：　我要一份土豆丝和红烧肉　　指菜单
服务员：还需要什么吗
客人：　还有一份丸子汤
服务员：好的，您稍等。　　离开
十、同伴主导
进行点餐</td><td>仔细聆听

与教师角色扮演，回顾之前同伴培训的内容，进行练习

同伴主导，协助自闭症谱系障碍儿童参与游戏，同</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

	十一、小结 3、 总结学生今天的表现，进行给学生喜欢的强化物，给予表扬。	伴实时给予反馈

中国知网 https://www.cnki.net

附录七《自闭症儿童沟通行为评量表》

儿童姓名：_____　　评量者：_____

评量日期：　　年　　月　　日

目前语言能力：□完全无言语　　□会仿说单字　　□会主动说一些单字

□会主动说短句　　□言语能力和同年龄相符合

填表说明：请针对学生（贵子弟）目前的沟通行为，圈选适当的数字。

一、要求：

（一）当他想要某样东西时，他会用下列何种方式表示？

1. 盯着东西或东西的方向看----------□

2. 自己走到东前面----------□

3. 用手势（如伸出手掌做“给我”的动----------□

4. 用声音表示----------□

5. 使用单字（只有名词）----------□

6. 使用简单的短句（如动词+名词）----------□

（二）当他想要人帮他做某件事情时，他会用下列何种方式表示？

1. 拉人的手或手臂去拿（做）----------□

2. 拿东西到人面前----------□

3. 几个动作的组合----------□

4. 用声音表示----------□

5. 使用单字（只有名词）----------□

6. 使用简单的短句（如动词+名词）----------□

（三）当他想要别人告诉他一些事情时，他会用下列何种方式表示？

1. 没有要求别人说明的行为----------□

2. 用手指头指哪一个？ ----------□

3. 拿东西到跟前来，但不会口语问人----------□

4. 单词问人（只有特定东西）----------□

5. 用单词问人（不限特定东西）----------□

6. 使用简单的短句----------□

二、拒绝：

他不想要某样东西或做某件事时，他会用下列何种方式表示？

1. 不理会、没反应----------□

中国知网　https://www.cnki.net

2. 生气（包括神态不开心等）----------□

3. 回避（走开、转过头去）----------□

4. 拒绝（包括推人、推物、摇头、摇手等）----------□

5. 声音拒绝----------□

6. 用适当的口语拒绝（如说不要）----------□

三、引人注意：

（一）当他想要人注意他时，他会用下列何种方式表示？

1. 打头或尖叫----------□

2. 用动作表示（推人或拉人等）----------□

3. 在人前走来走----------□

4. 用声音表示（包括与环境无关的重复性语言）----------□

5. 使单字（只有名词）----------□

6. 使用简单的短句----------□

（二）当他想要人注意某样东西时，他会用下列何种方式表示？

1. 推人或拉人来到东西前面----------□

2. 用手指头指给人看----------□

3. 拿东西给人看----------□

4. 用声音表示----------□

5. 使用单字（只有名词）----------□

6. 使用简单的短句----------□

四、回答问题：

当有人问他问题时，他会用下列何种方式表示？

1. 对他人的问题没有反应----------□

2. 重复与问题无关的话----------□

3. 仿说他人的问题----------□

4. 点头、摇头（摇手）回答（是不是、要不要）；手指的方式回答要哪一个？在那里？等）问题----------□

5. 使用单字（只有名词）问答----------□

6. 使用简单的短句回答----------□

五、社交性沟通：

（一）当他人向他打招呼时，他会下列何种方式表示？

1. 对别人的招呼没有任何回应----------□

2. 对别人的招呼能用微笑成注视回应----------□

中国知网 https://www.cnki.net

3. 对别人的招呼能用动作回应————————————————————————————□

4. 对别人的招呼能用声音（包括无关的话）回应————————————————————□

5. 对别人的招呼能口语回应————————————————————————————————□

6. 主动的跟人打招呼————————————————————————————————————□

（二）当得到他人帮助时，他会用下列何种方式表示？

1. 没有任何回应——□

2. 用注视表示感谢——□

3. 用微笑表示感谢——□

4. 用动作（如：拉拉手）表示谢谢————————————————————————————□

5. 会说谢谢——□

6. 使用简单的短句——□

（三）听到电话铃响时，他会用下列何种方式表示？

1. 没有任何反映——□

2. 注视电话机——□

3. 用喊叫或无关的话表示————————————————————————————————————□

4. 会叫“妈妈”“老师”或说“电话”“电话响了”等话————————————□

5. 拿起电话但不接听————————————————————————————————————□

6. 会简单的电话应答————————————————————————————————————□

（四）课堂交流时，他会用下列何种方式表示？

1. 没有回应——□

2. 用眼睛注视老师——□

3. 从座位上站起来，不讲话或嘴里重复无关的语句————————————————□

4. 不能重复老师说过的话————————————————————————————————□

5. 能重复老师说过的话————————————————————————————————□

6. 能用简单的字词应答————————————————————————————————□

六、游戏活动时，他的表现怎样？

1. 单独玩，不允许他人站在边上————————————————————————————□

2. 单独玩，允许他人站在边上————————————————————————————□

3. 允许别人加入，但你玩你的，我玩我的————————————————————□

4. 允许别人加入，和同伴一起玩————————————————————————————□

5. 能听从老师和同伴的指导————————————————————————————□

6. 参加游戏活动时，对多次重复的游戏和活动的规则有所掌握————————□

中国知网 https://www.cnki.net

基本沟通行为评量结果与建议

评量日期：　　年　　月　　日　　评量者：

评时实足年龄：_____岁_____个月

评量结果

中国知网 https://www.cnki.net

附录八 自闭症谱系障碍儿童社交沟通能力观察评量表

互动类型 对象	社交发起	社交回应	同伴提示
A			
B			
C			

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

凡是过往，皆为序章，行文至此，意味着我的研究生生活即将结束。回首在西大这两年的求学生涯，只能用不悔梦归处，只恨太匆匆来概括。心之所念，皆是过往，目之所及，皆是回忆。入学之日恍如昨日，两年学习甘苦兼具，曾有过困顿，有过迷惘，但更多的是对未来的坚定，留下来的也是沉甸甸的收获。在成长路上离不开大家的陪伴与支持，在此，特向所有给予我关爱的人致以深深的谢意。

学贵得师，亦贵得友。在研究生学习期间，首先最要感谢的就是我的女神导师，李欢老师。能在欢老师门下学习是一件无比幸运的事，欢老师对待学术孜孜以求，精益求精。从毕业论文开题到送外审，每一次发送论文给欢老师，都能及时收到她无比细心的“满江红”批注，大到论文框架，小到标点符号，论文的每次修改都离不开她的悉心指导。在生活中，欢老师更像是一个姐姐，没有架子，能跟我们分享任何事情，能接梗，对大家都无比关心爱护。在找工作时，欢老师还不忘叮嘱我的着装打扮，帮我修改简历。无论是治学还是为人，欢老师都是我们学习的榜样，是良师亦是益友。总之，我是个太平凡的学生，欢老师是一个太优秀的老师，在这里要真挚地对欢老师说一声感谢。其次，感谢教育学部特教学院的赵斌老师、杨柳老师、代光英老师、江小英老师、阳泽老师。感谢各位老师对我在专业道路上的引领，感谢校外指导老师黄永秀老师、北碚特殊教育学校的肖飞老师、王缙老师、陈群老师、蒋静老师，还有蒋宇师姐等人在实习及撰写论文期间给予我帮助和支持，还要感谢我乖巧可爱的六名研究对象，配合我完成论文。

三生有幸，山水一程。感谢我亲爱的小伙伴们，古训红、吕其芳、骆晓娟、冉平的陪伴，大家相互鼓励、相互安慰，打打闹闹地度过这两年时光。还要感谢我的同门姐妹彭燕、汪甜甜、龙艳林、黄文桥、阿日贡、刘园、吕洪玲、王梦溪、林佳英、李昭君、吴宏宇，让我感受到师门大家庭的温暖，感谢特教仙女们一路的鼓励，何其有幸遇见大家，祝愿大家前程似锦。

焉得萱草，言树之背。感谢爸爸妈妈多年的养育之恩，父母永远是我最坚强的后盾，给我物质与精神上的支持，让我能一往无前，在求学路上坚定走下去，我将带着家人们的爱继续前行。

感谢我的男朋友傅志刚，相识十余年，相爱六年，陪我经历了人生太多重要重要时刻，虽然不会甜言蜜语，却一直默默用行动支持我，在这里要对男朋友说一声感谢。

中国知网 https://www.cnki.net

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。我将砥砺前行，牢记初心，迈向更加广阔的天地。时光易逝，终有离别之时，感恩所有相遇，只言片语难言我心。三尺长剑未开锋，转身拽蹬战长空。沉舸看尽千帆尽，归来鲜衣仍少年。

彭 若 婕

2020 年 5 月 21 日

于 西南大学

中国知网 https://www.cnki.net