自闭症儿童主动口语沟通行为的干预训练

陈　勇　侯　波

【摘　要】 沟通障碍是自闭症儿童的典型障碍之一。本研究对1名语言发展较好的自闭症儿童采用主动口语表达训练、同伴交往训练、环境创设表达训练以及随机教学训练的干预方法,来提高其主动口语沟通能力。结果显示,个案的主动口语沟通行为明显增加,沟通内容也有所丰富。

【关键词】 自闭症儿童;沟通障碍;主动口语沟通行为;干预训练

【中图分类号】 G764

如何促进自闭症儿童与他人沟通交流一直是特殊教育关注的重点问题。约有50%的自闭症儿童终身缺乏口语沟通行为,即使发出口语也是“鹦鹉学舌”或自言自语,没有主动口语沟通行为,这严重影响了自闭症儿童沟通能力和社会交往能力的发展。[1]

本研究的目的在于探索自闭症儿童主动口语沟通行为干预方法的有效性,通过对1名语言发展较好的自闭症儿童进行主动口语沟通行为的干预训练来提高他的主动口语沟通能力,促使其进一步社会化。同时,在干预过程中记录自闭症儿童主动口语沟通行为的变化以及存在的问题,以期为相关研究提供参考与借鉴。

一、个案基本情况及干预训练目标

小张(化名),男,2001年9月出生,独生子,经诊断为自闭症,智力残疾二级,身体发育良好,就读于特殊教育学校7年级。小张语言能力发展较好,具备一定的读、写能力,认识常见的汉字,能够在一问一答的情况下与人进行口语沟通,偶尔会自言自语。小张在学校和家里表现均较好,但是在陌生环境或者周围环境过于吵闹时会大声吼叫并且紧紧捂住自己的耳朵。

根据老师和家长共同参与的评估分析结果可知,小张在沟通方面的主要问题在于主动口语交流不足,缺乏个人想法和意愿的表达。本研究根据小张主动口语沟通能力的发展现状,为其制定了4个方面的训练目标(见表1)。

二、干预过程与方法

本研究采用单一被试实验法,选用A—B—A的模式:前A为基线期,通过观察、访谈、评估,记录个案的基线状态;B为介入处理期,记录干预措施实施时个案的行为反应及其状态,同时记录干预

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表1　主动口语沟通行为的训练目标

总目标	具体目标
1.主动问好或告别的沟通行为	1.1 理解“你好”“早上好”“晚上好”以及“再见”等问好或告别词语 1.2 主动回应他人的问好和告别 1.3 能主动与他人问好和告别
2.主动拒绝或抗议的沟通行为	2.1 理解“不”“不行”“不要”“不喜欢”“不可以”等表示抗议的词语 2.2 在支持下,主动表达出表示拒绝或抗议的词语 2.3 在生活中正确使用表示拒绝或抗议的词语
3.主动表示喜欢或愿意的沟通行为	3.1 理解“喜欢”“愿意”“行”“好的”等表示喜欢或愿意的词语 3.2 在支持下,主动表达出表示喜欢或愿意的词语 3.3 在生活中正确使用表示喜欢或愿意的词语
4.主动与他人进行口语沟通行为	4.1 学习和使用沟通中常见的句子 4.2 在支持下,与他人进行主动口语沟通行为

实施中存在的问题;后A为撤销干预后的维持期,继续对个案的主动口语沟通行为的情况(次数和内容)进行跟踪观察与记录。

(一)基线期阶段

在基线期阶段,老师主要记录小张在日常生活中的主动口语沟通行为次数,偶尔给予少量的语言提示。老师对小张的观察以在校学习时间为主,即周一至周五,在家的时间则由小张妈妈进行观察记录。每次观察的时间为50分钟(一堂课+课间休息时间),观察次数为校内7次、校外5次。

老师手把手教学生签名

(二)介入处理期阶段

在介入处理期阶段,老师依次采用主动口语表达训练、同伴交往训练、环境创设表达训练以及随机教学训练这4种干预方法,以达到增加小张主动口语沟通行为的目标。

1.主动口语表达训练

该训练的主要目标在于引导小张进行主动口语沟通行为,建立与同伴、他人主动交流的起点。训练流程为:在现有的语言发展基础上,让小张理解问好或告别、表示拒绝或抗议、表示喜欢或愿意的词语和句子,然后进行主动口语表达的训练。训练的主要步骤为:(1)了解小张的兴趣;(2)教小张学会主动回应他人的问好和告别,例如,有同学主动跟小张说“早上好”,小张应在无提示的情况下,主动回应“早上好”;(3)教小张学会主动与老师、同学以及认识的人问好和告别,例如,早上妈妈送自己来学校上课,要跟妈妈说“再见”,并跟老师和同学说“早上好”;(4)教小张学会理解与使用表示拒绝或抗议的词和句子,例如,“我不喜欢”“我不要”“我不想玩玩具”等;(5)当小张在学习中表现较好时,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表2　同伴训练内容对照表

小张的目标	同伴甲的训练内容	同伴乙的训练内容
1. 主动问好或告别的沟通行为	1.在小张未主动跟自己问好或告别的情况下，主动与小张进行问好或告别行为,并要求小张回应	1.每天坚持主动与小张进行问好和告别行为,并要求小张回应
2. 主动拒绝或抗议的沟通行为	2.1 主动跟小张表达自己不喜欢做什么事情,并问小张不喜欢做什么 2.2 在支持下,帮助小张主动表达出表示拒绝或抗议的词句	2.1 在老师的安排下,故意给小张不喜欢的东西,小张拒绝后便停止给 2.2 在老师的安排下，故意做一些小张不喜欢的事,比如在他旁边大吼大叫，并在小张主动口语表达出抗议后立即停止
3. 主动表示喜欢或愿意的沟通行为	3.邀请小张一起玩耍,并不停地跟其说“喜欢”“我喜欢玩这个游戏”等表喜欢和愿意的词句	3.在老师的安排下,主动要求分享小张的食物或物品,并要求小张说出“好”“可以”等表示愿意的词语
4. 主动与他人进行口语沟通行为	4.1 课间主动邀请小张一起玩耍,并且进行口语交流 4.2 当小张主动口语表达的次数较多时,给予小张鼓励和表扬,并邀请小张下次一起玩耍	4.1 课间主动邀请小张一起玩耍,并进行口语交流 4.2 当小张主动口语表达的次数较多时,给予小张鼓励和表扬,并邀请小张下次一起玩耍 4.3 在支持下,带小张和自己的朋友一起玩耍,并进行口语交流

立即给予语言表扬;(6) 当小张在合适的场合正确进行主动口语沟通行为或者只是说出目标词句时,立即给予表扬。

2.同伴交往训练

在干预前期利用适应性课程评估等方法已经得知,小张能与同伴保持良好的关系。因此,本研究在小张的同学中选取了2名智力障碍学生（甲和乙)来参与小张的主动口语表达训练,并根据小张的4个方面的训练目标,制定对甲、乙两名同学的训练内容(见表2)。老师充分利用课堂集体教学和课间时间进行训练，增加小张与同伴的沟通行为,促使其建立良好的同伴关系。训练的主要步骤为:(1)了解小张的兴趣;(2)设计小张感兴趣的团体活动,为他创造与同伴主动口语沟通的机会;(3)保持同伴在训练过程中的作用，注重同伴参与的有效性;(4)当小张表现得很棒时,即在设置的团体游戏中或者是课间休息时主动口语表达自己的意愿或想法,立即给予表扬;(5)当小张因自身原因,出现不安或者抗拒情绪时,若说出“我不喜欢”“我不要”等表示拒绝抗议的词句，老师要及时安抚情绪,并待其情绪稳定时给予表扬,若小张无法说出目标词句,则由老师进行提示(文字、肢体、语言等);(6)当

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

亲子环保时装秀

小张从不会主动表达到开始主动表达时,老师要立即给予表扬。

3.环境创设表达训练

经过前两种方法的干预,小张的个人表达和语言沟通能力均有了较大进步,此时,可加入环境创设表达训练来适当提升难度,主要通过2种途径进行干预。一是主动表达情境的创设,例如,在课间休息时,老师故意放很吵闹的音乐,令小张感到不安,激发小张的主动口语表达,说出表示不愿意或拒绝的词汇,如“不要放了”“不想听”“不好听”等。若其表现较好,立即给予表扬;若是较之前有进步,也立即给予表扬;若其遇到同样的情境依然不知道该如何表达,教师应给予提示与帮助。训练期间,老师可以结合适应性课程评估结果,合理地给小张安排一些工作,如去校门口帮老师拿快递,在锻炼其工作能力的同时也有利于促进其主动口语表达。二是角色的扮演,如让小张扮演动画片中的一个角色,想想在早上见到老师后应该说什么?如果别人吵到了自己,应该说什么?如果不想吃面条,应该怎么说?训练初期需要老师提问,小张才会回答,到训练后期,小张看到相似情形会主动表达。

4.随机教学训练

该训练主要是巩固小张的主动口语沟通行为,并泛化运用到平时的生活和学习中去。该阶段应在自然情境中进行随机训练,以减少小张的不安情绪和抵触情绪,提高训练的长期有效性。此外,这一训练需要强化家长在训练自闭症儿童主动口语表达中的作用。主要体现在:(1)老师教会家长使用强化物来激发自闭症儿童主动口语表达的方法;(2)老师与家长保持强化和表扬标准的一致性;(3)家长及时与老师沟通,交流小张的主动口语表达情况和内容;(4)家长打破训练场所和训练人员的限制,为小张提供更多的自然机会进行主动口语表达。

(三)维持期阶段

该阶段撤销所有的干预方法,对小张进行为期一周的观察,在校期间由老师观察记录,校外期间由小张妈妈观察记录。主要观察小张的主动口语沟



图1　小张主动口语沟通行为次数统计图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通行为有无增加,以验证训练方法是否有效。

三、干预结果分析

在基线期阶段,小张的主动口语沟通行为次数在每天10次以内;在介入处理期阶段,主动口语沟通行为呈上升趋势,次数在10—28次/天。(见图1)

从图1的数据可以看出,干预方法对小张的主动口语表达是有效果的。介入处理期阶段可以明显地看到小张的主动口语沟通行为呈波动趋势,这跟小张的个人兴趣、同伴的参与程度、观察时间和地点以及其他人员的配合度有关系。在维持期阶段,可以看到主动口语沟通行为次数在15—20次之间,呈下降趋势,说明主动口语沟通行为的干预应具备长期性。

此外,根据小张的主动口语表达的内容记录,可以发现小张在主动口语表达的内容上有了一定的拓展,由使用简单的词语发展到能够使用完整的语句。

由干预训练结果可知,采取适当的训练方法进行干预可以增加自闭症儿童的主动口语沟通行为,同时也有利于其拓展沟通内容。有效性较强的是同伴交往训练法和环境创设训练法,其余2种方法也有一定的效果和作用。在干预期间,应充分考虑自闭症儿童的沟通障碍,抓住自闭症儿童注意的特点,创设有利于其主动口语表达的环境。此外,在发挥家长的积极作用的基础上,还需要注重干预方法的有效性和长期性。

自闭症儿童的主动口语沟通行为可以通过科学有效的训练方法进行干预。在干预时,要根据自闭症儿童的现有语言能力、兴趣爱好、社交能力等来制定干预方案。在干预期间要不断地给予自闭症儿童反馈,通过及时的鼓励,帮助其建立口语表达的信心,从而实现主动口语表达。

毕业典礼

参考文献:

[1]魏寿洪,许家成.自闭症儿童主动口语沟通行为干预的个案研究[J].中国特殊教育,2007(12):58-62.

[2]刘慧丽,连翔.自闭症儿童语言干预的内容、反思与建议[J].现代特殊教育,2012(12):45-47.

(作者单位:四川省成都市温江区特殊教育学校,610000)


复活兔
范皓棠(江苏省昆山市娄江实验学校)
指导老师:戴洁洁

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net