doi:10.3969/j.issn.1008-9640.2017.06.086

自闭症儿童主动沟通干预方法综述

袁 鹏
(辽宁师范大学 教育学院,辽宁 大连 116029)

摘 要:自闭症儿童具有较严重的沟通障碍,据统计,目前大约有 50% 的自闭症儿童表现出几乎完全不能说话的症状,而且也较少通过打手势及表情来表达自己的想法,他们往往缺乏与人主动沟通的意愿和兴趣,不愿主动与人交往。目前,辅助沟通系统、游戏治疗、体育活动干预等方法是干预自闭症儿童主动沟通行为的主要方法。本文通过总结国内外近些年来对自闭症儿童主动沟通行为的研究成果,分析上述干预方法的作用。

关键词:自闭症儿童;主动沟通;干预方法

中图分类号:B844.1;G76 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-9640(2017)06-0182-02

一、研究背景

"自闭症"又称"孤独症",2013 年出版的《精神障碍诊断与统计手册》(*the Diag- nostic and Statistical Manual of Mental Disorders*,DSM—V)第五版中提出[1],患有自闭症的儿童,其表现出的核心障碍之一就是"口语与非口语的社交沟通障碍"。有关研究证实,目前,约有 50% 的自闭症儿童表现出难以发出功能性语言的特征,在日常交往中,缺乏能进行自然沟通的言语及书写技能,较难满足其进行日常交往的需求。鉴于此,自闭症研究专家长期以来较重视语言及沟通障碍对自闭症儿童自身的影响。目前,国内外已有多名学者采用多种方式干预自闭症儿童的主动沟通行为,也取得了一定成果。本文主要对国内外已取得一定成效的主动沟通干预方法进行综述分析。

二、自闭症儿童主动沟通行为干预的主要方法

(一)辅助沟通系统

目前,干预自闭症儿童主动沟通行为应用较多的方法是辅助沟通系统(Augmentative& lternative Commu-nication,AAC)。AAC 通过采用更少的破坏沟通形式来促进自闭症儿童的沟通和学习,这种方法能突破自身能力的限制,在功能性语言的发展等方面具有良好的促进作用。目前,AAC 在自闭症儿童身上的训练使用已有 20 多年,通过使用辅助或非辅助的符号来扩大或代替自然语言或书写技能,可以有效替代或补充自闭症儿童有限的沟通技能。

国内外多名学者已利用 AAC 辅助系统进行了自闭症儿童的主动沟通行为干预研究。Bondy&Frost[2]早在 1994 年就开展了相关研究,将 85 位 5 岁以下无功能性口语的自闭症幼童作为研究对象,通过图片兑换进行沟通系统训练。首先进行图片兑换物品的训练,然后进行自发性回答日常生活中常见问题的训练。结果显示,一段时间以后,被试者的沟通能力均有一定程度的提高。

2002 年,Charlop - Christy[3]等人选取 3 名无主动口语能力的自闭症患者为研究对象,对单一受试的实验方法进行图片兑换沟通系统的相关训练。研究表明,实验选取的个案,在主动口语及模仿的频率、使用图片兑换沟通系统的熟练程度及说话的平均长度等方面较之前均有显著提高。2016 年,李欢、杜泽星[4]通过单一被试的研究方法,对一名学前无口语自闭症儿童采用图片交换沟通系统进行干预,研究结果表明,图片交换沟通系统能从数量上增加学前自闭症儿童主动沟通的频次,从质量上提高学前自闭症儿童主动沟通的品质。

(二)游戏治疗

游戏治疗是指在使用理论模式系统建立起来的人际交往过程中,通过游戏的手段帮助受试者。国内外的研究结果表明,游戏治疗先后经历了精神分析游戏治疗、结构主义游戏治疗及指导式游戏治疗三个阶段。精神分析游戏治疗于 20 世纪 20 年代提出,来源于以 S.Freud[5]为代表的精神分析学派,在当时,这种方法仅仅作为治疗师获取儿童无意识材料的一种方式,本身并无治疗作用。这种方式较普遍运用于儿童精神分析方面,并未针对特殊儿童采用。20 世纪 30 年代出现了结构主义游戏治疗法。最初,这种治疗法主要应用于精神分析。研究指出,导致儿童出现心理问题的重要原因是由儿童内部能量过多积累,因此,这种方式最初的用途是帮助儿童发泄能量。20 世纪 40 年代,指导式游戏治疗出现,这种治疗方式最初是从 Rogers 人本主义心理学研究中衍生出来的,所以其又被称为人本主义游戏治疗。这种治疗方式指出,游戏本身仅仅是治疗的一种工具,我们需要关注的是游戏过程,所有治疗专家应该致力于真诚、共情和无条件地积极关注,使儿童突破困境,获得痊愈。

2001 年,邱学青[6]采用儿童中心游戏治疗方法,对一名 4 岁的患病儿童开展治疗。治疗结果显示,通过采取阶段训练,受试儿童在主动沟通方面的意识较之前有较大提升,具体表现为对玩具产生的兴趣有较大提升,

收稿日期:2017-06-08

作者简介:袁鹏(1992—),男,辽宁丹东人,辽宁师范大学教育学院特殊教育专业 2016 级硕士研究生。研究方向:特殊教育。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

该儿童能参与同伴的游戏，且表现出主动遵守教师的规定，主动与父母交流，主动与其他人进行交往等良好状态。此外，其还能意识到自己的言行将产生的后果。2011 年，姚嘉、毛颖梅[7]对一名患有轻度孤独症的幼儿进行游戏治疗，通过采用倒返实验设计的方法展开研究。结果显示，在干预期内，受试者表现出的行动回应及目光接触等行为较基线期内的表现均有明显增加。此外，在干预期内，受试者在手势请求帮助、语言表达请求帮助、共同注意及目光追随能力等方面较基线期内也均有显著增加。

（三）体育活动干预

体育活动干预即运用体育活动对自闭症儿童进行干预，主要采用体育教学的形式。教学内容根据方式不同可以分为两类。第一类的主要特征表现为以本身的身体基本动作训练为主要方式，例如，运动中的走、跑、跳、爬等，这种方式可以结合感觉统合的相关训练，如按摩；也包括相关目标性的专项练习，如游泳、投篮、轮滑、沙包、骑自行车等。第二类的主要特征表现为以自闭症儿童具有的兴趣爱好为基础，有针对性地设计体育游戏活动。我国自闭症儿童的体育活动干预研究还处于起步阶段，且基于自闭症儿童个体差异和自身的特殊性，目前的研究多以个案研究为主。通过以往研究发现，体育活动干预可以改善自闭症儿童的沟通交往能力，对自闭症儿童的语言表达能力也具有较好的干预效果。

钱旭强[8]等人采用体育活动干预的方法，通过为期 3 个月的体育活动，对一名 6 岁的患有自闭症的儿童进行干预，该干预研究的主要目的是考察儿童各个领域整体性的相关发展情况。分析其主动沟通行为发现，在基线期内，受试者表现出的目标行为平均值为 0.28，表现出较稳定的低值；而在处理期内，其表现出的目标行为平均值为 14.95，即使这些表现不太稳定，但整体观察来讲，均显现出上升状态；在维持期内，其表现出的目标行为平均值为 10.42。上述研究表明，通过体育活动干预，该自闭症儿童在主动性沟通方面的行为呈现出增长趋势。2006 年，丹豫晋等[9]研究者通过体育活动对 2 名自闭症儿童进行沟通行为干预，研究显示：经过为期 6 个月的体育活动干预，在沟通行为方面，2 名自闭症儿童均表现出不同程度的进步，其中一名儿童在干预后出现了主动沟通的行为，另一名儿童则表现出了主动沟通的意向。

（四）其他干预方法

对自闭症儿童沟通行为的干预还可采用其他方法，如美术辅助治疗、音乐治疗、录像示范治疗等。山东师范大学的王烁[10]等人利用美术治疗法在干预自闭症儿童主动沟通行为方面取得了丰硕的成果。美术辅助治疗主要借助视觉场影响人的心理和判断，连接心灵，触发儿童的知觉，通过视觉的方式深入了解儿童的潜意识活动，从而使教师更好地分析儿童的心理，儿童自己也能表达意愿。张宇琦的实验结果表明[11]：行为数据总体提高，尤其在精细和小肌肉活动方面，活动设计中的美术、手工活动对自闭症儿童的抓握能力和手指协调性、灵活度有一定的积极作用，但对其语言表达方面的影响较小。

音乐治疗法也被大量应用在主动沟通行为干预中，国内外学者也对此做过研究。特殊的音乐教育在一定程度上为自闭症儿童的感知觉训练提供了有效的教育方法，其在改善自闭症儿童的注意力方面具有显著效果，可提高眼神对视的次数。上海音乐学院胥珊珊[12]等人利用音乐治疗法对特殊音乐教育改善自闭症儿童行为的作用进行了研究。研究结果表明：通过多种音乐干预手段，如与人沟通的训练、学唱歌曲、“走走停停”游戏等，实验儿童的音乐技能和交往技能均有提高，并且主动沟通的欲望也得到了提升。

此外，还有录像示范法等多种干预沟通行为的方式，也均有相关研究支持，在此不再一一赘述。

三、结语

笔者总结了多种干预自闭症儿童沟通行为的方法，相关研究也都取得了丰硕成果。但需要注意的是，所有对干预自闭症儿童沟通行为方法的研究，均未涉及改善和提高自闭症儿童沟通能力的程度及可靠性等方面，这还需学者进一步探索。

参考文献

[1] 美国精神医学学会 . 精神障碍诊断与统计手册 [M]. 北京：北京大学出版社，2016.

[2] Bondy A，Tincani M，Frost L. Multiply Controlled Verbal Operants:an Analysis and Extension to the Picture Exchange Communication System [J].Behavior Analyst，2004，(2)：247-261.

[3] Charlopchristy M H，Daneshvar S. Using Video Modeling to Teach Perspective Taking to Children with Autism [J].Journal of Positive Behavior Interventions，2003，(1)：12-21.

[4] 李欢，杜泽星 . 图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究 [J]. 中国特殊教育，2016，(7)：44-51.

[5] Freud D，Kichinbrin M，Ezrativinacour R，et al. The Relationship between the Experience of Stuttering and Demographic Characteristics of Adults Who Stutter [J].Journal of Fluency Disorders，2017，(52)：53-63.

[6] 邱学青 . 孤独症儿童游戏治疗的个案研究[J].学前教育研究，2001，(1)：36-37.

[7] 姚嘉，毛颖梅 . 游戏治疗对轻度自闭症幼儿沟通能力影响的个案研究 [J]. 中国健康心理学杂志，2011，(1)：123-126.

[8] 钱旭强 . 适应性体育活动对自闭症儿童发展影响的个案干预研究 [D]. 上海：华东师范大学，2013

[9] 丹豫晋，刘映海 . 自闭症幼儿沟通行为及体育干预策略 [J]. 武汉体育学院学报，2008，(2)：65-68.

[10] 王烁 . 治疗性美术教育辅助改善自闭症儿童沟通能力的个案研究 [D]. 济南：山东师范大学，2015.

[11] 张宇琦 . 美术在自闭症儿童教育中的作用研究 [D]. 西安：陕西师范大学，2015.

[12] 胥珊珊 . 特殊音乐教育方法指导下的自闭症儿童个案研究 [D]. 上海：上海音乐院，2016.

（责任编辑：李汴红）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net