同侧面动脉蒂鼻唇沟岛状皮瓣整复舌缺损的效果。

方法 我们记录了 2012 至 2014 年间 7 例在中山大学附属口腔医院行舌恶性肿物扩大切除术及同侧面动脉鼻唇沟岛状皮瓣修复舌缺损患者的恢复情况。术后对患者进行随访，并记录患者局部复发与远处转移等情况。主观功能采用华盛顿生存质量量表评价。

结果 术后所有皮瓣均全部存活。在随访过程（6-24 个月）中，我们未发现患者发生局部复发或远处转移。患者对术后功能恢复满意，特别是吞咽与语言功能。供区的并发症少见，供区拉拢缝合的瘢痕被隐藏于鼻唇沟中。

结论 同侧面动脉蒂鼻唇沟岛状皮瓣是一种简便、安全、有效兼顾美观的肿瘤切除术后舌缺损的修复方法。

关键词 同侧鼻唇沟瓣；舌缺损；口腔鳞状细胞癌；并发症

舌癌术后同期皮瓣修复对远期语音声学结果的影响

杨乐，肖育栋，邓威，郭凯欣，赵桂溢，梁玉洁，廖贵清*

中山大学光华口腔医学院•附属口腔医院，口腔颌面外科，广东省口腔医学重点实验室

目的 比较是否同期行皮瓣修复对舌癌根治性手术切除患者的远期语音功能结果的影响。

材料与方法 收集中山大学附属口腔医院口腔颌面外科门诊中术后定期复诊的舌部恶性肿瘤患者。纳入标准为：1）诊断为舌鳞状细胞癌；2）年龄 20-80 岁；3）手术后随访时间>1 年。排除标准为：1）听力障碍；2）脑血管意外事件、脑外伤、口吃病史；3）复发、转移等不良事件。所有受试者均接受专业的发音声学评估，提取汉语普通话 3 个元音/a/、/i/、/u/的第一共振峰（F1）和第二共振峰（F2）。计算综合性言语功能客观指标，包括元音声学空间（Vowel Space Area, VSA）和共振峰央化率（Formant Centralization Ratio, FCR）。

结果 共纳入 89 位受试者，评估时年龄 53.02±11.17 岁，中位随访时间 33（12-235）月。其中女性 37 例（41.6%），男性 52 例（58.4%）。同期行皮瓣修复者 62

中国知网 https://www.cnki.net

例（69.7%），未行皮瓣修复者 27 例（30.3%）。不同性别患者在年龄、随访时间、T 分期、N 分期、术后辅助治疗及 FCR 和 VSA 之间不存在显著差异。双因素方差分析结果显示修复重建对于 FCR(P =0.012)、VSA(P =0.002)有显著的主效应，与性别之间不存在显著的交互效应。男性行同期修复重建患者的 FCR 值显著高于非同期修复重建患者（0.1342，95%CI：0.0238-0.2446，P=0.013）,男性非同期修复重建患者的 VSA 值显著高于行同期修复重建患者（95883，95%CI：31841-159926，P =0.002）。多重线性回归模型（P <0.0001, R^2=37.64%）显示 T 分期（β=0.0481，95%CI：0.0204-0.0757，P =0.0009）、术后随访天数（β=-3.456×10^{-5}，95%CI：-6.041×10^{-5} - -87.20×10^{-5}，P=0.0094）、年龄（β=0.0050，95%CI：0.0024 to 0.0076，P=0.0003）、化疗（β=0.1202，95%CI：0.0503 to 0.1901， P=0.0010）对 FCR 有显著影响。

结论 舌癌术后远期的语音声学表现受多种临床变量影响，修复重建对于男性患者的语音功能恢复作用有限。随着时间推移，术后远期依然存在缓慢的自然康复和再学习过程。术后远期的言语康复具有进一步功能促进的潜在价值，需要大样本、前瞻性的临床研究来证明。

关键词 舌癌；修复重建；语音；言语康复

纳米拓扑形貌与氨基化改性协同修饰 3D 打印聚乳酸多孔支架促进骨再生的研究

李翔，史善伟，郑广森，苏凯，高思勇，廖贵清*

中山大学光华口腔医学院•附属口腔医院，口腔颌面外科，广东省口腔医学重点实验室

目的 由于生物支架表面常缺乏成骨细胞附着与分化的理想环境，骨缺损的人工生物支架治疗依然面临巨大挑战。理想微环境下的骨组织生物支架应该具备促进成骨相关细胞特异性黏附、增殖和分化的能力，保证骨组织缺损快速稳定再生。研究表明 3D 打印聚乳酸多孔支架在骨修复方面具有很大的潜力与优势，本研究拟结合表面物化修饰改善支架生物学特性以促进骨再生。

中国知网 https://www.cnki.net