

**כימיה כללית 125001**  
**בחינת סמסטר אביב תשפ"ה**  
**מועד א'**

**טור 1**

משך הבחינה: שלוש שעות.  
יש לענות על כל 20 השאלות.  
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך,  
יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.  
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:  
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,  
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

**בהצלחה !!!**

### שאלה מספר 1

ליסוד אורניום ( $^{92}\text{U}$ ) שישה איזוטופים עיקריים. אחד האיזוטופים הנדירים של אורניום הוא  $^{234}\text{U}$  אשר שכיחותו הטבעית היא 0.0054%. כמה גרמים של איזוטופ זה נמצאים בדוגמא של 2.5 גרם של אורניום טבעי?

א.  $6.75 \times 10^{-4} \text{ gr}$

ב.  $8.40 \times 10^{-2} \text{ gr}$

ג.  $1.35 \times 10^{-2} \text{ gr}$

ד.  $2.35 \times 10^{-5} \text{ gr}$

ה.  $1.32 \times 10^{-4} \text{ gr}$

### שאלה מספר 2

המלח סידן כלוריד ( $\text{CaCl}_2$ ) הוא אלקטרוליט חזק ומשמש בין היתר כחומר מייצב בתעשיית המזון. כמה אטומים של היסוד כלור ( $\text{Cl}$ ) יש בתמיסת סידן כלוריד בנפח של רבע ליטר ובריכוז של 1.2M?

א.  $1.80 \times 10^{23}$

ב.  $3.61 \times 10^{23}$




ג.  $6.02 \times 10^{23}$

ד.  $1.20 \times 10^{24}$

ה.  $7.22 \times 10^{23}$

### שאלה מספר 3

חוקרת מצאה במעבדה 5 כלים לא מסומנים כאשר בכל כלי שתי תרכובות אורגניות שונות, נפרדות אחת מהשנייה. היא החליטה לנסות לזהות כל תרכובת בכל כלי ע"י אנליזה של תוצרי שריפה. בתהליך זה שורפים שריפה מלאה מסה זוהה של כל תרכובת בכל כלי ושוקלים את תוצרי השריפה. מתוך 5 הכלים, החוקרת הצליחה לזהות זוג תרכובות רק בכלי אחד מתוך החמישה. איזה זוג תרכובות מהתרכובות הבאות החוקרת הצליחה לזהות?



#### שאלה מספר 4

תערובת גזים המורכבת מ-2 גרם של הגז מתאן ( $\text{CH}_4$ ) ו-5 גרם של הגז אתאן ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ), נשרפה בעזרת 10 ליטרים של גז חמצן ( $\text{O}_2$ ) בטמפ' של  $25^\circ\text{C}$  ובלחץ של 5 אטמ'. מהו הנפח של פחמן דו חמצני ( $\text{CO}_2$ ) שהתקבל בסיום השריפה?

א. 0.83L

ב. 3.16L


ג. 1.68L

ד. 4.55L



ה. 2.23L

#### שאלה מספר 5

על סמך התגובות המופיעות מטה, מהו ערך האנטלפיה ( $\Delta H$ ) של התגובה הבאה ליצירת מול אחד של הגז פרופאן ( $\text{C}_3\text{H}_8$ )?



נתונות התגובות הבאות:



א. 852 kJ

ב. -290 kJ

ג. -4727 kJ

ד. 3871 kJ

ה. -567 kJ


## שאלה מספר 6

חוקרת המיסה 10 גרם של המלח אמוניום כלוריד ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) ב-30 מ"ל של מים (נפח המים לא השתנה כתוצאה מכך). בתחילת הניסוי טמפ' המים הייתה 303K ולאחר שכל המלח התמוסס טמפ' המים שנמדדה הייתה 291K. בהנחה שהכלי מבודד תרמית ושהלחץ נשמר קבוע לכל אורך התגובה, מהי האנתלפיה ( $\Delta H$ ) של התגובה המתוארת של המסת המלח? כמו כן נתון כי קיבול החום של מים הוא  $C(\text{H}_2\text{O})=4.18\text{J/gr}\cdot\text{C}$  וכי צפיפות המים היא  $d(\text{H}_2\text{O})=1\text{gr/mL}$

- א. -1200 J/mol
- ב. 1053 J/mol
- ג. -3240 J/mol
- ד. 8047 J/mol
- ה. 542 J/mol

## שאלה מספר 7

בגליל מבודד תרמית עם בוכנה מקובעת ע"י מעצורים, נמצא בצדו השמאלי גז אידיאלי בטמפרטורה  $T_1$  בלחץ  $P_1$  ובנפח  $V_1$  ומצדו השני – אוויר. הבוכנה גם היא מבודדת תרמית, כלומר אין מגע תרמי בין הגז האידיאלי לבין האוויר. בנקודה מסוימת בזמן משחררים את המעצורים, ולאחר שהמערכת מגיעה לשיווי המשקל החדש, נפח הגז האידיאלי גדל. על סמך נתונים אלה בלבד, איזו מבין הקביעות הבאות נכונה בהכרח לגבי הגז האידיאלי במצב שיווי המשקל החדש? ( $P_2 ; V_2 ; n_2 ; T_2$ )



- א.  $E_{\text{Kin}}(1) = E_{\text{Kin}}(2)$
- ב.  $n(1) > n(2)$
- ג.  $P_1 = 2P_2$
- ד.  $2V_1 = V_2$
- ה.  $T_1 > T_2$

### שאלה מספר 8

באיזה מהמעברים האלקטרוניים הבאים באטום המימן, אורך הגל של הקרינה הנפלטת הוא הגדול ביותר?

א.  $n=3 \rightarrow n=2$

ב.  $n=16 \rightarrow n=4$

ג.  $n=2 \rightarrow n=1$

ד.  $n=4 \rightarrow n=2$

ה.  $n=9 \rightarrow n=3$

### שאלה מספר 9

במסגרת מחקר של האפקט הפוטו-אלקטרי, משטח של מתכת כלשהי הוקרן באור בשני אורכי גל שונים:  $\lambda_1=350\text{nm}$  ו-  $\lambda_2=540\text{nm}$ . הקרנה בשני אורכי הגל גרמה לפליטת אלקטרונים מהמתכת ונמצא כי היחס בין המהירות המקסימלית של האלק' שנפלטו בכל אורך גל היה 1:2. על סמך נתונים אלה בלבד, מהי פונקציית העבודה (אנרגיית הסף) של המתכת בניסוי זה?

א.  $1.9\text{eV}$

ב.  $0.7\text{eV}$


ג.  $2.5\text{eV}$

ד.  $5.6\text{eV}$

ה.  $3.1\text{eV}$

### שאלה מספר 10

למי מבין האטומים/יונים הבאים יש את מספר האלק' הבלתי מזווגים הגדול ביותר?



### שאלה מספר 11

6 אנרגיות היינון של היסוד X (יסוד כלשהו בטבלה המחזורית) נתונות בטבלה הבאה (ביחידות של  $\text{kJ/mol}$ ):

|   | $E_I(1)$ | $E_I(2)$ | $E_I(3)$ | $E_I(4)$ | $E_I(5)$ | $E_I(6)$ |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| X | 577.5    | 1816.7   | 2744.8   | 11577    | 14842    | 18379    |

על סמך נתונים אלה, איזו מהתרכובות הבאות של X עם גז כלור, היא הנפוצה ביותר?

א.  $\text{XCl}_4$

ב.  $\text{XCl}_2$

ג.  $\text{XCl}$

ד.  $\text{XCl}_3$

ה.  $\text{XCl}_5$

### שאלה מספר 12

למרות שגזים אצילים נחשבים ליציבים מאוד ולכן כמעט ולא מייצרים קשרים כימיים, קיים מספר קטן יחסית של תרכובות של גזים אצילים בדרגות יציבות שונות. על פי מודל לואיס, מי מבין המולקולות הבאות, המכילות את הגז האציל קסנון (Xe), תהיה הכי פחות יציבה?

א.  $\text{XeO}_3$

ב.  $\text{XeOF}_2$

ג.  $\text{XeF}_3$

ד.  $\text{XeF}_2$

ה.  $\text{XeF}_4$

### שאלה מספר 13

המלח סידן היפוכלוריט,  $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ , משמש בעיקר כחומר חיטוי בבריכות שחייה. מהו המשפט הנכון, מבין המשפטים הבאים, לגבי האניון של מלח זה?

- א. לאניון מומנט דיפול השווה לאפס
- ב. סכום המטענים הפורמליים במולקולת האניון שווה לאפס
- ג. המטען הפורמלי על אטום החמצן (O) שווה לאפס
- ד. המבנה המרחבי של מולקולת האניון הוא משולש מישורי
- ה. המטען הפורמלי על אטום החמצן (O) שווה ל: (-1)


### שאלה מספר 14

ליון האצטאט ( $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ) הנוצר מפירוק של חומצה אצטית במים, תפקיד ביולוגי חשוב בתהליכי הפקת אנרגיה בתא. מהו המשפט הנכון, מבין המשפטים הבאים, לגבי יון האצטאט?

- א. ליון זה 2 מבני לואיס רזונטיביים שקולים אחד לשני, עבורם קיים סוג אחד של קשר פחמן-חמצן
- ב. ליון זה מבנה לואיס אחד ויחיד עבורו קיים סוג אחד של קשר פחמן-חמצן
- ג. ליון זה 2 מבני לואיס רזונטיביים אשר אינם שקולים אחד לשני, עבורם קיימים שני סוגים של קשרי פחמן-חמצן
- ד. ליון זה 3 מבני לואיס רזונטיביים שקולים אחד לשני, עבורם קיים סוג אחד של קשר פחמן-חמצן
- ה. ליון זה 2 מבני לואיס רזונטיביים שקולים אחד לשני, עבורם קיימים שני סוגים שונים של קשרי פחמן-חמצן

### שאלה מספר 15

איזה משפט, מבין המשפטים הבאים, נכון לגבי חמש המולקולות הבאות?



- א. בכל המולקולות הנתונות הגיאומטריה המרחבית של אטום הפחמן היא טטרהדרלית
- ב. ל-4 מולקולות מומנט דיפול הגדול מאפס
- ג. בכל המולקולות הנתונות אטום הפחמן (C) קשור בקשר כפול
- ד. ב-2 מולקולות מבין המולקולות הנתונות, המטען הפורמלי על אטום הפחמן שונה מאפס
- ה. בכל המולקולות הנתונות אטום הפחמן (C) קשור בקשר בודד



### שאלה מספר 16

למי מבין המולקולות הבאות לחץ האדים הנמוך ביותר, בהנחה שכולן נמצאות באותם תנאי לחץ וטמפרטורה?

א.  $\text{NH}_3$

ב.  $\text{C}_2\text{H}_2$


ג.  $\text{HI}$

ד.  $\text{PH}_3$

ה.  $\text{CF}_4$

### שאלה מספר 17

נתונה התגובה הכללית  $A, B, C$  הם שמות כלליים ולא יסודות) הבאה בשיווי משקל:



לכלי תגובה ריק הוכנסה תערובת של 1.4 מול של A ו-2.3 מול של B. בשיווי משקל נמצא כי היו בכלי 0.9 מול של A. על סמך נתונים אלה בלבד, כמה מולים של C יש בכלי בשיווי משקל?

א. 1.66

ב. 1.12


ג. 1.35

ד. 0.50

ה. 0.67

### שאלה מספר 18

נתונה תגובת שיווי משקל הבאה:



לכלי הנמצא בטמפרטורה של 298K, ומכיל 0.5 אטמ' של אמוניה ( $\text{NH}_3$ ) בלבד, הוכנסו 10 גרם של אמוניום הידרוסולפאט ( $\text{NH}_4\text{HS}$ ) מוצק והמערכת הגיעה לשיווי משקל. מהו הלחץ החלקי של הגזים בשיווי משקל?

א.  $P(\text{NH}_3)=0.332 \text{ atm}$  ;  $P(\text{H}_2\text{S})=0.332 \text{ atm}$

ב.  $P(\text{NH}_3)=3.320 \text{ atm}$  ;  $P(\text{H}_2\text{S})=3.320 \text{ atm}$

ג.  $P(\text{NH}_3)=3.320 \text{ atm}$  ;  $P(\text{H}_2\text{S})=3.820 \text{ atm}$

ד.  $P(\text{NH}_3)=0.665 \text{ atm}$  ;  $P(\text{H}_2\text{S})=0.165 \text{ atm}$

ה.  $P(\text{NH}_3)=0.165 \text{ atm}$  ;  $P(\text{H}_2\text{S})=0.665 \text{ atm}$

### שאלה מספר 19:

נתרן אסקורבט ( $\text{NaC}_6\text{H}_7\text{O}_6$ ) הוא אחד המלחים של ויטמין C ומשמש בתעשיית המזון כנוגד חמצון. דוגמא של מלח זה הומסה במים לקבלת ריכוז סופי של 0.5M. כמו כן נתון כי:  $K_a(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6)=8 \times 10^{-5}$ . מהו ערך ה-pH של תמיסה זו?

א. 11.8

ב. 10.4

ג. 8.9

ד. 7.3

ה. 5.1

### שאלה מספר 20:

בסיס כלשהו (B), הומס במים לקבלת תמיסה בריכוז של 1M. לתמיסה זו נמדד ערך של pH=10. על סמך נתונים אלה בלבד, מהי הקביעה הנכונה מבין הקביעות הבאות?

א. לא תיתכן תמיסה של בסיס בריכוז של 1M

ב.  $pK_b(B)=1$

ג. אף אחת מבין הקביעות הנתונות איננה נכונה

ד.  $K_a(BH)=1 \times 10^{-6}$

ה. הבסיס הנתון הוא בסיס חזק