

Спектр атома щелочного металла

Атомы щелочных металлов

1 Одноэлектронная модель щелочного атома

Рассмотрим многоэлектронный атом с зарядом ядра $+Ze$, содержащий N электронов. Потенциальную энергию такой системы можно записать в виде

$$U = - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N \frac{e^2}{r_{ik}}.$$

Первое слагаемое описывает кулоновское притяжение электронов к ядру, а второе — кулоновское отталкивание электронов друг от друга.

Для атомов щелочных металлов все внутренние электронные оболочки замкнуты, а на внешней оболочке находится один валентный электрон. Например, для натрия

$$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s.$$

Поэтому щелочной атом удобно рассматривать как систему из атомного остова и одного внешнего электрона.

Обозначим через $\mathbf{r}$ радиус-вектор внешнего электрона, а через $\mathbf{r}_k$ — координаты $N - 1$ внутренних электронов. Отбрасывая постоянную энергию самого атомного остова, для внешнего электрона получим гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + \sum_{k=1}^{N-1} \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|}.$$

2 Поле атомного остова

Рассмотрим внешний электрон на расстоянии, значительно превышающем характерный размер атомного остова:

$$r \gg r_k.$$

Тогда взаимодействие внешнего электрона с каждым внутренним электроном

можно разложить по малому параметру r_k/r :

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_k^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}} \quad (1.1)$$

$$= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r_k^2}{r^2} - 2\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2}}}. \quad (1.2)$$

В первом приближении

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} \simeq \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2} + \dots \right).$$

Подставляя это разложение в гамильтониан, получаем

$$\begin{aligned} \hat{H} \simeq \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} \\ + \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r} \cdot \sum_{k=1}^{N-1} \mathbf{r}_k + \dots \end{aligned} \quad (1.3)$$

Нулевой член разложения даёт

$$-\frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} = -\frac{(Z-N+1)e^2}{r}. \quad (1.4)$$

Введём эффективный заряд атомного остова

$$\boxed{Z_a = Z - N + 1}.$$

Для нейтрального щелочного атома

$$N = Z,$$

поэтому

$$\boxed{Z_a = 1}.$$

Таким образом, на больших расстояниях внешний электрон видит атомный остов как объект с единичным положительным зарядом. В нулевом приближении

$$U_0(r) = -\frac{Z_a e^2}{r}.$$

Поляризация атомного остова

Следующая поправка связана с поляризацией атомного остова полем внешнего электрона. В используемом приближении её запишем как

$$U_1(r) = -C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2},$$

где C_1 характеризует величину поляризационного эффекта.

В результате эффективная потенциальная энергия внешнего электрона имеет вид

$$\boxed{U(r) = -\frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}}.$$

Именно наличие второго слагаемого отличает движение внешнего электрона щелочного атома от движения электрона в чистом кулоновском поле.

3 Уравнение Шрёдингера для внешнего электрона

Запишем стационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\psi = E\psi.$$

Гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}.$$

В сферических координатах

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega,$$

где Δ_Ω — угловая часть оператора Лапласа.

Поэтому

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) - \frac{\hbar^2}{2mr^2} \Delta_\Omega \psi - \frac{Z_a e^2}{r} \psi \\ - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} \psi = E\psi. \end{aligned} \quad (1.5)$$

Так как потенциал центрально-симметричен, разделим переменные:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi).$$

Для сферических функций

$$\Delta_\Omega Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m}.$$

Следовательно, радиальное уравнение принимает вид

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} R - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} R \\ - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Соберём вместе слагаемые, пропорциональные $1/r^2$:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2}{2mr^2} \left[\ell(\ell+1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} \right] R \\ - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER. \end{aligned} \quad (1.7)$$

4 Квантовый дефект

Чтобы привести радиальное уравнение к водородоподобному виду, введём эффективное орбитальное квантовое число $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}(\tilde{\ell} + 1) = \ell(\ell + 1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2}.$$

Это квадратное уравнение относительно $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}^2 + \tilde{\ell} - \ell(\ell + 1) + C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} = 0.$$

Отсюда

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\ell(\ell + 1) - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2}}.$$

Так как

$$1 + 4\ell(\ell + 1) = (2\ell + 1)^2,$$

можно переписать

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2\ell + 1) \sqrt{1 - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2(2\ell + 1)^2}}.$$

Считаем поправку малой и используем разложение

$$\sqrt{1 - x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\tilde{\ell} \simeq -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2\ell + 1) \left[1 - C_1 \frac{4mZ_a e^2}{\hbar^2(2\ell + 1)^2} \right] \quad (1.8)$$

$$= \ell - C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}. \quad (1.9)$$

Введём величину

$$\Delta_\ell = C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}.$$

Тогда

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell.$$

Величина Δ_ℓ называется **квантовым дефектом** или **поправкой Ридберга**.

Эффективное главное квантовое число

Для водородоподобной задачи главное квантовое число имеет вид

$$n = n_r + \ell + 1.$$

После замены

$$\ell \rightarrow \tilde{\ell}$$

получаем

$$\tilde{n} = n_r + \tilde{\ell} + 1.$$

Так как

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell,$$

то

$$\tilde{n} = n_r + \ell + 1 - \Delta_\ell \quad (1.10)$$

$$= n - \Delta_\ell. \quad (1.11)$$

Таким образом,

$$\boxed{\tilde{n} = n - \Delta_\ell}.$$

Формула Бора для водородоподобного уровня

$$E_n = -\frac{Z_a^2 Ry}{n^2}$$

переходит в

$$\boxed{E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}}.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_a = 1$:

$$\boxed{E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}}.$$

5 Физический смысл квантового дефекта

Для атома водорода

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2},$$

то есть энергия зависит только от главного квантового числа n .

Поэтому состояния

$$ns, \quad np, \quad nd, \quad nf, \dots$$

с одинаковым значением n имеют одинаковую энергию.

Это называется случайным, или кулоновским, вырождением.

Для щелочного атома

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2},$$

поэтому энергия уже зависит от ℓ .

Следовательно,

кулоновское вырождение по ℓ снимается.

Из выражения для квантового дефекта

$$\Delta_\ell \propto \frac{1}{\ell + 1/2}$$

следует, что наиболее сильно возмущаются состояния с малыми значениями ℓ .

Качественно

$$\Delta_s > \Delta_p > \Delta_d > \Delta_f > \dots$$

При больших ℓ

$$\Delta_\ell \rightarrow 0.$$

Причина состоит в различной способности электронов проникать внутрь атомного остова.

Для s -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому центробежный барьер отсутствует, и электрон способен глубоко проникать внутрь остова. Там экранирование ядра внутренними электронами уменьшается, поэтому валентный электрон ощущает более сильное кулоновское притяжение.

С ростом ℓ увеличивается центробежный потенциал

$$U_{цб}(r) = \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2mr^2}.$$

Поэтому электрон всё хуже проникает внутрь атомного остова, и его движение становится всё ближе к движению электрона в чистом кулоновском поле.

При фиксированном n получаем порядок уровней

$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$.

6 Квантовые дефекты щелочных металлов

Для основных состояний ряда щелочных металлов:

Элемент	n	Δ
Li	2	0.41
Na	3	1.37
K	4	2.23
Rb	5	3.20
Cs	6	4.13

Для данного элемента и фиксированного ℓ квантовый дефект слабо меняется при изменении n , поэтому целую последовательность возбуждённых уровней можно приближённо описывать одной формулой

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

7 Энергетические уровни атома натрия

Рассмотрим атом натрия

$$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s.$$

Основное состояние внешнего электрона соответствует уровню

$$3s.$$

Энергия ионизации натрия равна приблизительно

$$I_{\text{Na}} \simeq 5.13 \text{ эВ}.$$

Поэтому относительно границы ионизации

$$E_{3s} \simeq -5.13 \text{ эВ}.$$

Для следующих уровней из схемы получаем приблизительно

$$E_{3p} \simeq -2.0 \text{ эВ},$$

$$E_{3d} \simeq -1.6 \text{ эВ}.$$

Для сравнения, в атоме водорода все состояния с $n = 3$ имеют одну энергию:

$$E_3^{(H)} = -\frac{Ry}{3^2} \simeq -1.5 \text{ эВ}.$$

Таким образом, состояние $3d$ натрия уже близко к водородоподобному уровню, тогда как состояние $3s$ сильно смещено вниз.

Это связано с тем, что s -электрон значительно глубже проникает внутрь атомного остова.

8 Диаграмма Гротриана

Для систематизации спектральных уровней и переходов удобно использовать диаграмму Гротриана.

Уровни располагают в столбцах в соответствии с орбитальным квантовым числом:

$$\begin{array}{c|cccc} \ell & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline & S & P & D & F \end{array}.$$

Для электрических дипольных переходов действует правило отбора

$$\Delta\ell = \pm 1.$$

Поэтому разрешены переходы

$$S \leftrightarrow P, \quad P \leftrightarrow D, \quad D \leftrightarrow F.$$

Например, прямой дипольный переход

$$S \leftrightarrow D$$

запрещён.

Главная серия

Главная серия соответствует переходам

$$nP \rightarrow 3S.$$

Нижний уровень здесь является основным состоянием атома натрия.

Головная линия главной серии:

$$3P \rightarrow 3S.$$

Резкая серия

Резкая серия соответствует переходам

$$nS \rightarrow 3P.$$

Диффузная серия

Диффузная серия соответствует переходам

$$nD \rightarrow 3P.$$

Фундаментальная серия

Фундаментальная серия соответствует переходам

$$nF \rightarrow 3D.$$

Названия резкая и диффузная являются историческими и связаны с внешним видом спектральных линий.

9 Тонкая структура щелочного атома

До сих пор спин-орбитальное взаимодействие не учитывалось.

Для внешнего электрона

$$s = \frac{1}{2}.$$

Полный момент импульса

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

По правилу сложения моментов при $\ell \neq 0$

$$j = \ell \pm \frac{1}{2}.$$

Поэтому каждый уровень при $\ell \neq 0$ расщепляется на два подуровня.
Например,

$$P \longrightarrow P_{1/2}, P_{3/2},$$

$$D \longrightarrow D_{3/2}, D_{5/2},$$

$$F \longrightarrow F_{5/2}, F_{7/2}.$$

Для S -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому возможно только

$$j = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, S -терм на два значения j не расщепляется.
Таким образом:

- вырождения по ℓ в щелочном атоме уже нет;
- каждый уровень при $\ell \neq 0$ дополнительно расщепляется за счёт спин-орбитального взаимодействия.

Поправка тонкой структуры

Для водородоподобного уровня поправка тонкой структуры записывается в виде

$$\delta E_{\text{fs}} = -\frac{\alpha^2 Z_a^4 Ry}{n^3} \left[\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right].$$

Здесь

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$$

— постоянная тонкой структуры.

Так как энергия зависит от j , состояния

$$j = \ell - \frac{1}{2}$$

и

$$j = \ell + \frac{1}{2}$$

имеют немного различные энергии.

Поэтому спектральные линии могут расщепляться на дублеты.

Для главной линии натрия переход

$$3P \rightarrow 3S$$

с учётом тонкой структуры превращается в два перехода:

$$3P_{1/2} \rightarrow 3S_{1/2},$$

$$3P_{3/2} \rightarrow 3S_{1/2}.$$

Поэтому знаменитая жёлтая линия натрия вблизи

$$\lambda \simeq 589 \text{ нм}$$

при достаточном спектральном разрешении наблюдается как дублет.

10 Рентгеновские спектры

До сих пор рассматривались главным образом переходы внешнего электрона.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда из атома удаляется внутренний электрон. При этом на одной из внутренних оболочек возникает вакансия.

Электрон с более высокой оболочки может перейти на освободившийся уровень, а разность энергий выделяется в виде рентгеновского фотона:

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Внутренние электронные оболочки обозначаются буквами

$$K, \quad L, \quad M, \quad N, \dots$$

в соответствии с

$$K \leftrightarrow n = 1,$$

$$L \leftrightarrow n = 2,$$

$$M \leftrightarrow n = 3,$$

$$N \leftrightarrow n = 4.$$

Характерные энергии удаления различных электронов могут отличаться на порядки. Для натрия валентный $3s$ -электрон связан с энергией порядка нескольких электрон-вольт, тогда как удаление $1s$ -электрона требует энергии порядка 10^3 эВ.

Поэтому переходы между внутренними оболочками лежат в рентгеновском диапазоне.

Рентгеновские серии

Если переход заканчивается на K -оболочке, соответствующие линии образуют K -серии.

Переход

$$L \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\alpha}.$$

Переход

$$M \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\beta}.$$

Переход

$$N \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\gamma}.$$

Аналогично, переход

$$M \rightarrow L$$

даёт линию

$$L_{\alpha}.$$

11 Экранирование внутренних электронов

Для внутреннего электрона энергию приближённо можно записать в водородоподобной форме, заменив заряд ядра Z эффективным зарядом

$$Z_{\text{eff}} = Z - a_n,$$

где a_n — постоянная экранирования для соответствующей оболочки.

Тогда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2.$$

12 Закон Мозли

Пусть электрон переходит из состояния с главным квантовым числом n_i в состояние с n_f , причём

$$n_i > n_f.$$

Энергия испущенного фотона равна

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Для начального состояния

$$E_i = -Ry \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2},$$

а для конечного

$$E_f = -Ry \frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2}.$$

Следовательно,

$$\hbar\omega = Ry \left[\frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2} \right].$$

Для данной рентгеновской серии можно приближённо заменить

$$a_i \simeq a_f \simeq a,$$

где a — средняя постоянная экранирования.

Тогда

$$\hbar\omega \simeq Ry(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Отсюда

$$\sqrt{\frac{\hbar\omega}{Ry}} = (Z - a) \sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}}.$$

Для фиксированной спектральной линии n_i и n_f постоянны, поэтому

$$\sqrt{\omega} \propto Z - a.$$

Это соотношение называется **законом Мозли**.

Таким образом, квадратный корень из частоты характеристического рентгеновского излучения линейно зависит от атомного номера элемента.

Линия K_α

Для линии K_α

$$n_i = 2, \quad n_f = 1.$$

Поэтому

$$\hbar\omega_{K_\alpha} = Ry(Z - a)^2 \left(1 - \frac{1}{4} \right) \tag{1.12}$$

$$= \frac{3}{4} Ry(Z - a)^2. \tag{1.13}$$

Следовательно,

$$\hbar\omega_{K_\alpha} = \frac{3}{4}Ry(Z - a)^2.$$

Или

$$\sqrt{\frac{\hbar\omega_{K_\alpha}}{Ry}} = \frac{\sqrt{3}}{2}(Z - a).$$

Для линии K_α на лекции приводилось эмпирическое значение

$$a \simeq 1.17, \quad Z < 30.$$

Для линии L_α

$$a \simeq 7.9, \quad Z > 62.$$

13 Итоговая структура уровней

Для чистого кулоновского поля энергия зависит только от главного квантового числа:

$$E = E(n).$$

Учёт взаимодействия валентного электрона с атомным остовом приводит к появлению квантового дефекта:

$$E = E(n, \ell).$$

При этом снимается случайное кулоновское вырождение по ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

После учёта спин-орбитального взаимодействия энергия зависит также от полного момента электрона:

$$E = E(n, \ell, j).$$

Таким образом, последовательность уточнений имеет вид

$$E(n) \longrightarrow E(n, \ell) \longrightarrow E(n, \ell, j).$$

Для внутренних электронов удобно пользоваться моделью экранированного заряда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2,$$

которая приводит к закону Мозли для характеристического рентгеновского спектра.