

1有正常微生物群存在的部位是 (D)

A胃、肠道、腹腔

B鼻咽腔、眼结膜、脑脊液

C胆囊、肝脏、十二指肠

D尿道、口腔、外耳道

E皮肤、黏膜、淋巴液

2细菌的F质粒是 (D)

A'前噬菌体成分

B细菌的染色体成分

C带有毒性基因的可传递DNA

D赋予细菌性菌毛的可传递DNA ✓

E赋予细菌耐药性的可传递DNA

3. 下列关于病毒疫苗的描述中，不正确的是 (D)

A减毒活疫苗具有回复毒力的可能 ✓

B某些疫苗需要加强免疫

C'所有抗病毒疫苗只能在感染前接种

D灭活疫苗不能诱导sIgA ✗

E灭活疫苗也可诱导CTL ✓

4. 病毒的复制周期中，除哪项外均正确 (D)

A吸附 ✓

B穿入 ✓

C脱壳 ✓

D二分裂 ✗ 生物分裂

E成熟和释放 ✓

5. 破伤风是破伤风梭菌所致的 (D)

A菌血症

B败血症

C脓血症

D毒血症

E脓毒败血症

菌不入血.

6.关于皮肤癣菌的致病特点，错误的是（C）

- A一种皮肤癣菌可引起不同部位感染
- B同一部位感染也可由不同皮肤癣菌引起
- C是一种条件致病性真菌 ~~X~~
- D引起的真菌病最多
- E常侵犯角质蛋白丰富的部位

7.培养支原体最必需的成分是（B）

- A蛋白质
- B胆固醇 ✓
- C葡萄糖
- D磷脂
- E维生素B

8.肠热症所引起的外周血细胞变化是（E）

- A嗜酸性粒细胞增多
- B嗜碱性粒细胞降低
- C血红蛋白降低
- D外周白细胞上升
- E外周白细胞下降

9.关于立克次体，下列叙述哪项不正确（B）

- A大多是专性细胞内寄生
- B对抗生素不敏感 ~~X~~
- C大多是人畜共患病原体
- D节肢动物常为传播媒介
- E含有DNA和RNA两类核酸

10.人巨细胞病毒感染患者标本中可见（D）

- A核内嗜碱性包涵体
- B核内嗜酸性包涵体
- C核内和胞质嗜碱性包涵体
- D核内和胞质嗜酸性包涵体
- E胞质嗜碱性包涵体

11.伤寒沙菌Vi抗原（E）

- A存在于菌毛蛋白
- B存在于鞭毛蛋白

C可用于沙门菌分组

D可用于沙门菌分型

E刺激机体产生的抗体效价低

12.不能侵害指甲的皮肤癣菌是 (D)

A红色毛癣菌

B须毛癣菌

C絮状表皮癣菌

D小孢子癣菌属

E紫色毛癣菌

13.基因工程疫苗是 (C)

A将编码保护性抗原的基因重组到质粒表达载体上，
导入宿主体内

B是提取病原体保护性抗原表位制成的疫苗

C是将编码某一蛋白抗原的基因转入减毒的病毒或细菌制成的疫苗将编码病原体保护性抗原表位的目的基因导入原核或真核表达系统中表达、纯化制成的疫苗

E通过毒力变异或者自然选择制成的疫苗

14.处于生长周期中对数生长期的细菌特点是 (E)

A菌体增大并且代谢活跃

B向菌体外释放大量毒素

C生物学性状不十分典型

D有芽孢的细菌开始形成芽孢

E对外界环境因素的作用敏感

15.蝌蚪形噬菌体负责将头部的核酸注入宿主菌细胞内的器官是 (A)

A尾髓

B尾鞘

C尾丝

D尾板

E尾刺

16.结核分枝杆菌引起的疾病中最常见的是 (B)

A结核性胸膜炎

- B肺结核
- C结核性关节炎
- D结核性脑膜炎
- E肠结核

17.可以用于沙眼的辅助诊断是 (C)

- A墨汁负染色
- B冷凝集试验
- C包涵体检查
- D显微镜凝集试验
- E外斐反应

18.下列细菌毒素中毒性最强的是 (E)

- A破伤风痉挛毒素
- B炭疽毒素
- C白喉外毒素
- D霍乱肠毒素
- E肉毒毒素

19.在EBV血清学诊断中, 异嗜性抗体主要用于诊断的疾病是 (D)

- A非洲儿童恶性淋巴瘤
- B鼻咽癌
- C舌毛状白斑病
- D传染性单核细胞增多症
- E霍奇金淋巴瘤

20.将脊髓灰质炎病毒排出体外的主要排泄物是 (E)

- A飞沫
- B鼻分泌物
- C眼分泌物
- D尿液
- E粪便

17b

21.关于转座子, 叙述错误的是 (C)

- A是一种转位因子
- B长度一般超过2kb
- C不携带结构基因

✓

21c

D可能与细菌的多重耐药性有关

E是染色体或质粒中能够转移位置的一段DNA序列

22. 预防脊髓灰质炎进行人工自动免疫的主要对象是 (E)

A 野外工作者

B 青壮年

C 林区工人

D 老年人

E 5岁以内的儿童

23. 可迟缓发酵乳糖的细菌是 (A)

A 宋内志贺菌个别菌株

B 福氏志贺菌个别菌株

C 鲍氏志贺菌个别菌株

D 痢疾志贺菌个别菌株

E 伤寒沙门菌个别菌株

24. 儿童患流行性腮腺炎时常见的并发症是 (A)

A 睾丸炎或卵巢炎

B 肝炎

C 胃肠炎

D 肾炎

E 肺炎

25. 关于革兰阳性菌错误的叙述是 (B)

A 细胞壁主要成分为肽聚糖

B 细胞壁主要成分为脂多糖

C 与结晶紫牢固结合

D 不能形成内毒素

E 对青霉素敏感

26. 鉴别甲型溶血性链球菌与肺炎链球菌最可靠的方法是 (D)

A 糖发酵试验

B 革兰染色镜检

C 菌落特征

D 胆汁溶菌试验

E血琼脂平板.上溶血特征

27.普氏立克次体的主要传播途径是 (D)

A消化道

B呼吸道

C生殖道感染

D虱叮咬后经破损皮肤进入体内

E蚤叮咬后入血

28.内毒素的主要成分为 (D)

A肽聚糖

B蛋白质

C糖蛋白

DLPS

E核酸

29对病毒体的错误叙述是 (B)

A以复制方式繁殖

B测量单位是 μm ~~X~~ nm

C只含一种核酸

D是专性细胞内寄生物

E对抗生素不敏感

30细菌的染色体外遗传物质是指 (A)

A质粒

B mRNA

C性菌毛

D异染颗粒

E核蛋白体

31.VZV侵犯的主要细胞是 (A)

A上皮细胞

B神经细胞

C中性粒细胞

D巨噬细胞

EB细胞

32.G细胞壁特有成分是 (D)

A磷壁酸

B肽聚糖

C多聚糖

D外膜

E中介体

33.关于病毒核酸，正确的是 (A)

A可控制病毒的遗传和变异 ✓

B决定病毒包膜所有成分的形成

C RNA不能携带遗传信息

D不能决定病毒的感染性

E病毒有一种或两种类型核酸

34.属于L型细菌的特性是 (B)

A无致病性

B常规培养形成油煎蛋菌落 ✓

C形成不可逆性变异

D细菌菌落为光滑型

E形态可改变

35.关于二重感染的叙述，下列哪项是错误的 (A)

A是免疫功能缺陷的严重后果 ✗

B是微生态平衡失调的一种严重后果 ✓

C是菌群失调症的一种类型 ✓

D是抗生素治疗原感染性疾病过程中的一种新感染 ✓

E应重新选用敏感抗生素治疗 ✓

36.乙型肝炎患者血清中通常不能检出的成分是 (E)

A HBsAg

B抗-HBS

C HBeAg

D抗-HBe

E HBcAg ✓

37.在液体培养基中菌膜生长的下列细菌是 (E)

A 肉毒梭菌

B 变形杆菌

C 产气荚膜梭菌

D 布鲁菌

E 结核分枝杆菌

38. 霍乱毒素相应的受体是 (E)

A 糖蛋白

B 黏蛋白

C 岩藻糖

D 甘露糖

E GM1 神经节苷脂 ✓ G1U1

39. 下列哪项与结核分枝杆菌的致病性无关 (D)

A 多糖

B 蛋白质

C 脂质成分

D 内毒素

E 免疫损伤

40. 可辅助 HDV 复制的病毒是 (B)

A. HAV

B. HBV ✓

C. HCV

D. HEV

E. HSV

41. 感染宿主细胞能形成包涵体的原核细胞型微生物是 (E)

A 巴通体

B 立克次体

C 螺旋体

D 支原体

E 衣原体 ✓ 衣原体

42. 对外毒素特性叙述不正确的是 (B)

A 由细菌合成分泌

B 主要成分是脂多糖

C 毒性强

D 抗原性强

E 性质不稳定

43. 新型隐球菌与白假丝酵母菌的主要区别在于后者

(B)

A以出芽方式繁殖

B形成假菌丝

C只能在37°C生长

D菌体呈卵圆形

E对抗生素不敏感

44.机体获得人工主动免疫的方式是 (A)

A注射类毒素

B注射抗毒素

C注射细胞因子

D注射胎盘球蛋白

E通过胎盘从母体获得

45.哪种细菌可因手术不当引起腹膜炎 (A)

A大肠埃希菌

B痢疾杆菌

C伤寒沙门菌

D肠炎沙门菌

E霍乱弧菌

46.溶菌酶杀灭细菌的作用机理是 (A)

A裂解肽聚糖骨架的 β -1,4糖苷键

B竞争肽聚糖合成中所需的转肽酶

C抑制核蛋白体的小亚基结合作用

D竞争性抑制叶酸的合成代谢

E破坏细胞膜的呼吸作用

47.丙种球蛋白的优点是(C)

A来源广

B易制备

C免疫效果好

D含多种微生物抗体

E易保存

48.均不通过呼吸道感染的病毒组合是(C)

A流感病毒、麻疹病毒、埃可病毒

B风疹病毒、腺病毒、腮腺炎病毒

C 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒

D 脊髓灰质炎病毒、轮状病毒

E 冠状病毒、柯萨奇病毒

49. 下列微生物都能通过除菌滤器，例外的一种是 (B)

A 放线菌

B 病毒

C 衣原体

D 支原体

E L型细菌

50. 下列各项对病毒感染性疾病的描述中正确的 (B)

A 一种病毒引起一种疾病

B 很多病毒感染不能产生临床症状

C 可以根据病毒的形态预测所致疾病的类型

D 一种疾病由一种病毒引起

E 病毒感染的临床表现完全与其他病原体不同

51. 机体对外毒素免疫作用是依靠抗毒素的 (D)

A 杀灭作用

B 调理作用

C 吞噬作用

D 中和作用

E 清除作用

52. 关于病毒隐性感染者免疫力的描述中不正确的是

(E)

A 部分患者可获得免疫力而终止感染

B 非特异性免疫有助于病毒隐性感染终止

C 患者可成为无症状携带者

D 隐性病毒感染既可诱导体液免疫也可诱导细胞免疫反应

E 干扰素对隐性感染病毒无抑制作用

53. 可用于检测病毒蛋白成分的方法是 (C)

A PCR技术

B Southern印迹法

C Western印迹法

D Northern印迹法

E斑点分子杂交法

54.关于血清学诊断方法，下列哪项是错误的 (D)

A伤寒-肥达试验

B风湿热-抗O试验

C斑疹伤寒-外斐反应

D结核-结核菌素试验

E梅毒-螺旋体制动试验

55.决定病毒体感染细胞的关键物质是 (C)

A衣壳

B包膜

C核酸

D刺突

E核蛋白

56.质粒在细菌间的转移方式主要是 (B)

A转化

B接合

C转导

D溶源性转换

E原生质融合

57.伤寒沙门菌致病特点是 (B)

A不引起持续高热

B可在肠道淋巴组织内繁殖

C没有第二次菌血症

D不侵犯肝、脾、肾等器官

E可引起内脏化脓性感染

58.下列关于隐球菌的描述中正确的是 (D)

A为多细胞真菌

B可形成丝状形菌落

C是致病性真菌

D多引起外源性感染

E可形成关节孢子

59.可用皮肤变态反应帮助诊断的是 (E)

A 金黄色葡萄球菌感染

B 霍乱弧菌感染

C 志贺菌感染

D 淋病奈瑟菌感染

E 布鲁菌感染

60. 做抗生素敏感试验时，应选择 (D)

A 迟缓期

B 稳定期

C 衰亡期

D 对数生长期 ✓

E 衰亡期前期

61. 以下不属于狂犬病的临床表现的是 (B)

A 恐水症

B 角弓反张 ✓

C 吞咽或饮水困难

D 循环衰竭

E 昏迷、呼吸衰竭

62. 性病淋巴肉芽肿的病原体是 (D)

A 肺炎衣原体

B 鹦鹉热衣原体

C 脲原体

D 沙眼衣原体 ✓

E 兽类衣原体

63. 编码抗菌药物耐药性的是 (B)

A F质粒

B R质粒 ✓

C Col质粒

D Vi质粒

E 代谢质粒

64. 可引起亚急性硬化性全脑炎(SSPE)的病原体是 (C)

A 埃可病毒

B 轮状病毒

C麻疹病毒 ✓

D流感病毒

E风疹病毒

65. 诊断流感病毒最常用的血清学方法是 (A)

A血凝抑制试验 ✓

B中和试验

C补体结合试验

D荧光抗体法

E冷凝集试验

66. 能够增强细菌毒力的质粒是 (D)

A F质粒

B R质粒

C Col质粒

D Vi质粒 ✓

E代谢质粒

67. 下列型别最多的病毒是 (D)

A腺病毒

B麻疹病毒

C冠状病毒

~~D鼻病毒~~

E风疹病毒

68. 有包膜的病毒侵入细胞的方式是 (D)

A胞饮

B直接穿入

C吞噬

D膜融合 ✓

E裂解细胞膜

69. 肠热症患者并发症肠出血和肠穿孔的机理是 (B)

A第二次菌血症

B细菌再次侵入肠壁淋巴组织，使组织发生超敏反应，导致局部的坏死和溃疡

C沙门菌释放的内毒素

D沙门菌释出的肠毒素

E沙门菌具有的侵袭力

70根据产气荚膜梭菌的毒素产生情况，可将其分为5个毒素型，对人致病的主要为 (A)

A A型

B B型

C C型

D D型

E E型

71. 金刚烷胺抗病毒作用主要机制 (A)

A抑制病毒蛋白质合成

B抑制病毒脱衣壳

C促进感染细胞溶酶体释放

D干扰病毒核酸的合成

E抑制病毒组装、成熟和释放

72结构最简单的病毒体为 (C)

A核酸

B衣壳

C核衣壳

D核衣壳和包膜

E原生小体

73. 关于汉坦病毒生物学性状，错误的是 (E)

A基因组分三个片段

B包膜表面 有两种糖蛋白

C可凝集鹅红细胞

D能在体外多种细胞中增殖

E敏感动物是家兔

74. 巨细胞病毒常引起 (D)

A唇疱疹

B带状疱疹

C病毒性脑炎

D先天性畸形

E传染性单核细胞增多症

76. 对铜绿假单胞菌致病性的描述，错误的是 (E)

- A可发生于烧伤感染 ✓
- B可发生于医院内感染 ✓
- C可发生于免疫功能低下患者的继发感染 ✓
- D可引起婴儿严重的流行性腹泻 ✓ 33
- E对多种抗生素敏感

77. 具有Vi抗原的沙门菌是 (A)

- A伤寒沙门菌
- B肠炎沙门菌
- C鼠伤寒沙门菌
- D甲型副伤寒沙门菌
- E肖氏沙门菌

78. 下列物质中，具有感染性的是 (A)

- A Dane颗粒
- B 小球形颗粒
- C 管形颗粒
- D HBeAg
- E HBcAg

79. 轮状病毒的核酸类型是 (A)

- A 分节段的双链RNA
- B 分节段的单负链RNA
- C 单正链RNA
- D 单链DNA
- E 双链DNA

80. 分离培养后，对细菌具有初步鉴别诊断意义的细菌代谢产物是 (D)

- A vitamin
- B antibiotics
- C exotoxin
- D pigment
- E endotoxin

81. 不属于衣原体引起的疾病的是 (A)

- A 回归热
- B 性病淋巴肉芽肿 ✓

C沙眼✓

D包涵体结膜炎✓

E婴幼儿肺炎

82.常用减毒活疫苗预防的疾病是 (D)

A狂犬病、麻疹

B破伤风、百日咳

C白喉、乙型肝炎

D脊髓灰质炎、结核病✓

E流行性乙型脑炎、腮腺炎

83.白假丝酵母菌在玉米培养基上可形成 (A)

A厚膜孢子

B关节孢子

C分生孢子

D有性孢子

E孢子囊孢子

84.使形成原生质体的细菌发生融合，获得多种类型重组融合体，称为 (E)

A转化

B接合

C转导

D溶原性转换

E原生质融合✓

85.下列分子生物学实验中，检测病毒蛋白的方法是 (D)

A原位杂交

B点杂交

C Southern blot

D Western blot✓

E Northern blot

86.下列关于白假丝酵母菌的描述，正确的是 (C)

A革兰染色阴性

B可产生关节孢子

C可用青霉素进行治疗

D一般不引起皮肤及黏膜感染

E可引起全身脏器感染

87. 下列哪种微生物与龋齿的发病关系密切 (A)

A放线菌

B大型支原体

C奋森螺旋体

D巴西诺卡菌

E星型诺卡菌

88. 引起牙周脓肿最常见的病原菌是 (A)

A甲型溶血性链球菌

B类白喉杆菌

C无芽孢厌氧菌

D铜绿假单胞菌

E白念珠菌(白假丝酵母菌)

89. 不是克里米亚-刚果出血热主要表现的是 (A)

A肾功能损害

B高热

C脏器出血

D低血压或休克

E皮下出血

90. 非致病性着色真菌与致病性着色真菌的主要区别是 (C)

A腐生性

B 37°C生长性

C自然界分布性

D菌体形态

E菌落形态

91. 引起烫伤样皮肤综合征最常见的致病菌是 (C)

A表皮葡萄球菌

B凝固酶阴性葡萄球菌

C金黄色葡萄球菌

D腐生性葡萄球菌

E人葡萄球菌

92. 逆转录病毒增殖的突出特点 (C)

A 需要RNA酶

B 需逆转录酶

C 病毒RNA复制时要通过DNA复制中间型

D 病毒核酸整合到细胞基因组中

E 以出芽方式释放到细胞外

93. 对结核菌素试验的叙述, 错误的是 (E)

A 属于皮肤迟发型超敏反应

B 可检测机体对结核分枝杆菌的免疫状况

C 皮肤反应程度以局部红肿, 硬结的直径为标准

D 可检测肿瘤患者的细胞免疫功能状况

E 12~18小时观察结果

94. 关于噬斑形成单位的叙述, 正确的是 (B)

A 可用于任何类型噬菌体的定量检测

B 只可用于毒性噬菌体的定量检测

C 只可用于温和噬菌体的定量检测

D 只可用于丝状噬菌体的定量检测

E 只可用于溶原性噬菌体的定量检测

95. 新生隐球菌的主要传播方式是 (B)

A 病人-咳痰-飞沫传播

B 鸽子-粪便-呼吸道传播

C 病人-粪便-消化道传播

D 病人-粪便-呼吸道传播

E 人虱-粪便-破损皮肤传播

96. 疱疹病毒的共同特点不包括 (E)

A 中等大小包膜的病毒

B 核酸为双链DNA

C 衣壳呈二十面体立体对称

D 除EBV外均可在感染细胞核内形成包涵体

E 病毒感染的控制主要依赖体液免疫

97. HSV-1感染引起的疾病一般不包括 (D)

A 龈口炎

B 唇疱疹

17

C角膜结膜炎

D生殖器疱疹

E脑炎

98.S-R变异属于 (C)

A形态结构变异

B抗原性变异

C菌落变异

D毒力变异

E耐药性变异

99.金黄色葡萄球菌特殊的表面结构蛋白是(A)

A SPA

B荚膜

C黏附素

D胞壁肽聚糖

E脂多糖

100.患病后可获得终身牢固免疫力的病毒是 (D)

A 冠状病毒

B鼻病毒

C流感病毒

D腮腺炎病毒

E呼吸道合胞病毒

101.细胞受病毒感染后可在胞浆或/和核内形成一种具有诊断意义的物质 (E)

A质粒

B溶酶体

C核糖体

D中介体

E包涵体

102.下列哪项不属于机体正常组织和体液中的抗菌物质 (D)

A补体

B溶菌酶

C防御素

D抗毒素

E乙型溶素

103.伤寒病人发病第一周内，分离病原菌应采取的标本是 (A)

A血液

B尿液

C粪便

D脑脊液

E呕吐物

104. ETEC产生的不耐热肠毒素的致病机制是 (B)

A吸附

B.A亚单位穿越细胞膜与腺苷酸环化酶作用

C聚集性黏附

D引起核糖体功能障碍

E激活鸟苷酸环化酶

105.下列选项中，不属于慢发病毒感染特征的是 (C)

A潜伏期长

B发病后症状持续性加重

C潜伏期不能检测到病毒或病毒抗原

D可在隐性感染后进入长潜伏期

E可在显性感染后进入长潜伏期

106.以下属于活疫苗制剂的是 (E)

A亚单位疫苗

B化学疫苗

C DNA重组疫苗

D核酸疫苗

E减毒疫苗

107.对脂溶剂不敏感的病毒是 (A)

A HAV

B HBV

C HCV

D HDV

E HSV

108. 葡萄球菌噬菌体分型的意义是 (D)

A 确定其致病性

B 确定其耐药性

C 确定葡萄球菌抵抗力

D 流行病学调查追踪传染源

E 测定细菌对药物的敏感性

109. β -棒状杆菌噬菌体感染了不产生白喉外毒素的白喉杆菌便可使其产生白喉外毒素，发生这种变异的原因是 (D)

A 转化

B 接合

C 转导

D 溶原性转换

E 原生质融合

110. 在全球广泛引起AIDS的病原体是 (C)

A HPV

B HTLV-1

C HIV-1

D HTLV-2

E HIV-2

111. 可能引发超敏反应的免疫制剂是 (C)

A 丙种球蛋白

B 白细胞介素

C 抗毒素

D 干扰素

E 类毒素

112. 细菌内毒素的成分是 (E)

A 肽聚糖

B H抗原

C O抗原

D 菌毛

E 脂多糖

113.观察白喉棒状杆菌异染颗粒常用的染色方 (C)

A革兰染色

B抗酸染色

C Albert染色

D稀复红染色

E镀银染色

114.可引起自然疫源性疾病的病毒是 (A)

A登革病毒

B单纯疱疹病毒

C戊型肝炎病毒

D脊髓灰质炎病毒

E轮状病毒

115.志贺菌感染防治原则不包括 (E)

A隔离病人

B消毒排泄物

C主要防御机制是肠黏膜表面的sIgA

D容易出现多重耐药

E应用灭活疫苗进行预防

116.整合有前噬菌体的细菌, 获得新的遗传性状的过程, 称为 (D)

A转化

B接合

C转导

D溶原性转换

E原生质融合

117.不能在无生命培养基中生长的螺旋体是 (D)

A奋森螺旋体

B .回归热螺旋体

C伯氏疏螺旋体

D梅毒螺旋体

E钩端螺旋体

118.下列哪种毒素抑制乙酰胆碱的释放 (D)

A破伤风溶血素

- B破伤风痉挛毒素
- C产气荚膜梭菌 β 毒素
- D肉毒毒素
- E链球菌溶血素

119. 下列哪种毒素分解细胞膜卵磷脂 (A)

- A产气荚膜梭菌 α 毒素
- B产气荚膜梭菌 β 毒素
- C破伤风痉挛毒素
- D破伤风溶血素
- E肉毒毒素

120. 甲型流感病毒易发生变异的原因是 (C)

- A HA、NA和相应抗体结合导致灭活
- B脂溶剂裂解脂质包膜发生L型变异
- C RNA分节段而易于发生基因重组
- D基质蛋白受干扰素影响合成受阻
- E基质蛋白易受理化因素影响而变构

121. 下列病毒的基因组可直接作为mRNA的一组病毒是 (C)

- A脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、流感病毒
- B脊髓灰质炎病毒、HIV、麻疹病毒
- C脊髓灰质炎病毒、甲型肝炎病毒、埃可(ECHO)病毒
- D脊髓灰质炎病毒、乙型肝炎病毒、轮状病毒
- E脊髓灰质炎病毒、麻疹病毒、甲型肝炎病毒

122. 难以分离出HIV的艾滋病患者标本是 (D)

- A精液
- B外周血
- C唾液
- D粪便
- E脑脊液

123. 对于腺病毒的描述错误的是 (A)

- A感染后可获得牢固免疫力而避免再感染
- B血清型别多
- C基因组为双链DNA

D无包膜，对脂溶剂不敏感

E可侵犯人体多种组织和器官

124.关于机会致病菌感染，下列叙述哪项是不正确的
(E)

A为内源性感染

B多发生医院感染

C发生于免疫功能低下者

D常发生二重感染

E近年来感染率呈下降趋势

125.测量病毒大小通常是用 (E)

A m

B cm

C mm

D um

E nm

126.口服脊髓灰质炎病毒疫苗的疫苗性质是 (A)

A减毒活疫苗

B灭活疫苗

C亚单位疫苗

D基因工程疫苗

E温度敏感株疫苗

127.引起人类梅毒的病原体是 (D)

A雅司螺旋体

B回归热疏螺旋体

C伯氏疏螺旋体

D苍白密螺旋体

E钩端螺旋体

128.可经垂直感染导致畸胎的病毒是 (B)

A麻疹病毒

B风疹病毒

C流感病毒

D乙型脑炎病毒

E脊髓灰质炎病毒

129.噬菌体在分类上属于 (B)

A细菌

B病毒

C真菌

D支原体

E衣原体

130.某患者大面积烧伤，伤口坏死组织多，首先应采取以下哪种方法给予处理 (A)

A清创，扩创，注射TAT

B清创，扩创，注射DPT

C清创，扩创，注射OT

D简单处理伤口以便减少患者的疼痛

E立即注射大剂量链霉素

131.脊髓灰质炎病毒感染的最常见的临床表现是 (B)

A无菌性脑膜炎

B隐性感染

C非麻痹型脊髓灰质炎

D延髓麻痹

E永久性迟缓性肢体麻痹

132.急性病毒感染引起的炎症反应中，炎性细胞主要是 (B)

A中性粒细胞

B单核细胞

C嗜酸性粒细胞

D嗜碱性粒细胞

E NK细胞

133.不属于毒性噬菌体复制周期的阶段是 (B)

A吸附

B脱壳

C穿入

D生物合成

E成熟与释放

- 134.“流产转导”是指噬菌体携带的外源DNA (D)
A未能进入受体菌
B进入受体菌后未能增殖
C进入受体菌与染色体重组后未能表达其特性
D进入受体菌后游离存在而未能与染色体DNA整合在一起
E进入受体菌后自身复制
- 135.弧菌具有下列哪种结构 (A)
A鞭毛
B芽孢
C Vi抗原
D M蛋白
E异染颗粒
- 136.关于血清学诊断，错误的是 (C)
A是一种用已知抗原检测抗体的免疫学检查方法
B常用于抗原性较强的病原菌感染性疾病的诊断
C是一种以效价为测量单位的半定量试验
D适用于病程短的传染病的诊断
E可用于人群免疫水平的调查
- 137.有关衣原体的描述正确的是 (E)
A原体是发育周期中的繁殖型
B细胞质包围原体形成空泡
C原体在细胞外不稳定
D在空泡内始体增大而发育成原体
E原体以吞饮方式进入细胞
- 138.HCV最主要的传播途径 (B)
A消化道传播
B血液和血制品
C日常生活接触
D母婴传播
E性接触传播
- 139.不属于人工被动免疫方式的是 (B)
A注射胸腺素

B注射免疫核糖核酸

C注射胎盘丙种球蛋白

D注射人血清丙种球蛋白

E通过胎盘从母体获得抗体

140. 下列细菌中除哪一种外均能引起败血症 (D)

A链球菌

B大肠杆菌

C脑膜炎球菌

D破伤风梭菌

E肠炎沙门菌

141. 不构成细菌侵袭力的组分是 (C)

A荚膜

B菌毛

C芽孢

D膜磷壁酸

E血浆凝固酶

142. 下列物质不属于侵袭力的是 (D)

A Vi抗原

B M蛋白

C荚膜

D肠毒素

E普通菌毛

143. 以内毒素作为主要致病物质的细菌是 (A)

A布鲁菌

B破伤风梭菌

C结核分枝杆菌

D金黄色葡萄球菌

E肺炎链球菌

144. 下列疾病出现皮肤慢性移行性红斑的是 (A)

A莱姆病

B梅毒

C品他病

D雅司

E足菌肿

145.风湿热辅助诊断试验是 (E)

A协同凝集试验

B肥达反应

C外斐反应

D溶菌试验

E ASO试验

146.外毒素的化学性质是 (C)

A脂类

B多糖

C蛋白质

D氨基酸

E脂多糖

147.可使感染细胞发生融合的病毒是 (C)

A流感病毒

B腺病毒

C麻疹病毒

D鼻病毒

E埃可病毒

148.符合逆转录病毒复制特点的描述是 (A)

A以RNA为模板，先转录互补DNA

B以RNA为模板，先转录早期mRNA

C以RNA直接作为mRNA

D以亲代DNA为模板，产生复制中间型

E以DNA为模板直接转录子代DNA

149.脑脊液离心涂片染色，镜检发现白细胞内外均有革兰阴性双球菌，该患者可诊断为 (C)

A结核性脑膜炎

B脱髓鞘脑脊髓膜炎

C流行性脑脊髓膜炎

D流行性乙型脑炎

E新型隐球菌性脑膜炎

150.属于真核细胞型微生物的是 (C)

- A螺旋体
- B放线菌
- C真菌
- D细菌
- E病毒

151. 紧急预防病毒感染最有效的方法是 (B)

- A用化学药物
- B用免疫血清
- C用减毒活疫苗
- D用干扰素
- E用灭活疫苗

152. 调查人群对白喉棒状杆菌的免疫力可用 (B)

- A结核菌素(OT)试验
- B锡克试验
- C肥达试验
- D外斐反应
- E狄克试验

153. 下列哪种微生物无细胞壁 (D)

- A螺旋体
- B结核分枝杆菌
- C肺炎链球菌
- D肺炎支原体
- E白喉棒状杆菌

154. 细胞壁缺陷的微生物是 (E)

- A金黄色葡萄球菌
- B肺炎支原体
- C普氏立克次体
- D沙眼衣原体
- E L型细菌

155. 对病毒干扰现象叙述错误的是 (A)

- A只发生在活病毒之间
- B可使感染自然终止
- C与干扰素产生有关

D与病毒竞争细胞受体有关

E与缺损干扰颗粒有关

156.以噬菌体为媒介把供体菌的DNA片段转移到受体菌，使受体菌获得新的遗传性状称为（B）

A转化

B转导

C接合

D溶原性转换

E原生质体融合

157.由螺旋体所致的人畜共患的疾病是（C）

A梅毒

B樊尚咽峡炎

C钩端螺旋体病

D雅司病

E回归热

158.目前尚不能在常规组织细胞中进行培养的（E）

A. HIV

B. CMV

C. HPV

D. HSV

E. EBV

159属于呼肠病毒科的胃肠炎病毒是(E)

A星状病毒

B诺如病毒

C肠道腺病毒

D沙波病毒

E轮状病毒

160.与裸露病毒比较，包膜病毒对下列哪种因素敏感(E)

A干燥

B热

C酸

D氧

E脂溶剂

161. 可以作为mRNA翻译蛋白质的病毒核酸类型是(D)

A. dsDNA

B. dsRNA

C. ss(-) RNA

D. ss(+) RNA

E. ss(+) DNA

162. 以下哪种疾病属有菌免疫(D)

A风湿热

B急性肾小球肾炎

C白喉

D肺结核

E肠热症

163. 下列不产生外毒素的细菌是(B)

A霍乱弧菌

B伤寒沙门菌

C痢疾志贺菌

D白喉棒状杆菌

E肠产毒性大肠埃希菌

164. 与立克次体有共同抗原的细菌(A)

A变形杆菌

B大肠埃希菌

C伤寒沙门菌

D布氏杆菌

E绿脓杆菌

165. 下列关于干扰素的叙述中，不正确的是(C)

A是一组具有高活性的多功能糖蛋白

B可由病毒及其他干扰素诱生剂诱生

C产生后可直接杀伤病毒

D产生后对邻近的细胞可发生作用

E起作用发生早于抗体

166. EB病毒的原发感染中，约半数表现的疾病是(A)

A传染性单核细胞增多症

B恶性淋巴瘤

C鼻咽癌

D唇疱疹

E生殖器疱疹

167.无须接受HBIg被动免疫的人群是(E)

A HBsAg阳性母亲所生的新生儿

B输入了HBsAg阳性血液者

C接受了HBsAg阳性器官的移植者

D体表破损处沾染了HBsAg阳性血清者

E无症状HBsAg携带者

168.HIV疫苗研究，目前遇到的最大问题是(D)

A病毒型别多

B无可用的动物模型

C HIV的敏感细胞特殊

D病毒突变引起抗原性改变

E病毒不易培养

169.细菌革兰氏染色性的不同是由于细菌的(B)

A细胞核结构的不同

B细胞壁结构的不同

C细胞膜结构的不同

D中介体的有无

E胞质颗粒的有无或不同

170.某患者，肌肉酸痛，高热，剧烈头痛，入院。体格检查、外斐反应结果诊断为立克次体感染。试问预防立克次体病最重要的是(C)

A注射疫苗

B服用抗生素

C控制和消灭传播媒介和储存宿主

D灭蚊、灭蝇，防止蚊蝇叮咬

E避免与病人接触

171.患者一个月前感到疲劳、食欲减少、体重减轻、发热、咳嗽、痰带血丝。欲取痰标本涂片染色镜检，对该菌应采用的染色方法应该首选(B)

A革兰氏染色

B抗酸染色

C棉兰染色

D复红染色

E墨汁染色

172.患儿，男，10岁。右足底被铁锈钉刺伤10天。突然出现张嘴困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰患儿可诱发上述症状。患儿神志清楚，不发热。患儿所患疾病的致病菌属于(E)

A革兰染色阴性大肠杆菌

B革兰染色阴性变形杆菌

C革兰染色阴性厌氧拟杆菌

D革兰染色阳性无芽孢厌氧菌

E革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌

173.患者，女，38岁，寒战高热，右侧胸痛3天。查体：T39.4℃，意识模糊，右下肺呼吸音减弱。血常规 $14.3 \times 10^9/L$ ，胸片示右下肺大片浸润阴影。该患者最可能诊断是(B)

A克雷白杆菌肺炎

B肺炎链球菌肺炎

C肺炎支原体肺炎

D干酪性肺炎

E病毒性肺炎

175.一位24岁男青年近日出现恶心、呕吐和腹泻症状，且吐泻次数逐日多，每日达10~20次。大便呈米泔水样，有一定程度的脱水。血压降低(收缩压为9.31~12kPa)(90~70mmHg)，脉搏细速，血浆比重为1.031~1.040，24小时尿量在500ml以下。经问诊，该青年一周前从洪水疫区归来，曾饮用过生水。请问该男青年最可能感染哪种病原体(B)

A产气荚膜梭菌

B霍乱弧菌

C金黄色葡萄球菌

D伤寒沙门菌

E变形杆菌

176.患儿5岁，近来活动减少，乏力、食欲减退、盗汗。胸透见右肺上叶下部片状阴影，右肺门淋巴结肿大，应考虑诊断为(B)

A小叶性肺炎

B原发性肺结核病

C支原体肺炎

D病毒性肺炎

E干酪样肺炎

177某患者剧烈咳嗽入院，怀疑病原菌感染，经鲍-金培养基培养后形成细小、光滑、表面隆起、灰白色、不透明的珍珠样菌落，最可能是哪种病原体感染(D)

A破伤风梭菌

B白喉棒状杆菌

C百日咳鲍特菌

D结核分枝杆菌

E流感嗜血杆菌

178.患者，女，38岁。因发热、黄疸、腹胀、乏力入院，诊断为急性甲型肝炎”。引起该病的病原体的主要传播途径是(B)

A血液传播

B消化道传播

C呼吸道传播

D密切接触传播

E性接触传播

179.患者，男，26岁，军官，参加抗洪抢险，天气酷暑炎热，口渴难忍，喝了老百姓送来的矿泉水，2小时后剧烈腹部绞痛，水样便腹泻伴呕吐4次，继之出现米泔水样便。查体:疲倦面容，皮肤、唇舌干燥，眼窝深陷。血压53/37mmHg。取呕吐物和米泔水样便悬滴法镜检，见鱼群样细菌穿梭样运动。病原体可能为(D)

A螺旋体

B病毒

C真菌

D细菌

E立克次体

180. 高校男性大学生，与男性伴侣有不洁性生活史6个月有余。为排除HIV感染，首选的病原学检测是(C)

A. HIV分离培养

B. Western blot检测HIV抗体

C. ELISA检测HIV抗体

D. ELISA检测HIV p24抗原

E. QRT-PCR检测HIV核酸

181 某女青年因咳嗽发热就诊，胸片发现右肺有片状阴影，结核菌素试验红肿直径大于2.0cm，该患者可能是(C)

A机体对结核无免疫能力

B结核病恢复期

C结核病活动期

D注射过卡介苗

E感染过结核

182 患者，男，15岁，学生。3天前突然高热达39℃，伴发冷和寒战，同时出现剧烈头痛，频繁呕吐，呈喷射性，吐出食物和胆汁，无上腹部不适，进食少，二便正常。查体见皮肤散在少量出血点和脑膜刺激征。既往体健，无胃病和结核病史，无药物过敏史，所在学校有类似患者发生。取淤斑涂片镜检可见G双球菌。临床诊断为流行性脑脊髓膜炎。建议首选的治疗药物是(A)

A青霉素G

B磺胺药物

C红霉素

D核苷类似物

E阿德福韦

183.患儿，男，3个月。口服脊髓灰质炎减毒活疫苗11天后，开始出现发热伴轻度咳嗽，无寒战、抽搐。退热后发生下运动神经元不对称性麻痹，脑脊液示蛋白细胞分离，肌电图示神经源性受损，脊髓、头部MRI未见异常。该患儿最可能的诊断是(D)

A海绵状脑病

B流行性乙型脑炎

C肉毒毒素中毒

D疫苗相关麻痹型脊髓灰质炎

E无菌性脑膜炎

184.患者，28岁，因足底外伤，继而发热、惊厥、牙关紧闭呈苦笑面容入院，诊断为破伤风。引起上述症状的破伤风梭菌具有诊断意义的特殊结构是(A)

A芽孢

B菌毛

C鞭毛

D荚膜

E性菌毛

185.患者，女，22岁。入院前2周持续性发热，体温高达39~40℃，发热期间伴食欲缺乏。体检肝、脾略大，腹部见玫瑰疹。血白细胞 $3.5 \times 10^9/L$ 。肝功能正常，血培养阴性，肥达试验结果：TO 1:320，TH1:320，PA1:40，PB1:40。该患者最可能的诊断是(E)

A病毒性肠胃炎

B上呼吸道感染

C细菌性痢疾

D淋巴结炎

E伤寒

186.患者，男，35岁，一周前从东南亚入境，3天前因突然剧烈呕吐、腹泻而入院。腹泻物呈米泔样，便检发现穿梭状运动的细菌。请问致病菌可能是(E)

A肠侵袭性大肠埃希菌

- B伤寒沙门菌
- C变形杆菌
- D猪霍乱沙门菌
- E霍乱弧菌

187.自然灾害过后，当地农村断水断电，生活陷入困境。居民在饮用河水后，许多人出现恶心、呕吐和腹泻症状，排泄物呈“米泔水”样。经当地医疗机构检测后发现，该疾病是由一种可激活腺苷酸环化酶系统、导致cAMP水平增加的毒素引起的。可产生这种毒素的细菌是(E)

- A布鲁氏菌
- B伤寒沙门菌
- C志贺菌
- D大肠埃希菌
- E霍乱弧菌

188.患儿，女，6岁。突起高热、头痛、呕吐伴有意识障碍，经血清学检查及脑脊液RT-PCR检查，诊断为“乙型脑炎”。引起该病的病原体的主要传播途径是(C)

- A消化道传播
- B输血传播
- C虫媒传播
- D呼吸道传播
- E直接接触传播

189.患儿，男，6岁，未接种过DPT疫苗，春季末因咳嗽于呼吸科就诊。2周前，患儿出现咳嗽和鼻塞，症状持续，无发热和寒战。3天前，患儿出现夜间咳醒，咳嗽剧烈，咳嗽后出现呕吐和呼吸困难，扁桃体无肿大，无脓性分泌物。次日，患儿咳嗽依然存在，再次因剧烈咳嗽而咳醒，咳嗽持续约10分钟，吸气出现吼声。该患儿最可能感染何种病原体(A)

- A百日咳鲍特菌
- B肺炎支原体

C白喉棒状杆菌

D肺炎链球菌

E结核分枝杆菌

190.20岁青年摘除扁桃体后，发热，出现心力衰竭。采血培养细菌，血平板有草绿色溶血环小菌落形成。涂片染色为G⁺链状排列球菌，诊断为甲型溶血性链球菌心内膜炎。下列还有哪种菌能形成草绿色溶血环菌落(E)

A金黄色葡萄球菌

B乙型溶血链球菌

C表皮葡萄球菌

D丙型链球菌肺

E炎链球菌

191.患者，女，24岁，药物流产10日后再次就诊，诉近几日白带增多，带血丝，有异味。妇检：子宫附件正常，扩阴器暴露阴道，见后穹隆部有豆腐渣样块状分泌物，宫颈口有少量血性黏液。分泌物涂片镜检发现如图所示病原体该病原体最可能为(E)

A单细胞真菌

B多细胞真菌

C丝状真菌

D支原体

E 沙眼衣原体

192某肝炎患者，血清学检查结果为：抗HAVIgM (-)，抗HBsAb (+)，抗HCV-IgG(+)，抗HDV-IgM(-)，抗HEV-IgM (-)。最可能感染的病原体是(C)

A甲型肝炎病毒

B乙型肝炎病毒

C丙型肝炎病毒

D J 型肝炎病毒

E戊型肝炎病毒

193.某患者，突然出现高热，乏力，伴有腓肠肌疼痛、眼结膜出血以及淋巴结肿大。印象诊断是钩体

病。该病原体的主要传染源和储存宿主是(E)

A猪和犬

B羊和牛

C鼠和犬

D牛和马

E鼠和猪

194.患儿，男，1个月，因多发皮疹入院。皮疹呈圆形，外周有丘疹，带有鳞屑，掌拓部有大疱。患儿母亲吸毒，母血RPR阳性。该患儿最有可能的诊断是

(A)

A梅毒

B HIV垂直感染

C风疹病毒感染

D淋病

E疱疹病毒

195.2岁男孩，突然发热、呕吐及腹泻1天，排出大量水样便，其所在幼儿园也有数名幼儿出现类似症状，但教师中无类似病例。初步判断最可能的感染病原体是(A)

AA组轮状病毒

B肠侵袭性大肠埃希菌

C痢疾志贺菌

D柯萨奇病毒

E诺如病毒

196.患者，女，25岁，已婚。最近发现阴道分泌物增多，呈淡黄色，污秽裤裆。白带镜检发现白细胞较多，淋球菌培养阴性。沙眼衣原体PCR检测阴性。取尿沉渣做支原体培养，能分解精氨酸，但不能分解尿素，在固体培养基上能长出“荷包蛋”样菌落。请问该患者最可能感染了以下哪种微生物(C)

A解脲脲原体

B生殖支原体

C人型支原体

D肺炎嗜衣原体

E肺炎支原体

197.一位65岁退休的女士，去墨西哥度假并食用当地食物。36小时后，她出现了大量的水样腹泻伴腹痛。她被诊断为大肠埃希菌相关性腹泻。下列哪种大肠埃希菌产生耐热和不耐热肠毒素(B)

A EIEC

B ETEC

C EHEC

D EPEC

E EAEC

198.某大学同宿舍4名同学外出在一家路边小餐馆聚餐后，晚自习时，3名同学出现剧烈呕吐、腹泻，同时伴有中上腹部疼痛。急诊入院，初步诊断为金黄色葡萄球菌引起的“食物中毒”。此菌能够合成的代谢产物是(D)

A维生素

B抗生素

C内毒素

D外毒素

E水溶性色素

199.患者，男，27岁，教师。3年前戒毒，近1年来双下肢麻木、乏力，进行性加重，近1个月不能行走，便秘，排尿不畅。当地颅脑及胸腰椎CT(-)。检查：双下肢肌力4°，胸10以下痛觉减退，关节位置及音叉觉正常，下肢腱反射亢进，Babinski(+)。腰穿CSF压力160mmH₂O,细胞35x10⁶/L,蛋白1275mg/L,按脊髓炎治疗无效。查血RPR 1:32,TPHA 1:2560;腰穿CSF细胞25x10⁶/L,蛋白1344mg/L,RPR 1:2,TPHA 1:1280。该患者最有可能是什么疾病(C)

A化脓性脊髓炎

B脊髓钩端螺旋体病

C脊髓血管梅毒

D病毒性脊髓炎

E结核性脊髓炎

200.某校多名学生在食堂进餐后数小时出现恶心、呕吐症状。取剩余食物作细菌培养，革兰染色并在显微镜下观察到革兰阳性的球菌，培养物可分解甘露醇，检测血浆凝固酶和耐热核酸酶试验阳性。该致病菌还有什么其他特点(A)

A SPA是重要的抗原和致病物质

B不耐低温和干燥

C属于条件致病菌

D可形成双层溶血环

E有鞭毛，有芽孢

201.患者，男，35岁。发热5天，最高体温40℃，急性重病容，酒醉貌，少尿，初步诊断为流行性出血热。以下有助于诊断的实验室检查不包括(A)

A白细胞计数增高

B血小板减少

C血液浓缩

D蛋白尿

E小三阳

202.患者，女，65岁。每日口服泼尼松15~30mg治疗膝关节肿痛，5个月后于颈部及腹股沟见1cmx2cm左右红斑各一块，其上散在丘疹；1年后皮损增多并融合，红斑上覆有鳞屑，取鳞屑及结痂经棉蓝染色可见大量有隔菌丝，棍棒状大分子孢子及散在小分生孢子，沙保培养基上生长出产生红色色素的丝状菌落。该患者最可能感染的真菌是(A)

A石膏样小孢子菌

B絮状表皮癣菌

C红色毛癣菌

D铁锈色小孢子菌

E石膏样毛癣菌

203.患者，女，40岁，体检中发现其宫颈细胞有高度上皮间瘤样病变。有多个性伴侣和衣原体感染，已有5年未做过阴道细胞涂片检查。与该病例最有可能存在关联性的病毒是(C)

A副黏病毒

B黄病毒

C人乳头瘤病毒

D细小DNA病毒

E风疹病毒

204.患者，女，26岁，在剖宫产的术前例行检查中检出HIV抗体阳性。经询问，其丈夫为吸毒人员。对于该病例说法错误的是(C)

A该患者的丈夫极有可能也是HIV感染者

B患者的胎儿极有可能感染HIV

C该患者可以正常 母乳喂养婴儿

D该患者的手术器械应严格的消毒灭菌

E该患者的胎盘等组织块应彻底销毁

205.患者，男，24岁，有不洁性接触史，因近2日尿急、尿频、排尿刺痛而来院就诊。查体见尿道口有白色脓性分泌物。分泌物涂片染色，镜下见到G-成双排列的球菌。该患感染可能是由哪种细菌引起(B)

A肺炎链球菌

B淋病奈瑟菌

C葡萄球菌

D链球菌

E脑膜炎奈瑟菌

206某患者血液标本“二对半”的检测结果为: HBsAg (+), 抗-HBs (-), HBeAg (+), 抗-HBe (-), 抗-HBc (+)。最有可能的诊断是(B)

A乙型肝炎潜伏期

B乙型肝炎急性期

C乙型肝炎恢复期

D HBV病毒 既往感染

E接种过乙肝疫苗

207.某地区发生数百人食物中毒的公共卫生事件，从患者的呕吐物中分离出革兰阳性、凝固酶阳性的球菌，可疑的病原菌最可能是(D)

A希氏沙门菌

B大肠埃希菌

C C群链球菌

D金黄色葡萄球菌

E副溶血性弧菌

208.患者，男，35岁。间歇性发热12天，高热和低热交替出现，高热时伴有头痛、乏力，最高体温

39.5℃，无咳嗽。患者于两周前到牧区旅游，曾饮用未消毒的鲜牛奶，无蚊虫叮咬史。X光检查肺部未见异常。该病例的可能诊断是(C)

A钩端螺旋体病

B斑疹伤寒

C布鲁菌病

D肺结核

E恙虫病

209.一年轻女性，近3天出现排尿困难和排尿次数增加。无发热、无皮疹。尿检发现每高倍镜下10~15个白细胞和大量细菌，细菌经染色为革兰阴性杆菌。可能为哪种细菌感染(A)

A大肠埃希菌

B志贺菌

C伤寒沙门菌

D解脲脲原体

E淋病奈瑟菌

210.患者，男，23岁。乏力，食欲缺乏，尿黄4天。

双侧颈部淋巴结肿大，肝略大，脾肋下6cm。骨髓穿刺提示异型淋巴细胞>50%，VCA-IgG(+)。最可能的诊断是(E)

A淋巴组织增生性疾病

B急性感染性淋巴细胞增多症

C急性淋巴细胞性白血病

D病毒性肝炎

E传染性单核细胞增多症

211.患者，男，28岁，因持续高热入院2周，诊断为急性粒细胞性白血病，化疗1周后，患者口腔黏膜上出现白色膜状物，该患者最可能感染的病原体是

(C)

A奋森螺旋体

B白喉棒状杆菌

C白假丝酵母菌

D厌氧菌

E变异链球菌

212.患儿，女，5岁，因高热、意识模糊而入院。查体发现该患儿面色苍白，昏迷，时有惊厥，呼吸微弱。粪便:白细胞4个/HP。血常规:白细胞数

$16 \times 10^9/L$ 。脑脊液正常。粪便取材培养，革兰染色为阴性杆菌，动力试验阴性。诊断患儿感染 (E)

A鼠伤寒沙门菌

B肠产毒型大肠埃细菌

C肠致病型大肠埃细菌

D轮状病毒

E痢疾志贺菌

213.患儿，女，4岁，因发烧、游走性关节炎和心肌炎而入院。其父母陈述大约两周前，该患儿出现严重的喉痛，伴发烧和胃痛，但病情几天后自然地消退。入院前两天，患儿开始出现面部、颈部和四肢奇怪的运动，这些在检查中发现是无意识、无目的、不适当的运动。实验室检查显示白细胞增多，蛋白水平升高，血沉速度升高，常规血培养结果阴性，但患儿血清中发现高滴度抗链球菌溶血素O抗体。该患儿最可能患的是 (A)

A急性风湿热

B链球菌性的心内膜炎

C破伤风

D白喉

E小儿麻痹症

214.患儿，女，10岁。咽痛、咳嗽、发热后15天出现全身水肿，尿量减少，血压157/98mmHg。血常规:血红蛋白125g/L,白细胞 $5.7 \times 10^9/L$ 。尿常规:尿蛋白(+), 红细胞(+++),白细胞0个/HP，管型0个/HP。此病症由何种病原体感染所致 (B)

A金黄色葡萄球菌

B A群链球菌

C14型肺炎链球菌

D脑膜炎奈瑟菌

E淋球菌

215.患者，男，腿部皮肤被叮咬，突发高热，局部出现溃疡。入院体格检查、实验室检查诊断为斑疹伤寒立克次体感染。斑疹伤寒立克次体的传染源与储存宿主是 (C)

A人虱

B鼠蚤

C鼠

D蜱

E恙螨

216.患者，女，22岁。受凉后出现寒战、发热，咳嗽，咳少许黏痰3天，自服感冒药后热退，查体： $T39.5^{\circ}C$ ，急性病容，右肺呼吸音减弱，语音震颤增强，下肺大片状模糊音影。该患者抗感染治疗不宜使用的是 (A)

A青霉素

B左氧氟沙星

C阿莫西林

D头孢曲松

E阿米卡星

217.患者3天前开始感觉前额痛，入院当天上午高热、寒战，下午起开始出现神志不清、晕厥，随即送入医院。查体：T 41°C，BP70/30mmHg，P 140次/分，R 24次/分，患者间断清醒，躯干有几处淤斑，鼻腔、口腔有出血，颈部柔软，无脑膜刺激征，心脏未闻及杂音，腹部除见左上四分之一象限脾切除手术瘢痕外无异常发现。胸部X光：心、肺无异常。实验室检查：血培养可见革兰染色阳性、柳叶刀状双球菌。血琼脂再次培养可见细小、半透明的、呈 α -溶血环的菌落，该菌可被胆汁溶解，并可被奥普托辛(optochin)抑制。用含有抗83型肺炎链球菌的抗体的全血清做荚膜肿胀试验阳性。最有可能引起该患者败血症的病原菌是 (B)

- A脑膜炎球菌
- B肺炎链球菌
- C流感嗜血杆菌
- D A群链球菌

218.某老年男性患者，肺部感染入院。常规治疗后，疗效不佳。考虑到可能出现了耐药性菌株感染。此时，做抗生素敏感试验时，应选择细菌增殖的 (B)

- A 迟缓期早期
- B对数生长期
- C稳定期后期
- D稳定期中期
- E衰亡期早期

219.患儿，男，10岁，发热出疹3天。红疹始于面部，后向肢体扩散。A族链球菌抗原检测阴性，诊断为传染性红斑。最可能导致该病的病原体是 (E)

- A风疹病毒
- B痘病毒
- C人乳头瘤病毒
- D单纯疱疹病毒
- E细小DNA病毒

220.患者，女，35岁，患肺结核已3年，治疗不规则。2天前受凉后发热，体温38°C，体检无明显异常。胸片示两上肺斑片状阴影，伴不规则透亮区。为判断肺结核是否活动，可采取下列哪种方法（A）

A痰结核杆菌检查

B革兰染色

C Elek平板毒力实验

D糖发酵试验

E胆汁溶解试验

221.患儿，男，1岁，因抽搐入院。上呼吸道感染2天，昨夜发热嗜睡。查体：颈强，体温40°C。WBC $17 \times 10^9/L$ ，腰穿脑脊液细胞数 $4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占88%。诊断为细菌性脑膜炎。细菌培养时发现在预加的金葡菌菌落周围生长旺盛，出现卫星现象，G染色为G杆菌。试问所感染的细菌可能是（D）

A肺炎克雷伯菌

B A群链球菌

C脑膜炎奈瑟菌

D流感嗜血杆菌

E铜绿假单胞菌

222.患者持续发热12天到医院就诊，精神萎靡，反应淡漠，持续高热。体温39.5°C，心率80次/分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm。白细胞 $3.4 \times 10^9/L$ ，肥达反应结果显示01：80、H1：160，HBsAg阴性。为确定诊断，应进行检查的项目是（E）

A乙型肝炎病毒抗体

B甲型肝炎病毒抗体

C取外周血分离培养

D丙型肝炎病毒抗体

E标本取骨髓液，分离培养

223.患者，男，35岁，因腹痛、脓血便2个月入院。患者2个多月前出差回来后突然发热达38°C，无寒战，同时有腹痛、腹泻，大便每日10余次，为少量脓

血便，伴里急后重;曾到附近医院，化验大便有多数白细胞，口服几次庆大霉素和黄连素好转。以后虽间断服用黄连素，但仍有黏液性便，左下腹不适，自觉日渐乏力，遂来诊。化验:大便常规为黏液脓性便，白细胞20~30个/HP，偶见成堆脓球，尿常规(-)。初步诊断:慢性菌痢。引起该病的病原菌能够合成的代谢产物是 (E)

A硫化氢

B凝固酶

C溶血素

D几丁质

E热原质

224.患儿，男，9岁。急性发热，体温持续39℃以

上，咳嗽无痰，全身酸痛，稍气促，无发绀，双肺呼吸音粗，可闻及少量细湿啰音。血常规检查显示白细胞总数降低。血生化检查肌酸激酶、乳酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶均升高。该患儿近期有病死禽密切接触史，捡到1只麻雀并饲养但是几天后死亡。该患儿最可能的诊断是 (C)

A普通感冒

B大叶性肺炎

C人感染高致病性禽流感

D肺结核

E严重急性呼吸综合征(SARS)

225.一新生儿室暴发脓毒血症，脓汁标本经涂片、革兰染色镜检发现大量葡萄球菌。为确定该菌是否有致病力，应检查 (A)

A血浆凝固酶

B触酶

C DNA聚合酶

D尿素酶

E磷酸酯酶

226某幼儿园3岁小朋友，以发热、咽痛、呼吸困难入

院。查体:体温38.5°C,口腔黏膜上散在白色斑点,咽部及扁桃体有一层灰白色膜。试问感染细菌经奈瑟染色后,观察到哪一结构有助于白喉的进一步诊断

(B)

A质粒

B异染颗粒

C荚膜

D芽孢

E鞭毛

227.7岁儿童,近日因皮肤不适到医院皮肤科门诊就诊。患儿家长诉患病初期皮肤表面出现红斑,并且在1~2天时皮肤表面出现褶皱,随后出现清亮的水泡。触碰患儿皮肤表面时,患儿哭闹不止,并有皮屑脱落。取皮肤样本进行微生物学检测,培养物能发酵甘露醇,在血琼脂平板上形成的菌落周围有完全透明的溶血环,此病原体最有可能是 (C)

A鼠疫耶尔森菌

B霍乱弧菌

C金黄色葡萄球菌

D解脲脲原体

E梅毒螺旋体

228.某5个月婴儿,便秘、头颈部肌肉软弱、吮乳无力、吞咽困难入院。查:眼睑下垂,全身肌张力减退。入院后多项检查提示“婴儿肉毒病”。引起此病的病原菌 (B)

A在有氧和无氧环境中都能生长

B菌体内缺少过氧化物酶

C属于自养菌范畴

D通过光合作用获得能量

E最适生长温度为10~20°C

(229-230共用题干)共用备选答案

A. CJD

B. TSE

- C. DHF
- D. SSPE
- E. BSE

229.属于人类朊粒病的是 (A)

230.属于人和动物的朊粒病是 (E)

(231- 234共用题干)共用备选答案

A TSST-1

B肠毒素

C内毒素

D凝固酶

E表皮剥脱毒素

231.烫伤样皮肤综合征相关的致病物质是 (E)

232.中毒性休克综合征相关的致病物质是 (C)

233.食物中毒相关的致病物质是 (B)

234.病灶局限相关的致病物质是 (D)

(235-236共用题干)共用备选答案

A 乙肝疫苗

B 流感疫苗

C 麻疹疫苗

D 白、百、破疫苗

E 脊髓灰质炎疫苗

235.新生儿期接种的疫苗应是 (A)

236.生后2个月时应接种的疫苗是 (E)

(237-239共用题干)共用备选答案

A 莫氏立克次体

B 恙虫病立克次体

C 斑疹伤寒立克次体

D 森林脑炎病毒

E 贝纳柯克斯体

237. Q 热的病原体是 (E)

238.鼠型斑疹伤寒病原体是 (A)

239.地方性斑疹伤寒病原体是 (C)

(240-24共用题干)共用备选答案

A 脑膜炎奈瑟菌

B 肠炎沙门氏菌

C 副溶血性弧菌

D 结核分枝杆菌

E 金黄色葡萄球菌

240.不能采用真空干燥法保存的菌种是 (A)

241.能够耐受干燥环境达数月的细菌是 (D)

(242-246共用题干)共用备选答案

A 急性病毒感染

B 持续性病毒感染

C 慢性病毒感染

D 潜伏病毒感染

E 慢发病毒感染

242.艾滋病 (B)

243.单纯疱疹 (D)

244.甲型肝炎 (A)

245.慢性活动性乙型肝炎 (C)

246.乙型肝炎无症状携带者 (D)

(247-249共用题干)共用备选答案

A 咽漱液

B 粪便

C 尿

D 脑组织

E 血液

247.分离狂犬病病毒应取 (D)

248.分离脊髓灰质炎病毒最好取 (B)

249.自病人体内分离流行性出血热病毒最好取 (E)

(250-253共用题干)共用备选答案

A. HHV-1

B. HHV-2

C. HHV-3

D. HHV-4

E. HHV-5

- 250.与宫颈癌有关的病原体是 (B)
251.与水痘-带状疱疹有关的病原体是 (C)
252.与传染性单核细胞增多症有关的病原体是 (D)
253.与输血后单核细胞增多症有关的病原体是 (E)
(254-255共用题干)共用备选答案

A 鼠
B 猪
C 猴
D 牛
E 羊

- 254.汉坦病毒的主要宿主动物是 (A)
255.埃博拉病毒的主要传染源是 (C)
(256-257共用题干)共用备选答案

A 内毒素
B 外毒素
C 侵袭力
D 侵袭性酶
E 菌体脂质

- 256.破伤风细菌的主要致病物质是 (B)
257.结核分枝杆菌的主要致病物质是 (E)
(258-261共用题干)共用备选答案

A 咽漱液
B 脑组织
C 粪便
D 血液
E 脑脊液

- 258.分离流感病毒应采集 (A)
259.分离轮状病毒应采集 (C)
260.分离狂犬病毒应采集 (B)
261.分离汉坦病毒应采集 (D)
(262-265共用题干)共用备选答案

A 柯萨奇病毒
B 诺如病毒

C 肠道腺病毒

D 轮状病毒

E 星状病毒

262.引起婴幼儿腹泻最常见的病原体是 (D)

263.引起成人急性胃肠炎爆发流行的主要病原体是

(B)

264.感染后不引起急性胃肠炎的病毒是 (A)

265.感染除引起腹泻外,还可伴有咽炎等呼吸道症状的病毒是 (A)

(266-269共用题干)共用备选答案

A 外毒素

B 内毒素

C 抗毒素

D 类毒素

E 肠毒素

266.可用于治疗或紧急预防的是 (C)

267.能中和外毒素的是 (C)

268.主要用于预防的是 (D)

269.性质属于免疫球蛋白的是 (D)

(270-272共用题干)共用备选答案

A 啮齿动物

B 家畜

C 幼猫

D 兔

E 患者

270.莫氏立克次体的储存宿主是 (A)

271.普氏立克次体的储存宿主是 (E)

272.汉塞巴通体的储存宿主是 (C)

(273-275共用题干)共用备选答案

A 泛存在于土壤中,以芽孢侵入伤口

B 致病广泛存在于土壤中,引起抵抗力低下者的外源性感染

C 为人体正常菌群,可以引起内源性感染

D 机体抵抗力降低时,通过伤口感染

E 通过接触引起医源性感染的主要病原体

273衣氏放线菌的特点是 (C)

274.破伤风细菌的特点是 (D)

275.诺卡菌的特点是 (B)

(276-278共用题干)共用备选答案

A 人工主动免疫

B 人工被动免疫

C 自然主动免疫

D 自然被动免疫

E 被动-主动免疫

276胎儿通过胎盘接受来自母体的抗体称为 (D)

277隐性感染或患传染病或获得免疫力称为 (C)

278接种疫苗和类毒素后获得免疫力称为 (A)

(279-283共用题刊共用备进答案

A α -干扰素

B β -干扰素

C γ -干扰素

D I型干扰素

E II型干扰素

279.(A)由人白细胞产生

280.(B)由人成纤维细胞产生

281.(E)由 T 细胞产生

282.(D)抗病毒作用较强

283.(E)免疫调节作用较强

(284-285共用题干) 共用备进落

A 抗原

B 抗体

C 毒素

D 内毒素

E 外毒素

284,人工主动免疫输入的制剂性质是 (A)

285.人工被动免疫输入的制剂性质多是 (B)

(286-288共用题干)共用备进答案

- A 登革病毒
- B 汉坦病毒
- C 发热伴血小板减少综合征病毒
- D 流行性乙型脑炎病毒
- E 新疆出血热病毒

286以猪作为主要传染源的病毒是 (A)

287.以鼠作为主要传染源的病毒是 (B)

288以三带喙库蚊为最主要传播媒介的是 (D)

(289-291共用题干)共用备用答案

- A 梅毒螺旋体
- B 钩端螺旋体
- C 伯氏疏螺旋体
- D 雅司螺旋体
- E 回归热疏螺旋体

289.USR试验和RPR 试验可检测的螺旋体 (A)

290引起莱姆病的主要病原体是 (C)

291不能在无生命培养基中生长的螺旋体是 (A)

(292-293共用题干)共用备用答案

- A. α -干扰素
- B. β -干扰素
- C. γ -干扰素
- D. IL-1
- E. IL-2

292病毒诱导成纤维细胞产生的主要物质是 (B)

293病毒诱导成T细胞产生的主要物质是 (C)

(294-296共用题干)共用备用答案

- A 细胞膜
- B 磷壁酸
- C 外膜
- D 中介体
- E 核糖体

294革兰阳性菌细胞壁特殊的组分是 (B)

295革兰阴性菌细胞壁特殊的组分是 (C)

296其功能类似真核细胞线粒体的细菌结构是 (D)

(297-298共用题干)共用备用答案

A 先天性畸形

B 围生期感染

C 潜伏感染

D 继发感染

E 机会感染

297孕期3个月内感染 HCMV 可引起胎儿 (A)

298成人原发感染 HCMV 后多数可长期带毒表现为 (C)

(299-300共用题干)共用备用答案

A 钩端螺旋体

B 立克次体

C 肺炎嗜衣原体

D 鹦鹉热嗜衣原体

E 沙眼衣原体

299可以通过性接触传播的病原体是 (E)

399 可以通过节肢动物传播的病原体是 (B)