

[哥哥]病理 4A

题型: A1

- 1.慢性阻塞性肺病最常见于
 - A.支气管哮喘
 - B.支气管扩张
 - C.肺脓肿
 - D.肺结核球
 - E.慢性支气管炎
- 2.肾综合征出血热最常见的死亡原因是
 - A.急性肾衰竭
 - B.急性心力衰竭
 - C.出血性休克
 - D.呼吸衰竭
 - E.中毒性休克
- 3.流行型脑脊髓膜炎的传染途径主要是通过
 - A.呼吸道
 - B.皮肤
 - C.泌尿道
 - D.蚊子叮咬后经血
 - E.消化道
- 4.透明细胞肉瘤免疫组化示
 - A.CK (+)
 - B.HMB45 (+)
 - C.EMA (+)
 - D.Desmin (+)
 - E.CD117 (+)
- 5.伤寒的病变特点除外
 - A.脾肿大
 - B.病灶中较多中性粒细胞浸润
 - C.伤寒肉芽肿形成
 - D.回肠下段集合和孤立淋巴小结肿大
 - E.皮肤玫瑰疹
- 6.下列属于良性肿瘤的是
 - A.肾母细胞瘤
 - B.精原细胞瘤
 - C.髓母细胞瘤
 - D.淋巴瘤
 - E.葡萄胎
- 7.色素性绒毛结节性滑膜炎组织学可见
 - A.滑膜细胞变性、坏死、脱落
 - B.滑膜细胞增生并吞噬大量含铁血黄素
 - C.滑膜细胞增生并吞噬大量脂褐素
 - D.滑膜细胞增生并吞噬大量黑色素
 - E.间质细胞无改变
- 8.脑动脉粥样硬化时下列哪项不易发生
 - A.引起脑萎缩
 - B.动脉瘤形成

- C.引起延髓性麻痹
 - D.继发脑血栓形成
 - E.大脑中动脉病变最重
- 9.脂肪变性的肉眼观察其主要的病变特点是
- A.体积减小，有油腻感，重量减轻，黄色质软
 - B.体积增大，有油腻感，重量正常，白色质软
 - C.体积增大，有油腻感，重量增加，黄色质软
 - D.体积增大，有油腻感，重量增加，红色质软
 - E.体积增大，有油腻感，重量减轻，黄色质软
- 10.AIDS 患者继发的 Kaposi 肉瘤来源于
- A.滑膜细胞
 - B.血管内皮细胞
 - C.平滑肌细胞
 - D.淋巴细胞
 - E.血管周细胞
- 11.决定创伤愈合后局部组织抗牵拉的因素是
- A.创伤愈合的时间
 - B.创面大小和深度
 - C.是否伴有感染
 - D.愈合过程中肉芽组织的量
 - E.愈合部位胶原的含量
- 12.持续高热易发生变性坏死的脏器主要是
- A.心、肝、胃
 - B.心、脾、胃
 - C.心、肝、肾
 - D.肝、脾、心
 - E.胃、肝、脾
- 13.肝癌一般不转移至
- A.淋巴结
 - B.脾
 - C.腹膜
 - D.肺
 - E.脑
- 14.下列哪项决定肿瘤的生长速度
- A.肿瘤的生长方式
 - B.肿瘤的异型性
 - C.机体的免疫力
 - D.肿瘤的起源组织
 - E.肿瘤的发生部位
- 15.以下为乙脑基本病理变化，但除外
- A.脑脊髓膜化脓性炎
 - B.脑实质细胞变性坏死
 - C.脑实质内血管袖套样改变
 - D.脑内筛状软化灶形成
 - E.脑质小结形成
- 16.下列哪项不是慢性阻塞性肺病的共同特征
- A.呼气阻力增加

- B.肺组织实变
 - C.肺实质受损害
 - D.小气道受损害
 - E.肺功能不全
- 17.如图，卵巢黏液性囊腺瘤的特点是
- A.细胞有明显异型性
 - B.无黏液分泌
 - C.囊壁内衬单层立方上皮
 - D.囊壁内衬单层高柱状上皮
 - E.乳头分支多而复杂，细胞层次增多，超过3层以上
- 18.关于慢性纤维空洞型肺结核的叙述，下列哪项是正确的
- A.结核空洞多位于肺下叶
 - B.病变局限，组织破坏不明显
 - C.无肺功能受损害
 - D.少见的继发性肺结核的一个类型
 - E.多由浸润型肺结核形成急性空洞后经久不愈发展而来
- 19.二尖瓣狭窄不会引起
- A.右心房增大
 - B.左心房增大
 - C.右心室增大
 - D.左心室增大
 - E.肺动脉高压
- 20.食管癌中，最少见的肉眼类型是
- A.髓质型
 - B.蕈伞型
 - C.胶样型
 - D.溃疡型
 - E.缩窄型
- 21.如图，二尖瓣狭窄时，扩大的左心房内球形物质是
- A.白色血栓
 - B.红色血栓
 - C.混合血栓
 - D.透明血栓
 - E.血凝块
- 22.下列哪项不是恶性肿瘤
- A.精原细胞瘤
 - B.囊性畸胎瘤
 - C.卵黄囊瘤
 - D.肾胚胎瘤
 - E.无性细胞瘤
- 23.绒毛心是指
- A.心外膜的纤维素性炎
 - B.心外膜的纤维素性化脓性炎
 - C.心外膜的化脓性炎
 - D.心外膜的浆液性炎
 - E.心外膜的纤维性增生的结果
- 24.下列关于乙型脑炎病理改变的描述错误的是

- A.小血管周围有“血管套”形成
 - B.神经细胞变性坏死
 - C.筛状软化灶形成
 - D.胶质结节形成
 - E.蛛网膜下腔有较多的中性粒细胞
- 25.常发生在肝硬化基础上的肝肿瘤是
- A.肝炎后肝癌
 - B.弥漫型肝癌
 - C.巨块型肝癌
 - D.多结节型肝癌
 - E.肝内转移癌
- 26.肿瘤的生长速度主要取决于
- A.肿瘤是良性还是恶性
 - B.肿瘤细胞的生长分数和肿瘤细胞的生成与丢失之比
 - C.肿瘤所处部位是否有足够的生长空间
 - D.肿瘤间质血管是否丰富
 - E.机体的免疫状态
- 27.流行性乙型脑炎时，病变的主要部位是
- A.大脑皮质
 - B.大脑灰质
 - C.小脑
 - D.大脑皮质及基底节、丘脑
 - E.软脑膜
- 28.原发性良性高血压时，左心室向心性肥大属于
- A.肥大
 - B.增生
 - C.化生
 - D.再生
 - E.变性
- 29.晚期胃癌常转移到左锁骨上淋巴结，后者又称
- A.Aschoff 淋巴结
 - B.Ewing 淋巴结
 - C.Krukenberg 淋巴结
 - D.Schwann 淋巴结
 - E.Virchow 淋巴结
- 30.肝硬化引起门脉高压的原因一般不包括
- A.假小叶压迫小叶下静脉
 - B.纤维组织压迫中央静脉
 - C.肝窦狭窄、闭合
 - D.肝动脉和门静脉之间形成吻合支
 - E.肝动脉与肝静脉之间形成吻合支
- 31.流行性脑脊髓膜炎是
- A.化脓性炎
 - B.变质性炎
 - C.出血性炎
 - D.纤维素性炎
 - E.肉芽肿性炎

32. 化生不可能发生于
- A. 支气管假复层纤毛柱状上皮
 - B. 宫颈柱状上皮
 - C. 肾盂黏膜上皮
 - D. 神经纤维
 - E. 结缔组织
33. 下述哪种肿瘤的发生可与化生有关
- A. 皮肤鳞状细胞癌
 - B. 肾盂移行细胞癌
 - C. 肠黏液腺癌
 - D. 肝胆管上皮癌
 - E. 肠型胃癌
34. 见于甲床，直径 1cm 的紫蓝色结节是
- A. 血管瘤球瘤
 - B. 血管外皮瘤
 - C. 肉芽组织型血管瘤
 - D. 上皮样血管内皮瘤
 - E. 毛细血管瘤
35. 伤寒小结的组成主要是
- A. 伤寒细胞、中性粒细胞
 - B. 多核巨细胞、上皮样细胞
 - C. 上皮样细胞、淋巴细胞
 - D. 巨噬细胞、伤寒细胞
 - E. 淋巴细胞、浆细胞
36. 流行性乙型脑炎的主要病变中不包括
- A. 脑实质有上皮样细胞小灶形成
 - B. 脑组织中胶质结节形成
 - C. 脑小血管周围淋巴细胞“血管套”形成
 - D. 筛网状软化灶
 - E. 神经细胞变性坏死
37. 浆液性炎症中，其渗出的浆液内蛋白质含量浓度为
- A. 1%~3%
 - B. 3%~5%
 - C. 5%~7%
 - D. 7%~9%
 - E. >10%
38. 恶性腱鞘巨细胞瘤的特征不包括
- A. 易浸润周围软组织
 - B. 瘤细胞以异型的组织细胞样滑膜细胞为主
 - C. 转移多见，易复发
 - D. 多位于指和腕关节屈侧
 - E. 极为罕见
39. 软组织透明细胞肉瘤的起源是
- A. 滑膜
 - B. 神经外胚叶
 - C. 纤维组织
 - D. 平滑肌

- E.上皮组织
- 40.下列哪项不是肉芽组织的作用
- A.抗感染保护创面
 - B.填补伤口及其他组织缺损
 - C.机化血栓
 - D.包裹坏死、炎性渗出物及其他异物
 - E.能抗牵拉
- 41.不能促进血小板聚集的是
- A.胶原纤维
 - B.凝血酶
 - C.血栓素 A
 - D.ADP
 - E.前列环素
- 42.伤寒的传染途径是
- A.经口传染
 - B.呼吸传染
 - C.血液传染
 - D.接触传染
 - E.以上途径都可以
- 43.有关血栓形成规律的说法中，不正确的是
- A.静脉血栓多于动脉血栓
 - B.下肢血栓多于上肢血栓
 - C.心腔内多形成附壁血栓
 - D.静脉血栓多为红色血栓
 - E.透明血栓多发生于微循环内
- 44.患者颈部淋巴结肿大，病理检查发现有泡状核细胞癌转移，其来源为
- A.肺部
 - B.鼻咽部
 - C.气管
 - D.喉
 - E.胸膜
- 45.下列哪项病变可发生转移性钙化
- A.结核病时的干酪样坏死
 - B.胰腺炎时的脂肪坏死
 - C.结缔组织的透明变性
 - D.甲状旁腺功能亢进
 - E.血吸虫病时的虫卵结节
- 46.按发病率递减的顺序，食管癌最常见的部位依次是
- A.食管各段分布相等
 - B.食管中段、上段、下段
 - C.食管下段、中段、上段
 - D.食管上段、下段、中段
 - E.食管中段、下段、上段
- 47.可造成感染慢性化的肝炎病毒是
- A.肝炎病毒 C
 - B.肝炎病毒 A、E
 - C.肝炎病毒 A、D

D.肝炎病毒 B、C、D

E.肝炎病毒 C、D、E

48.下列哪种肿瘤无血管及间质

A.脂肪瘤

B.横纹肌肉瘤

C.纤维肉瘤

D.畸胎瘤

E.绒毛膜癌

49.右冠状动脉阻塞引起的梗死区域为

A.右心房、右心室

B.左心室侧壁及右心室

C.室间隔前 2/3、心尖及右心室

D.左心室后壁、室间隔后 1/3 及右心室

E.室间隔后 2/3 及右心房、右心室

50.有关食管癌的组织类型，下列哪项最多见

A.腺癌

B.类癌

C.鳞癌

D.未分化癌

E.腺鳞癌

51.慢性胃溃疡经久难愈的局部因素主要是

A.局部溃疡过大

B.局部溃疡过深

C.溃疡周边组织水肿

D.溃疡底部神经纤维变性、断裂

E.溃疡底部小动脉增生性内膜炎

52.下列有关流行性脑脊髓炎的述说错误的是

A.脑膜刺激征

B.脑膜充血

C.颅内压增高

D.脑脊液浑浊

E.筛状软化灶

53.关于风湿病增生期 Aschoff 小体的描述中，下列错误的是

A.小体中心部为纤维素样坏死灶

B.坏死灶周围可见 Aschoff 巨细胞

C.坏死灶周围可见 Anitschkow 细胞

D.主要成分为 Langhans 细胞

E.小体内还有少量淋巴细胞

54.尸体解剖时血管中常见到的固体质块是

A.透明血栓

B.白色血栓

C.红色血栓

D.混合血栓

E.血凝块

55.下列关于 AIDS 的叙述错误的是

A.AIDS 的潜伏期长

B.AIDS 是由 HIV 感染所引起的

- C.HIV 是一种逆转录病毒
D.AIDS 可通过游泳和公共洗浴感染
E.AIDS 常伴有肿瘤的发生
- 56.关于血管瘤的叙述，下列哪项是错误的
A.无包膜，呈浸润性生长
B.多为先天性
C.随身体发育而长大，可自然消退
D.对放射治疗和化疗敏感
E.多发生于皮肤
- 57.肺气肿的病变部位在
A.肺泡
B.支气管
C.呼吸性细支气管以远的肺组织
D.管径 $<2\text{mm}$ 的小支气管
E.终末细支气管
- 58.形成肉芽肿的心肌炎是
A.白喉心肌炎
B.埃可病毒性心肌炎
C.柯萨奇病毒性心肌炎
D.特发性巨细胞性心肌炎
E.葡萄球菌性心肌炎
- 59.AIDS 患者血液检查减少最明显的是
A.淋巴细胞
B.中性粒细胞
C.巨噬细胞
D.NK 细胞
E.树突细胞
- 60.下列不属于非特异性反应性淋巴滤泡增生特点的是
A.淋巴结大，淋巴滤泡增生，生发中心明显扩大
B.增生的淋巴滤泡内有各种转化的淋巴细胞，核较大，有裂或无裂，核分裂象多见
C.增生的淋巴滤泡有多数巨噬细胞，胞质内含有吞噬的细胞碎屑
D.增生的淋巴结构破坏，淋巴滤泡消失
E.在滤泡之间的淋巴组织内可见浆细胞、组织细胞及少量中性粒细胞和嗜酸性粒细胞浸润，淋巴窦内的组织细胞和内皮细胞增生
- 题型：A2**
- 61.肠镜检见患者直肠距肛门 10cm 处，有一鲜红色突起，约 $2.5\text{cm}\times 2\text{cm}\times 1\text{cm}$ ，切除活检如图所示，正确的诊断是
A.结肠 Crohn 病
B.结肠增生性息肉
C.结肠腺瘤性息肉
D.结肠癌
E.慢性结肠炎
- 62.患者，男，45 岁，超声检查发现左肾肿物 2 个月。考虑为肾脏肿瘤，行左肾切除术，患肾大体如图所示，镜检如图所示，正确诊断为
A.左肾透明细胞癌
B.左肾细胞癌（肉瘤样型）
C.左肾颗粒细胞癌

- D.左肾乳头状腺癌
- E.左肾梭形细胞癌

63.一患者起病急，病情进展迅速，肝体积显著缩小，色黄，质地柔软，镜下肝细胞广泛大片坏死，有多量单个核炎细胞浸润，应诊断为

- A.急性普通型肝炎
- B.慢性轻度肝炎
- C.慢性中度肝炎
- D.慢性重度肝炎
- E.急性重型肝炎

64.患者，男，58岁，右臀部肿块，直径8cm，与深部固定，镜下表现如图，诊断应首先考虑

- A.黏液性脂肪肉瘤
- B.多形性脂肪肉瘤
- C.多形性横纹肌肉瘤
- D.多形性恶性纤维组织细胞瘤
- E.血管肉瘤

65.男性，42岁，长期胸闷、气短、心痛，未及时就医，不幸死亡。尸体解剖发现心包狭窄，心包内有绒毛状物。该名男子长期患有的疾病为

- A.心肌梗死
- B.风湿性心肌炎
- C.风湿性心外膜炎
- D.风湿性心内膜炎
- E.心瓣膜病

66.患者，女，53岁，双肾缩小，表面可见不规则瘢痕，两侧改变不对称，切开，皮髓质界限不清，肾乳头萎缩，肾盏和肾盂因瘢痕收缩而变形，肾盂黏膜粗糙。巨检如图，镜下如图所示，应首先考虑的是

- A.高血压性肾病
- B.慢性肾盂肾炎
- C.急性肾小球肾炎
- D.肾结核
- E.慢性肾小球肾炎

67.患者，男，42岁，剑突下隐痛3个月。胃镜见胃窦部溃疡，直径2cm，溃疡底不平，有出血。镜检如图所示，最佳病理诊断是

- A.腺鳞癌
- B.中分化腺癌
- C.管状腺癌
- D.未分化癌
- E.黏液腺癌

68.如图，背部皮下肿块切除，病理诊断为“表皮样囊肿”，镜下见真皮内异位鳞状上皮角化，形成囊肿，囊肿部分破裂，巨噬细胞等围绕形成结节。此结节病变应称

- A.脓肿
- B.结核结节
- C.异物肉芽肿
- D.机化
- E.钙化

69.患者，女，45岁，乳头溢液涂片检查显示嗜酸性颗粒性物质及细胞碎屑，导管上皮细胞，核染色质粗颗粒状的导管上皮细胞（核异质），核浆比增大、明显核异型的多边形细胞，大泡沫细胞和单核巨噬细胞。最可能的细胞病理学诊断是

- A.乳腺囊性增生

- B.乳腺脂肪肉瘤
- C.黏液腺瘤
- D.浆细胞性乳腺炎
- E.乳腺导管癌

70.如图为发生在子宫的肿瘤，诊断为

- A.子宫平滑肌瘤
- B.子宫平滑肌肉瘤
- C.子宫平滑肌癌
- D.子宫平滑肌增生
- E.子宫平滑肌癌肉瘤

71.图为慢性右心衰竭患者尸检肝脏表现，不包括下列哪项病变

- A.肝细胞脂肪变性
- B.肝细胞萎缩
- C.胆小管增生
- D.肝小叶中央静脉和肝窦扩张充血
- E.肉眼观察切面呈红黄相间的花纹

72.患者，女，36岁。停经50余天，腹痛1天。后穹隆穿刺少量新鲜血，术中见右输卵管壶腹部膨大并有活动性出血。切除右输卵管，显微镜下所见如图。应诊断为

- A.输卵管妊娠
- B.副中肾管囊肿
- C.急性输卵管炎
- D.输卵管腺癌
- E.输卵管结核

73.患者，女，32岁，月经不规则伴痛经多年，B超发现左附件囊性包块，手术切除，大体如图，镜下如图。应诊断为

- A.平滑肌瘤红色变
- B.子宫内膜异位囊肿
- C.卵巢浆液性囊腺瘤
- D.卵巢黏液性囊腺瘤
- E.卵巢单纯性囊肿

74.患者，女，50岁，咳痰10多年。查体：可平卧，桶状胸，两肺闻及少量湿啰音，剑突下收缩期搏动，右房室瓣区可听见收缩期杂音，肝脾不大，下肢无水肿。可诊断为

- A.慢性支气管炎，肺气肿
- B.慢性支气管炎，肺气肿，肺心病代偿期
- C.慢性支气管炎
- D.慢性支气管炎，支气管扩张症
- E.慢性支气管炎，肺心病，右心衰

75.患者，女，31岁，左腕部肿块。如图镜下呈肉芽肿样结构，地图状坏死，诊断是

- A.颗粒细胞瘤
- B.腺泡状软组织肉瘤
- C.上皮样肉瘤
- D.滑膜肉瘤
- E.肉芽肿性毛细血管瘤

76.某患者行二尖瓣置换术，二尖瓣的镜下改变如图所示，可见灰蓝色黏液样基质，发生的变性是

- A.玻璃样变
- B.淀粉样变
- C.色素沉着

D.黏液样变性

E.水变性

77.一位 50 岁慢性酒精中毒引起肝硬化的病人伴有上消化道出血，最可能的原因是

A.食管癌

B.慢性胃溃疡病

C.马-魏综合征

D.慢性十二指肠溃疡

E.食管静脉曲张

78.患者，男，44 岁。间歇性肉眼血尿 2 个月，右腰痛半个月。肾动脉造影：右肾中下级血管丰富，有肿瘤血管染色，考虑为右肾肿瘤。行右肾切除后送病理检验，镜检如图所示。正确的诊断为

A.右肾透明细胞癌

B.右肾错构瘤

C.右肾颗粒细胞癌

D.右肾乳头状腺癌

E.右肾母细胞瘤

79.在胃癌 HE 染色切片中，癌细胞弥漫浸润于黏膜下层及肌层，有大量淡蓝色无结构的物质，其中漂浮小堆癌细胞，部分癌细胞核偏于一侧，胞浆内亦有上述物质。该切片应诊断为

A.印戒细胞癌

B.腺鳞癌

C.乳头状腺癌

D.管状腺癌

E.未分化癌

80.患者钡餐造影胃体积缩小，胃壁增厚、变硬，镜下大量异型腺体出现在肌层，可能是下面哪种疾病

A.胃溃疡

B.溃疡型胃癌

C.慢性浅表性胃炎

D.慢性萎缩性胃炎

E.革囊胃

81.患者，女，30 岁。左颈无痛性淋巴结肿大半年，活检示淋巴结结构破坏，大量纤维束将病变分隔，病变内有炎细胞和陷窝细胞。诊断为结节硬化型霍奇金淋巴瘤。该陷窝细胞属于

A.里-施细胞

B.大无裂细胞

C.大裂细胞

D.巨噬细胞

E.施万细胞

82.患者，男，56 岁，左颈肿物 3 个月。术后标本示肿块位于左甲状腺内，无包膜，呈浸润性生长；镜下见细胞排列成小巢状，间质见淀粉样物质沉着。最可能的诊断是

A.滤泡状癌

B.乳头状癌

C.髓样癌

D.未分化癌

E.鳞状细胞癌

83.患者，男，42 岁，持续性剧烈腹痛 3 小时伴恶心、呕吐，诊断为“急性阑尾炎”并手术。术中见阑尾呈紫黑色，根部破裂。镜检如图，应诊断为

A.急性蜂窝织炎性阑尾炎伴穿孔

B.坏疽性阑尾炎伴穿孔

C.慢性阑尾炎伴穿孔

D.阑尾脓肿

E.阑尾腺瘤

84.患者，女，29岁，近一年来常有低热、盗汗、咳嗽、痰中带血，X线胸片见右肺尖有直径3.5cm、边缘模糊不清的云雾状阴影，痰培养查见抗酸杆菌，据此应诊断为

A.右肺尖局灶型肺结核

B.右肺尖结核球

C.右肺尖浸润型肺结核

D.右肺尖肺癌

E.右肺尖干酪样肺炎

85.患者，男，47岁，8年多来经常出现下肢水肿，腹胀，腹水(+)，面部有蜘蛛痣，肝未触及，脾肋缘下2cm，食管钡餐透视显示食管下段静脉曲张。应诊断为

A.肝癌

B.门脉性肝硬化

C.慢性肝炎

D.慢性肝淤血

E.亚急性重型肝炎

86.患者，女，50岁，阴道不规则分泌物，阴道镜检查，见子宫颈菜花状肿物，表面有出血坏死，最可能的诊断是

A.子宫颈糜烂

B.子宫颈息肉

C.子宫体癌

D.子宫颈癌

E.子宫颈肥大

87.动脉粥样硬化患者腹主动脉出现一巨大肿物，巨检如图所示，镜下见瘤壁由萎缩的动脉内、中、外膜构成，该病变最确切的名称是

A.血肿

B.假性动脉瘤

C.真性动脉瘤

D.夹层动脉瘤

E.血栓

88.患者，女，35岁，右下腹隐痛1个月，既往有阑尾炎发作史，经保守治疗控制。切除阑尾送检，镜下如图所示，应诊断为

A.急性蜂窝织炎性阑尾炎

B.坏疽性阑尾炎

C.慢性阑尾炎

D.阑尾脓肿

E.阑尾腺瘤

89.患者，女，46岁，近年来常有上腹部隐痛、胀满、嗳气、食欲缺乏等表现，胃镜活检显示慢性萎缩性胃炎和幽门螺杆菌感染，患者的胃黏膜具有特征性的病变是

A.黏液样变性

B.肠上皮化生

C.肥大

D.溃疡

E.凋亡

90.患者，女，37岁，右肩部皮下有一3cm大小的包块，病变如图，诊断是

A.梭形细胞脂肪瘤

B.多形性脂肪瘤

- C. 肌内脂肪瘤
- D. 棕色脂肪瘤
- E. 血管脂肪瘤

91. 患者吞咽困难，食管镜检见一菜花样肿块，镜下可见大量癌巢，癌巢中央出现层状角化物，细胞间可见细胞间桥。可能是下列哪一种疾病

- A. 高分化鳞癌
- B. 低分化鳞癌
- C. 高分化腺癌
- D. 低分化腺癌
- E. 小细胞癌

92. 患者，女，53岁，体检发现乙状结肠息肉一枚，予以肠镜下摘除。巨检见有蒂息肉一个，大小0.6cm×0.5cm×0.4cm，蒂长0.3cm。镜下见腺体增生伴轻-中度异型。病理诊断为

- A. 乙状结肠腺癌
- B. 乙状结肠腺瘤
- C. 乙状结肠息肉
- D. 乙状结肠增生性息肉
- E. 乙状结肠 PJ 息肉

93. 某成年女性一侧左颈部淋巴结肿大，病理活体组织检查如图。最可能的是

- A. 胃肠道肿瘤转移
- B. 鼻咽癌转移
- C. 肺鳞癌转移
- D. 食管癌转移
- E. 喉癌转移

94. 患儿，4岁，头痛发热，神志不清，抽搐不止，皮肤有大片淤斑。尸检见双侧肾上腺大片出血，脑膜充血，脑膜血管周围有少量中性粒细胞浸润。根据临床和尸检所见，诊断为

- A. 流行性出血热
- B. 结核性脑膜炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 暴发性流行性脑脊髓膜炎

题型：B1

（95～97 共用备选答案）

共用备选答案

- A. 浆液性炎
- B. 表面化脓和积脓
- C. 脓肿
- D. 纤维素性炎
- E. 蜂窝织炎

95. 皮肤疖肿属

96. 流行性脑脊髓膜炎属

97. 化脓性胆管炎属

（98～100 共用备选答案）

共用备选答案

- A. 速发短暂反应
- B. 迟发持续短暂反应
- C. 内皮细胞连接发育不成熟
- D. 速发持续反应

E.白细胞介导的内皮细胞损伤

98.由血管活性胺引起的血管通透性升高属

99.由严重烧伤引起的血管通透性升高属

100.由放射损伤引起的血管通透性升高属

(101~104 共用备选答案)

共用备选答案

A.细胞水肿

B.脂肪变

C.玻璃样变

D.淀粉样变

E.黏液样变性

101.如图,病毒性肝炎时,肝细胞体积增大呈气球样,最有可能的是哪种改变

102.在 HE 制片时,肾近曲小管上皮细胞质内出现大小不等的圆形红染小滴,最有可能的是哪种改变

103.如图,在 HE 制片时,肝细胞质内出现大小不等的圆形空泡,最有可能的是哪种改变

104.在细胞外间质内或小血管基底膜处,出现大量遇碘呈棕褐色、再加硫酸则呈蓝色的物质,最有可能的是哪种改变

(105~107 共用备选答案)

共用备选答案

A.化生

B.肥大

C.机化

D.增生

E.钙化

105.哺乳期的乳腺

106.老年人的硬脑膜出现骨组织

107.坏死组织被新生的肉芽组织取代的过程,属于

(108~112 共用备选答案)

共用备选答案

A.单行癌细胞呈线状浸润于纤维间质

B.癌细胞局限于腺泡中,未突破其基底膜

C.导管扩张,内含坏死物,挤压导管时可见坏死物如粉刺状

D.导管内异型细胞增生呈筛孔状、实性或腺管状,基底膜完整

E.导管内癌细胞突破管壁基底膜向间质浸润

108.浸润性导管癌的主要表现是

109.浸润性小叶癌的主要表现是

110.小叶原位癌的主要表现是

111.粉刺癌的主要表现是

112.非粉刺型导管内癌的主要表现是

(113~114 共用备选答案)

共用备选答案

A.良性肿瘤

B.癌前病变

C.恶性肿瘤

D.原位癌

E.早期癌

113.直、结肠家族性多发性腺瘤样息肉是

114.仅浸润黏膜层和黏膜下层的胃肠道癌是

(115~118 共用备选答案)

共用备选答案

- A.溃疡直径多在 2.5cm 以内，溃疡边缘整齐，周围黏膜皱襞向溃疡集中
- B.溃疡一般较小而浅，直径多在 1cm 以内，但易发生穿孔
- C.溃疡大且不规则，常呈火山口状，周围皱襞中断，呈结节状肥厚
- D.溃疡呈口小底大的烧瓶状
- E.溃疡呈环状与肠的长轴垂直

115.胃溃疡的表现

116.溃疡型胃癌的表现

117.十二指肠溃疡的表现

118.肠结核的表现

(119~123 共用备选答案)

共用备选答案

- A.淤血
 - B.梗死
 - C.慢性心瓣膜病
 - D.肺动脉栓塞
 - E.减压后充血
- 119.静脉血栓形成，未能建立有效的侧支循环可引起
- 120.一次大量抽放腹水可引起
- 121.血栓阻塞动脉，缺乏有效的侧支循环可引起
- 122.风湿热反复发作可引起
- 123.髂静脉内血栓脱落可引起

(124~128 共用备选答案)

共用备选答案

- A.纤维素性炎
 - B.化脓性炎
 - C.增生性炎
 - D.变质性炎
 - E.出血性炎
- 124.伤寒的病变性质是
- 125.急性细菌性痢疾的病变性质是
- 126.钩端螺旋体病的病变性质是
- 127.乙型脑炎的病变性质是
- 128.淋病的病变性质是

(129~133 共用备选答案)

共用备选答案

- A.直接蔓延
 - B.淋巴道转移
 - C.血道转移
 - D.种植性转移
 - E.不发生转移
- 129.如图，患者原有肝癌，此为患者的肺组织发生的转移为
- 130.子宫颈原位癌时，发生的转移为
- 131.如图，患者原有胃癌，此为患者的卵巢发生的转移为
- 132.如图，某患者原有鼻涕带血，后出现颈部肿块发生的转移为
- 133.子宫颈癌累及直肠和膀胱，为

(134~135 共用备选答案)

共用备选答案

- A.鳞状细胞癌
- B.黏液腺癌
- C.腺癌
- D.腺鳞癌
- E.腺棘癌

134.食管癌的组织学类型多为

135.胃癌的组织学类型多为

答案:

题型: A1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
E	A	A	B	B	E	B	C	C	B
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.
E	C	B	B	A	B	D	E	D	C
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.
C	B	A	E	D	B	D	A	E	E
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.
A	D	E	A	D	A	B	C	B	E
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.
E	A	D	B	D	E	D	E	D	C
5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.
E	E	D	E	D	D	C	D	A	D

题型: A2

6	6	6	6	6	6	6	6	6	70.A
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
C	A	E	A	C	B	E	C	E	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	80.E
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
C	A	B	B	C	D	E	A	A	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	90.D
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
A	C	B	C	B	D	C	C	B	
9	9	9	9						
1.	2.	3.	4.						
A	B	A	E						

题型: B1

9	9	9	9	9	1	1	1	1	104.D
5.	6.	7.	8.	9.	0	0	0	0	
C	B	B	A	D	0.	1.	2.	3.	
					B	A	C	B	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	114.E
0	0	0	0	0	1	1	1	1	

5.6.7.8.9.0.1.2.3.	
BACEABCD	
11111111	124.C
11111222	
5.6.7.8.9.0.1.2.3.	
ACBEAEBDC	
11111111	134.A
22222333	
5.6.7.8.9.0.1.2.3.	
AEDBCEDBA	
1	
3	
5.	
C	