



## 习题 1-1 解答

1. 求下列函数的自然定义域:

$$(1) y = \sqrt{3x+2}; \quad (2) y = \frac{1}{1-x^2}; \quad (3) y = \frac{1}{x} - \sqrt{1-x^2};$$

$$(4) y = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}; \quad (5) y = \sin \sqrt{x}; \quad (6) y = \tan(x+1);$$

$$(7) y = \arcsin(x-3); \quad (8) y = \sqrt{3-x} + \arctan \frac{1}{x};$$

$$(9) y = \ln(x+1); \quad (10) y = e^{\frac{1}{x}}.$$

解 (1)  $3x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{2}{3}$  即定义域为  $[-\frac{2}{3}, +\infty)$ .

(2)  $1-x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$ , 即定义域为  $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$ .

(3)  $x \neq 0$  且  $1-x^2 \geq 0 \Rightarrow x \neq 0$  且  $|x| \leq 1$ , 即定义域为  $[-1, 0) \cup (0, 1]$ .

(4)  $4-x^2 > 0 \Rightarrow |x| < 2$ , 即定义域为  $(-2, 2)$ .

(5)  $x \geq 0$ , 即定义域为  $[0, +\infty)$ .

(6)  $x+1 \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$  即定义域为  $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x \neq (k + \frac{1}{2})\pi - 1, k \in \mathbb{Z}\}$ .

(7)  $|x-3| \leq 1 \Rightarrow 2 \leq x \leq 4$ , 即定义域为  $[2, 4]$ .

(8)  $3-x \geq 0$  且  $x \neq 0$ , 即定义域为  $(-\infty, 0) \cup (0, 3]$ .

(9)  $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$ , 即定义域为  $(-1, +\infty)$ .

(10)  $x \neq 0$ , 即定义域为  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ .

评注: 本题是求函数的自然定义域, 一般方法是先写出构成所求函数的各个简单函数的定义域, 再求出这些定义域的交集, 即得所求定义域. 下列简单函数及其定义域是经常用到的:

$$y = \frac{Q(x)}{P(x)}, P(x) \neq 0;$$

$$y = \sqrt[n]{x}, x \geq 0;$$

$$y = \log_a x, x > 0;$$

$$y = \tan x, x \neq (k + \frac{1}{2})\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$y = \cot x, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$y = \arcsin x, |x| \leq 1;$$

$$y = \arccos x, |x| \leq 1.$$

2. 下列各题中, 函数  $f(x)$  和  $g(x)$  是否相同? 为什么?

$$(1) f(x) = \lg x^2, g(x) = 2 \lg x;$$

$$(2) f(x) = x, g(x) = \sqrt{x^2};$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x^4 - x^3}, g(x) = x \sqrt[3]{x-1};$$

$$(4) f(x) = 1, g(x) = \sec^2 x - \tan^2 x.$$

解 (1) 不同, 因为定义域不同.

(2) 不同, 因为对应法则不同,  $g(x) = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$

(3) 相同, 因为定义域、对应法则均相同.

(4) 不同, 因为定义域不同.

① 定义域

② 对应法则

$$3. \text{ 设 } \varphi(x) = \begin{cases} |\sin x|, & |x| < \frac{\pi}{3}, \\ 0, & |x| \geq \frac{\pi}{3}, \end{cases}$$



求  $\varphi(\frac{\pi}{6})$ ,  $\varphi(\frac{\pi}{4})$ ,  $\varphi(-\frac{\pi}{4})$ ,  $\varphi(-2)$ , 并作出函数  $y=\varphi(x)$  的图形.

解  $\varphi(\frac{\pi}{6}) = \left| \sin \frac{\pi}{6} \right| = \frac{1}{2}$ ,  $\varphi(\frac{\pi}{4}) = \left| \sin \frac{\pi}{4} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

$\varphi(-\frac{\pi}{4}) = \left| \sin(-\frac{\pi}{4}) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\varphi(-2) = 0$ .

$y=\varphi(x)$  的图形如图 1-1 所示.




图 1-1

4. 讨论下列函数的有界性.

(1)  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ ; (2)  $f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^4}$ .

解 (1) 对任意的  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 有  $|f(x)| = \left| \frac{x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{2}$ , 所以  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有界.

(2) 当  $|x|=1$  时,  $|f(x)|=1$ ;

当  $|x|>1$  时,  $|f(x)| = \frac{1+x^2}{1+x^4} < \frac{1+x^4}{1+x^4} = 1$ ;

当  $|x|<1$  时,  $|f(x)| = \frac{1+x^2}{1+x^4} \leq 1+x^2 < 2$ .

所以, 对任意的  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 有  $|f(x)| < 2$ , 即  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有界.

5. 试证下列函数在指定区间内的单调性:

(1)  $y = \frac{x}{1-x}$ ,  $(-\infty, 1)$ ; (2)  $y = x + \ln x$ ,  $(0, +\infty)$ .

证 (1)  $y = f(x) = \frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}$ ,  $x \in (-\infty, 1)$

设  $x_1 < x_2 < 1$ . 因为  $f(x_2) - f(x_1) = \frac{1}{1-x_2} - \frac{1}{1-x_1} = \frac{x_2 - x_1}{(1-x_1)(1-x_2)} > 0$ ,

所以  $f(x_2) > f(x_1)$ , 即  $f(x)$  在  $(-\infty, 1)$  内单调增加.

(2)  $y = f(x) = x + \ln x$ ,  $x \in (0, +\infty)$ .

设  $0 < x_1 < x_2$ . 因为  $f(x_2) - f(x_1) = x_2 + \ln x_2 - x_1 - \ln x_1 = x_2 - x_1 + \ln \frac{x_2}{x_1} > 0$ ,

所以,  $f(x_2) > f(x_1)$ , 即  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内单调增加.

6. 讨论下列函数的单调性:

(1)  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , 其中  $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ;

(2)  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ , 其中  $a, b, c, d \in \mathbb{R}, c > 0$ .

解 (1)  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}$ .

当  $a > 0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, -\frac{b}{2a})$  单调减少,  $f(x)$  在  $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$  单调增加.

当  $a < 0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, -\frac{b}{2a})$  单调增加,  $f(x)$  在  $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$  单调减少.

(2)  $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$ ,

当  $bc-ad > 0$  时,  $f(x)$  分别在  $(-\infty, -\frac{d}{c})$  及  $(-\frac{d}{c}, +\infty)$  内单调减少; 当  $bc-ad < 0$  时,  $f(x)$

分别在  $(-\infty, -\frac{d}{c})$  及  $(-\frac{d}{c}, +\infty)$  内单调增加; 当  $bc-ad = 0$  时,  $f(x) = \frac{a}{c}$  为常数函数, 此时

$f(x)$  既是单调不减函数又是单调不减函数.



4 题视频解析



6 题视频解析



7. 设  $f(x)$  为定义在  $(-l, l)$  内的奇函数, 若  $f(x)$  在  $(0, l)$  内单调增加, 证明  $f(x)$  在  $(-l, 0)$  内也单调增加.

**证** 设  $-l < x_1 < x_2 < 0$ , 则  $0 < -x_2 < -x_1 < l$ , 由  $f(x)$  是奇函数, 得  $f(x_2) - f(x_1) = -f(-x_2) + f(-x_1)$ .  
因为  $f(x)$  在  $(0, l)$  内单调增加, 所以  $f(-x_1) - f(-x_2) > 0$ , 从而  $f(x_2) > f(x_1)$  即  $f(x)$  在  $(-l, 0)$  内也单调增加.

8. 设下面所考虑的函数都是定义在区间  $(-l, l)$  上的. 证明:

(1) 两个偶函数的和是偶函数, 两个奇函数的和是奇函数;

(2) 两个偶函数的乘积是偶函数, 两个奇函数的乘积是偶函数, 偶函数与奇函数的乘积是奇函数.



8 题视频解析

**证** (1) 设  $f_1(x), f_2(x)$  均为偶函数, 则  $f_1(-x) = f_1(x), f_2(-x) = f_2(x)$ . 令  $F(x) =$

$$f_1(x) + f_2(x), \text{ 于是 } F(-x) = f_1(-x) + f_2(-x) = f_1(x) + f_2(x) = F(x),$$

故  $F(x)$  为偶函数.

设  $g_1(x), g_2(x)$  是奇函数, 则  $g_1(-x) = -g_1(x), g_2(-x) = -g_2(x)$ . 令  $G(x) = g_1(x) + g_2(x)$ , 于是

$$G(-x) = g_1(-x) + g_2(-x) = -g_1(x) - g_2(x) = -G(x),$$

故  $G(x)$  为奇函数.

(2) 设  $f_1(x), f_2(x)$  均为偶函数, 则  $f_1(-x) = f_1(x), f_2(-x) = f_2(x)$ . 令  $F(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$ .

$$\text{于是 } F(-x) = f_1(-x) \cdot f_2(-x) = f_1(x) f_2(x) = F(x),$$

故  $F(x)$  为偶函数.

设  $g_1(x), g_2(x)$  均为奇函数, 则  $g_1(-x) = -g_1(x), g_2(-x) = -g_2(x)$ . 令  $G(x) = g_1(x) \cdot$

$$g_2(x). \text{ 于是 } G(-x) = g_1(-x) \cdot g_2(-x) = [-g_1(x)][-g_2(x)] = g_1(x) \cdot g_2(x) = G(x),$$

故  $G(x)$  为偶函数.

设  $f(x)$  为偶函数,  $g(x)$  为奇函数, 则  $f(-x) = f(x), g(-x) = -g(x)$ . 令  $H(x) = f(x) \cdot g(x)$ ,

$$\text{于是 } H(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x)[-g(x)] = -f(x) \cdot g(x) = -H(x),$$

故  $H(x)$  为奇函数.

9. 下列函数中哪些是偶函数, 哪些是奇函数, 哪些既非偶函数又非奇函数?

(1)  $y = x^2(1-x^2)$ ;

(2)  $y = 3x^2 - x^3$ ;

(3)  $y = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ;

(4)  $y = x(x-1)(x+1)$ ;

(5)  $y = \sin x - \cos x + 1$ ;

(6)  $y = \frac{a^x + a^{-x}}{2} (a > 0, a \neq 1)$ .

**解** (1)  $y = f(x) = x^2(1-x^2)$ , 因为  $f(-x) = (-x)^2[1-(-x)^2] = x^2(1-x^2) = f(x)$ ,

所以  $f(x)$  为偶函数.

(2)  $y = f(x) = 3x^2 - x^3$ , 因为

$$f(-x) = 3(-x)^2 - (-x)^3 = 3x^2 + x^3,$$

$$f(-x) \neq f(x), \text{ 且 } f(-x) \neq -f(x),$$

所以  $f(x)$  既非偶函数又非奇函数.

(3)  $y = f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ , 因为  $f(-x) = \frac{1-(-x)^2}{1+(-x)^2} = \frac{1-x^2}{1+x^2} = f(x)$ ,

所以  $f(x)$  为偶函数.

(4)  $y = f(x) = x(x-1)(x+1)$ , 因为  $f(-x) = (-x)[(-x)-1][(-x)+1] = -x(x+1)(x-1) = -f(x)$ , 所以  $f(x)$  为奇函数.

(5)  $y = f(x) = \sin x - \cos x + 1$ , 因为  $f(-x) = \sin(-x) - \cos(-x) + 1 = -\sin x - \cos x + 1$ ,

$$f(-x) \neq f(x) \text{ 且 } f(-x) \neq -f(x),$$

所以  $f(x)$  既非偶函数又非奇函数.

(6)  $y = f(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$ , 因为  $f(-x) = \frac{a^{-x} + a^x}{2} = f(x)$ , 所以  $f(x)$  为偶函数.





10. 下列各函数中哪些是周期函数? 对于周期函数, 指出其周期:

(1)  $y = \cos(x-2)$ ;

(2)  $y = \cos 4x$ ;

(3)  $y = 1 + \sin \pi x$ ;

(4)  $y = x \cos x$ ;

(5)  $y = \sin^2 x$ .

解 (1) 是周期函数, 周期  $l=2\pi$ . (2) 是周期函数, 周期  $l=\frac{\pi}{2}$ . (3) 是周期函数, 周期  $l=2$ .

(4) 不是周期函数.

(5) 是周期函数, 周期  $l=\pi$ .

11. 求下列函数的反函数:

(1)  $y = \sqrt[3]{x+1}$ ;

(2)  $y = \frac{1-x}{1+x}$ ;

(3)  $y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (ad-bc \neq 0)$ ;

(4)  $y = 2\sin 3x \quad (-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{6})$ ;

(5)  $y = 1 + \ln(x+2)$ ;

(6)  $y = \frac{2^x}{2^x+1}$ .

分析 函数  $f$  存在反函数的前提条件为:  $f: D \rightarrow f(D)$  是单射. 本题中所给出的各函数易证均为单射, 特别 (1)、(4)、(5)、(6) 中的函数均为单调函数, 故都存在反函数.

解 (1) 由  $y = \sqrt[3]{x+1}$  解得  $x = y^3 - 1$ , 即反函数为  $y = x^3 - 1$ .

(2) 由  $y = \frac{1-x}{1+x}$  解得  $x = \frac{1-y}{1+y}$ , 即反函数为  $y = \frac{1-x}{1+x}$ .

(3) 由  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  解得  $x = \frac{-dy+b}{cy-a}$ , 即反函数为  $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$ .

(4) 由  $y = 2\sin 3x \quad (-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{6})$  解得  $x = \frac{1}{3} \arcsin \frac{y}{2}$ , 即反函数为  $y = \frac{1}{3} \arcsin \frac{x}{2}$ .

(5) 由  $y = 1 + \ln(x+2)$  解得  $x = e^{y-1} - 2$ , 即反函数为  $y = e^{x-1} - 2$ .

(6) 由  $y = \frac{2^x}{2^x+1}$  解得  $x = \log_2 \frac{y}{1-y}$ , 即反函数为  $y = \log_2 \frac{x}{1-x}$ .

12. 在下列各题中, 求由所给函数构成的复合函数, 并求该函数分别对应于给定自变量值  $x_1$  和  $x_2$  的函数值:

(1)  $y = u^2, u = \sin x, x_1 = \frac{\pi}{6}, x_2 = \frac{\pi}{3}$ ;

(2)  $y = \sin u, u = 2x, x_1 = \frac{\pi}{8}, x_2 = \frac{\pi}{4}$ ;

(3)  $y = \sqrt{u}, u = 1+x^2, x_1 = 1, x_2 = 2$ ;

(4)  $y = e^u, u = x^2, x_1 = 0, x_2 = 1$ ;

(5)  $y = u^2, u = e^x, x_1 = 1, x_2 = -1$ .

解 (1)  $y = \sin^2 x, y_1 = \frac{1}{4}, y_2 = \frac{3}{4}$ .

(2)  $y = \sin 2x, y_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, y_2 = 1$ .

(3)  $y = \sqrt{1+x^2}, y_1 = \sqrt{2}, y_2 = \sqrt{5}$ .

(4)  $y = e^{x^2}, y_1 = 1, y_2 = e$ .

(5)  $y = e^{2x}, y_1 = e^2, y_2 = e^{-2}$ .

13. 设  $f(x)$  的定义域  $D=[0,1]$ , 求下列各函数的定义域:

(1)  $f(x^2)$ ;

(2)  $f(\sin x)$ ;

(3)  $f(x+a) \quad (a>0)$ ;

(4)  $f(x+a) + f(x-a) \quad (a>0)$ .

解 (1)  $0 \leq x^2 \leq 1 \Rightarrow x \in [-1,1]$ .

(2)  $0 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow x \in [2n\pi, (2n+1)\pi], n \in \mathbb{Z}$ .

(3)  $0 \leq x+a \leq 1 \Rightarrow x \in [-a, 1-a]$ .

(4)  $\begin{cases} 0 \leq x+a \leq 1 \\ 0 \leq x-a \leq 1 \end{cases} \Rightarrow$  当  $0 < a \leq \frac{1}{2}$  时,  $x \in [a, 1-a]$ ; 当  $a > \frac{1}{2}$  时, 定义域为  $\emptyset$  (即空集).

14. 设  $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| = 1, \\ -1, & |x| > 1, \end{cases} g(x) = e^x$ , 求  $f[g(x)]$  和  $g[f(x)]$ , 并作出这两个函数的图形.

解  $f[g(x)] = f(e^x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x > 0. \end{cases} g[f(x)] = e^{f(x)} = \begin{cases} e, & |x| < 1, \\ 1, & |x| = 1, \\ e^{-1}, & |x| > 1. \end{cases}$

$f[g(x)]$ 与 $g[f(x)]$ 的图形依次如图 1-2, 图 1-3 所示.




图 1-2




图 1-3

15. 已知水渠的横断面为等腰梯形, 斜角  $\varphi=40^\circ$  (图 1-4). 当过水断面  $ABCD$  的面积为定值  $S_0$  时, 求湿周  $L$  ( $L=AB+BC+CD$ ) 与水深  $h$  之间的函数关系式, 并指明其定义域.

**解**  $AB=CD=\frac{h}{\sin 40^\circ}$ , 又

$$S_0 = \frac{1}{2} h [BC + (BC + 2 \cot 40^\circ \cdot h)],$$

得  $BC = \frac{S_0}{h} - \cot 40^\circ \cdot h,$

所以  $L = \frac{S_0}{h} + \frac{2 - \cos 40^\circ}{\sin 40^\circ} h,$




图 1-4

而  $h > 0$  且  $\frac{S_0}{h} - \cot 40^\circ \cdot h > 0$  因此湿周函数的定义域为  $(0, \sqrt{S_0 \tan 40^\circ})$ .

16. 设  $xOy$  平面上有正方形  $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$  及直线  $l: x + y = t (t \geq 0)$ . 若  $S(t)$  表示正方形  $D$  位于直线  $l$  左下方部分的面积, 试求  $S(t)$  与  $t$  之间的函数关系.

**解** 当  $0 \leq t \leq 1$  时,  $S(t) = \frac{1}{2} t^2$ ; 当  $1 < t \leq 2$  时,  $S(t) = 1 - \frac{1}{2} (2-t)^2 = -\frac{1}{2} t^2 + 2t - 1$ ;

当  $t > 2$  时,  $S(t) = 1$ .

$$\text{故 } S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ -\frac{1}{2} t^2 + 2t - 1, & 1 < t \leq 2, \\ 1, & t > 2. \end{cases}$$

17. 求联系华氏温度 (用  $F$  表示) 和摄氏温度 (用  $C$  表示) 的转换公式, 并求

(1)  $90^\circ\text{F}$  的等价摄氏温度和  $-5^\circ\text{C}$  的等价华氏温度;

(2) 是否存在一个温度值, 使华氏温度计和摄氏温度计的读数是一样的? 如果存在, 那么该温度值是多少?

**解** 设  $F = mC + b$ , 其中  $m, b$  均为常数.

因为  $F = 32^\circ$  相当于  $C = 0^\circ$ ,  $F = 212^\circ$  相当于  $C = 100^\circ$ , 所以  $b = 32$ ,  $m = \frac{212-32}{100} = 1.8$ .

故  $F = 1.8C + 32$  或  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ .

(1)  $F = 90^\circ$ ,  $C = \frac{5}{9}(90 - 32) \approx 32.2^\circ$ .

$C = -5^\circ$ ,  $F = 1.8 \times (-5) + 32 = 23^\circ$ .

(2) 设温度值  $t$  符合题意, 则有  $t = 1.8t + 32$ ,  $t = -40$ .

即华氏  $-40^\circ$  恰好也是摄氏  $-40^\circ$ .



18. 已知  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, 直角边  $AC$ 、 $BC$  的长度分别为 20, 15, 动点  $P$  从  $C$  出发, 沿三角形边界按  $C \rightarrow B \rightarrow A$  方向移动; 动点  $Q$  从  $C$  出发, 沿三角形边界按  $C \rightarrow A \rightarrow B$  方向移动, 移动到两动点相遇时为止, 且点  $Q$  移动的速度是点  $P$  移动的速度的 2 倍. 设动点  $P$  移动的距离为  $x$ ,  $\triangle CPQ$  的面积为  $y$ , 试求  $y$  与  $x$  之间的函数关系.

**解** 因为  $AC=20, BC=15$ , 所以,  $AB=\sqrt{20^2+15^2}=25$ .

由  $20 < 2 \times 15 < 20 + 25$  可知, 点  $P, Q$  在斜边  $AB$  上相遇.

令  $x+2x=15+20+25$ , 得  $x=20$ . 即当  $x=20$  时, 点  $P, Q$  相遇. 因此, 所求函数的定义域为  $(0, 20)$ .

(1) 当  $0 < x < 10$  时, 点  $P$  在  $CB$  上, 点  $Q$  在  $CA$  上 (图 1-5). 由  $|CP|=x, |CQ|=2x$ , 得  $y=x^2$ .

(2) 当  $10 \leq x \leq 15$  时, 点  $P$  在  $CB$  上, 点  $Q$  在  $AB$  上 (图 1-6).

$$|CP|=x, \quad |AQ|=2x-20.$$

设点  $Q$  到  $BC$  的距离为  $h$ , 则  $\frac{h}{20} = \frac{|BQ|}{25} = \frac{45-2x}{25}$ ,

$$\text{得 } h = \frac{4}{5}(45-2x), \text{ 故 } y = \frac{1}{2}xh = \frac{2}{5}x(45-2x) = -\frac{4}{5}x^2 + 18x.$$

(3) 当  $15 < x < 20$  时, 点  $P, Q$  都在  $AB$  上 (图 1-7).




图 1-5




图 1-6




图 1-7

$$|BP|=x-15, \quad |AQ|=2x-20, \quad |PQ|=60-3x.$$

设点  $C$  到  $AB$  的距离  $h'$ , 则  $h' = \frac{15 \times 20}{25} = 12$ , 得  $y = \frac{1}{2}|PQ| \cdot h' = -18x + 360$ .

$$\text{综上所述可得 } y = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 10, \\ -\frac{4}{5}x^2 + 18x, & 10 \leq x \leq 15, \\ -18x + 360, & 15 < x < 20. \end{cases}$$

## 第二节 数列的极限

### 一、主要内容归纳

**1. 数列** 一个定义在正整数集合上的函数  $a_n = f(n)$  (称为整标函数), 当自变量  $n$  按正整数  $1, 2, 3, \dots$  依次增大的顺序取值时, 函数按相应的顺序排成一串数:  $f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), \dots$  称为一个无穷数列, 简称数列. 数列中的每一个数称为数列的项,  $f(n)$  称为数列的一般项或通项.

### 2. 数列极限的定义

(1) 设  $\{x_n\}$  是一数列, 如果存在常数  $a$ , 当  $n$  无限增大时,  $x_n$  无限接近 (或趋近) 于  $a$ , 则称数列  $\{x_n\}$  收敛,  $a$  称为数列  $\{x_n\}$  的极限, 或称数列  $\{x_n\}$  收敛于  $a$ , 记为  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ . 或  $n \rightarrow \infty$  当