


高等数学



§1.6 极限存在准则——重要极限——



夹逼定理

重要极限一及其应用





思考题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = (\quad).$$

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 不存在

D. 无法确定

分析:

$n \rightarrow \infty$ 时, 上式为无限个无穷小之和.



极限加法的运算法则不适用!

解:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \cdots + n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



思考题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right).$$

对比分析:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \cdots + n) = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2 + n} (1 + 2 + \cdots + n) &\leq \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + 1} (1 + 2 + \cdots + n) \\ &= \frac{n^2 + 1}{2(n^2 + n)} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty) \qquad \qquad \qquad = \frac{n^2 + n}{2(n^2 + 1)} \rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$


思考:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) = \frac{1}{2}$$



定理1 (夹逼准则) 设 $y_n \leq a_n \leq x_n$ ($n = n_0, n_0 + 1, \dots$) 且数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 收敛到相同极限, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$



- 夹逼准则既能得到**定性结论**, 又可得到**定量结论**.
- 应用关键: 通过**放缩**要找到**合适的**上界数列和下界数列.



思考题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right).$$

解:

$$\frac{n^2 + 1}{2(n^2 + n)} \leq \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n^2 + 1}{2(n^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2(n^2 + n)} = \frac{1}{2}$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) = \frac{1}{2}$

进一步
思考:

$$\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n^2}{n^2 + n} \quad \text{可行否?}$$

例1 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

例2 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

例3 设 $a > 1$ 为常数, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.



例4 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.

例 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n + 3^n}.$


例 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}.$

定理2(夹逼准则) 设 $f(x)$, $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 在 x_0 的去心邻域 $U_0(x_0, \delta_0)$ 中满足 $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x)$ 存在且相等, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 且


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x).$$





极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$. (无穷小与有界函数之积)



求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$. (无穷小与有界函数之积)



例5 (重要极限之一) 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. $\frac{0}{0}$ 型未定式



例6 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

例7 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$$

总结

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

此公式建立了三角函数、反三角函数与幂函数之间的极限关系。

三角函数

反三角函数

幂函数



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} = 1 \quad (\text{其中 } a \text{ 为非零常数})$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1 \quad (\text{其中 } f(x) \text{ 为 } x \rightarrow x_0 \text{ 时的无穷小})$$

例8 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2-1}$$

例9 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$

例10 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin 2x}{x + \tan 3x}.$

总结

➤ 此公式适用于求含三角函数的 $\frac{0}{0}$ 型未定式的极限.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \boxed{\varphi(x)}}{\boxed{\varphi(x)}} \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

特点: (1) 含正弦函数的 $\frac{0}{0}$ 型未定式

(2) 所有用 $\boxed{}$ 框住的位置形式一致

(3) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$

例11 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{3}{2^n}$. $\frac{0}{0}$ 型未定式

例12 求极限: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(\pi - x)^2}$. $\frac{0}{0}$ 型未定式