

非交换几何选讲

曲豆豆 码字
南七技校福利社 五道口分社
2019 年 3 月 7 日
第 01-1 稿



图：雾气朦胧的安徽合肥大蜀山森林公园
拍摄于 2014.5.31 - 10: 44

在五道口也要红专并进、理实交融呀～

目录

1	Hochschild 理论	3
1.1	结合代数的双模、余中心	3
1.2	Hochschild 同调	6
1.3	Hochschild 上同调	10
1.4	Hochschild (上) 同调的例子	15
1.5	循环同调	20
1.6	始有一如, 独一之神, 其名在阿尔达称为伊露维塔。	21

第 1 章 Hochschild 理论

1.1 结合代数的双模、余中心

我们需要代数拓扑、同调代数的预备知识，并且采用同调代数的标准术语、记号，诸如链复形、上同调、导出函子等等。首先介绍基本的记号与概念。

在本课，我们给定一个特征 0 的含么交换环 K （例如一个域），考虑含么结合 K -代数 A （注意 A 未必是交换代数），并且 A 作为交换环 K 上的模是投射模（projective module）。 A 的 K -代数结构给出如下 K -模同态：

$$\begin{aligned} A \otimes_K A &\rightarrow A \\ (a_1, a_2) &\mapsto a_1 a_2 \end{aligned}$$

由 A 的结合性， $(a_1 a_2) a_3 = a_1 (a_2 a_3)$ 对 A 中任意元素 a_1, a_2, a_3 成立。

对于含么结合 K -代数 A ，回顾 A 的**反代数**（opposite algebra） A^{op} 。反代数 A^{op} 作为 K -模与 A 完全相同，记号如下：

$$\begin{aligned} \text{id} : A &\rightarrow A^{\text{op}} \\ x &\mapsto x^{\text{op}} \end{aligned}$$

但是 A^{op} 具有与 A “相反”的乘法，具体地，对于 A^{op} 中的元素 $x^{\text{op}}, y^{\text{op}}$ ，成立

$$x^{\text{op}} y^{\text{op}} := (yx)^{\text{op}}$$

定义 1.1.1. 对于含么结合 K -代数 A ，我们定义 K -代数 A^e 为

$$A^e := A \otimes_K A^{\text{op}}$$

即 A 与 A^{op} 的 K -代数张量积。

容易验证对于任何两个含么结合 K -代数 A, B ，总有

$$(A \otimes_K B)^{\text{op}} = A^{\text{op}} \otimes_K B^{\text{op}}$$

从而容易得到

$$(A^{\text{op}})^e = (A^e)^{\text{op}}$$

对于 K -代数 A ，回顾**双 A -模**（ A -bimodule）的概念如下：

定义 1.1.2. 对于 K -代数 A , 双 A -模是指如下资料:

(1) K -模 M ;

(2) A 在 M 上的左、右 K -线性作用,

并且满足相容性: $(a.m).b = a.(m.b)$ 对任意 $m \in M$ 以及 $a, b \in A$ 成立。

例如, A 本身自然有双 A -模结构, A 在其上的左、右作用即为左乘、右乘。再比如 K -模张量积 $A \otimes_K A$ 具有如下双 A -模结构:

$$b.(a_1 \otimes a_2) := (ba_1) \otimes a_2$$

$$(a_1 \otimes a_2).b := a_1 \otimes (a_2b)$$

其中 $a_1, a_2, b \in A$.

我们不再回顾左模、右模的概念了, 也不去回顾右模与左模的平衡张量积。

性质 1.1.3. 设 M 为双 A -模,

(1) M 可自然地视为左 A^e -模:

$$(a_1 \otimes a_2^{op}).m = a_1.m.a_2$$

(2) M 可自然地视为右 A^e -模:

$$m.(a_1 \otimes a_2^{op}) = a_2.m.a_1$$

反之, 左(右) A^e -模也可视为双 A -模。

证明. 容易验证。 □

特别地如果 M, N 都是双 A -模, 那么考虑平衡张量积 $M \otimes_{A^e} N$, 它的双 A -模结构具体如下:

$$a.(m \otimes n) = (a.m) \otimes n = m \otimes (n.a)$$

$$(m \otimes n).b = m \otimes (n.b) = (b.m) \otimes n$$

对于任何 $m \in M, n \in N, a, b \in A$ 成立。

定义 1.1.4. (余中心 *cocenter*) 对于双 A -模 M , 称双 A -模

$$M \otimes_{A^e} A$$

为 M 的余中心 (*cocenter*)。

容易看出, 对任意的 $m \in M, a \in A$, 在余中心 $M \otimes_{A^e} A$ 当中, 成立

$$(m.a) \otimes 1 = m \otimes (a.1) = m \otimes a = m \otimes (1.a) = (a.m) \otimes 1$$

从而 $(m.a - a.m) \otimes 1 = 0$. 事实上, M 的余中心具有如下结构:

性质 1.1.5. 对于双 A -模 M , 则有如下双 A -模同构

$$M \otimes_{A^e} A \cong M / \{(m.a - a.m) | a \in A, m \in M\}$$

证明. 考虑如下的双 A -模链复形

$$\partial_\bullet : A \otimes A \otimes A \rightarrow A \otimes A \rightarrow A \rightarrow 0$$

其中

$$\begin{aligned} \partial : a_1 \otimes a_2 \otimes a_3 &\mapsto a_1 a_2 \otimes a_3 - a_1 \otimes a_2 a_3 \\ a_1 \otimes a_2 &\mapsto a_1 a_2 \end{aligned}$$

容易验证 $\partial^2=0$ (由 A 的结合性), 从而 ∂_\bullet 为双 A -模链复形. 并且显然 $\partial : A \otimes A \rightarrow A$ 是满同态.

断言链复形 ∂_\bullet 为正合 (exact) 的. 事实上, ∂_\bullet 到其自身的恒等链映射与零链映射是链同伦的. 我们构造如下的链同伦 h_\bullet :

$$\begin{aligned} h : a_1 &\mapsto 1 \otimes a_1 \\ a_1 \otimes a_2 &\mapsto 1 \otimes a_1 \otimes a_2 \end{aligned}$$

容易验证, 对于任意的 $\varphi = a_1 \otimes a_2 \in A \otimes A$, 成立

$$\begin{aligned} (\partial h + h \partial) \varphi &= (\partial h + h \partial)(a_1 \otimes a_2) \\ &= \partial(1 \otimes a_1 \otimes a_2) + h(a_1 a_2) \\ &= a_1 \otimes a_2 - 1 \otimes a_1 a_2 + 1 \otimes a_1 a_2 \\ &= a_1 \otimes a_2 = \varphi \end{aligned}$$

从而对于 $\varphi \in A \otimes A$, 如果 $\partial \varphi = 0$, 那么

$$\varphi = (\partial h + h \partial) \varphi = \partial(h \varphi)$$

这说明链复形 ∂_\bullet 在 $A \otimes A$ 处正合, 因此 ∂_\bullet 是正合的.

接下来, 将函子 $M \otimes_{A^e} -$ 作用于链复形 ∂_\bullet , 得到如下的双 A -模链复形:

$$M \otimes_{A^e} \partial_\bullet : M \otimes A \rightarrow M \rightarrow M \otimes_{A^e} A \rightarrow 0$$

由张量函子的右正合性, 上述链复形也是正合的. 其中注意到双 A -模同构

$$\begin{aligned} M \otimes_{A^e} (A \otimes A \otimes A) &\cong M \otimes A \\ m \otimes (a_1 \otimes a_2 \otimes a_3) &\mapsto (a_3.m.a_1) \otimes a_2 \end{aligned}$$

以及双 A -模同构

$$\begin{aligned} M \otimes_{A^e} (A \otimes A) &\cong M \\ m \otimes (a_1 \otimes a_2) &\mapsto a_2.m.a_1 \end{aligned}$$

于是正合列 $M \otimes_{A^e} \partial_\bullet$ 的边界映射有如下具体表达式:

$$\begin{aligned} M \otimes_{A^e} \partial : M \otimes A &\rightarrow M \\ m \otimes A &\mapsto m.a - a.m \end{aligned}$$

从而由正合性, 易知

$$M \otimes_{A^e} A \cong M / \{(m.a - a.m) | a \in A, m \in M\}$$

□

可见, M 的余中心无非是商掉 M 当中“非交换的部分”所得到的“交换的部分”, 如此望文生义。例如, 如果 A 为交换 K -代数, 那么 A 本身作为双 A -模, 其余中心为 A 本身。

1.2 Hochschild 同调

定义 1.2.1. (*Hochschild 同调*)

对于双 A -模 M , 以及非负整数 n , 记

$$H_n(A, M) := \text{Tor}_n^{A^e}(M, A)$$

称为 M 的第 n 个 *Hochschild 同调*。特别地, 我们记

$$\text{HH}_n(A) := H_n(A, A)$$

由定义以及导出函子的基础知识, 容易知道双 A -模 M 的第 0 个 Hochschild 同调

$$H_0(A, M) = M \otimes_{A^e} A = M / \{(m.a - a.m) | a \in A, m \in M\}$$

正是 M 的余中心。注意 Hochschild 同调一般并不是环, 仅仅能保证它是双 A -模。

具体地, 由导出函子的定义, 我们采用投射消解 (projective resolution) 来计算 Hochschild 同调。若双 A -模链复形

$$P_\bullet \rightarrow A := \dots \rightarrow P_3 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$$

为双 A -模 A 的投射消解 (正合, 并且每个 $P_i (i \geq 0)$ 作为 K -模是投射的), 那么

$$H_n(A, M) \cong H_n(M \otimes_{A^e} P_\bullet)$$

由同调代数的事实, 它与投射消解 P_\bullet 的选取无关。

事实上 Hochschild 同调可以与空间上的微分形式类比。作为一个具体计算例子, 我们考虑 \mathbb{C} 上的 n 元多项式代数

$$A := \mathbb{C}[x^1, x^2, \dots, x^n]$$

注意到 A 作为 \mathbb{C} -代数是交换的, 从而 $A = A^{\text{op}}$ 。我们记

$$A^{\text{op}} = \mathbb{C}[y^1, y^2, \dots, y^n] \quad A^e = \mathbb{C}[x^1, x^2, \dots, x^n; y^1, y^2, \dots, y^n]$$

性质 1.2.2. 考虑 \mathbb{C} -代数 $A := \mathbb{C}[x^1, x^2, \dots, x^n]$, 则其第 k 个 *Hochschild* 同调

$$\mathrm{HH}_k(A) \cong A \otimes \bigwedge^k(\mathbb{C}^n)$$

是以 A 为系数的 k -形式。

证明. 我们给出 A 的投射消解, 比如众所周知的 Koszul 消解

$$\mathcal{K}_A \rightarrow A \rightarrow 0$$

具体地, 引入 n 个新的独立变元 $\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n$ (视为复线性空间 \mathbb{C}^n 的一组基), 考虑环

$$\mathcal{K} := \frac{A^e[\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n]}{\{(\eta^i \eta^j + \eta^j \eta^i) | i \neq j\}} = A^e \otimes \bigwedge^*(\mathbb{C}^n)$$

为以 A^e 为系数的外代数。

注意 \mathcal{K} 有自然的分次:

$$\deg \eta^i = 1 \quad \deg x^i = \deg y^i = \deg 1 = 0$$

记 \mathcal{K}_l 为 \mathcal{K} 的 l 次分量 ($0 \leq l \leq n$), 即

$$\mathcal{K}_l = \bigoplus_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_l \leq n} A^e \eta^{i_1} \wedge \eta^{i_2} \wedge \dots \wedge \eta^{i_l} = A^e \otimes \bigwedge^l(\mathbb{C}^n)$$

此时 $K = \mathbb{C}$ 是域, 因此 \mathcal{K} (作为 K -模, 即复线性空间) 的投射性显然。我们定义 Koszul 复形 $(\mathcal{K}_A, \partial)$ 如下:

$$\mathcal{K}_A : \dots \xrightarrow{\partial} \mathcal{K}_n \xrightarrow{\partial} \mathcal{K}_{n-1} \xrightarrow{\partial} \dots \xrightarrow{\partial} \mathcal{K}_1 \xrightarrow{\partial} \mathcal{K}_0$$

其中边缘算子 ∂ (首先是 A^e -模同态) 满足

$$\partial \eta^i = x^i - y^i$$

以及与外微分相同的莱布尼茨法则: 对任意 $\omega \in \mathcal{K}$, 成立

$$\partial(\eta^i \wedge \omega) = \partial \eta^i \wedge \omega - \eta^i \wedge \partial \omega$$

再考虑连接映射

$$\begin{aligned} \varepsilon : \mathcal{K}_0 = A^c &\rightarrow A \\ x^i &\mapsto x^i \\ y^i &\mapsto x^i \end{aligned}$$

则众所周知, Koszul 复形

$$\mathcal{K}_A \xrightarrow{\varepsilon} A \rightarrow 0$$

为 A 的投射消解 (证明从略)。我们以此计算 $\mathrm{HH}^\bullet(A)$ 。我们注意到以下两个简单事实:

其一：对任何 $1 \leq l \leq n$ ，成立双 A -模同构

$$A \otimes_{A^e} \mathcal{K}_l = A \otimes_{A^e} A^e \otimes \bigwedge^l (\mathbb{C}^n) \cong A \otimes \bigwedge^l (\mathbb{C}^n)$$

其二：函子 $A \otimes_{A^e} -$ 作用于 Koszul 复形 \mathcal{K}_A 之后，成立

$$A \otimes_{A^e} \partial = 0$$

这是因为，对于任意 $f \in A$ ，在 $A \otimes_{A^e} A^e$ 当中总成立

$$f \otimes x^i = x^i f \otimes 1 = f x^i \otimes 1 = f \otimes (x^i)^{\text{op}} = f \otimes y^i$$

因此

$$f \otimes (x^i - y^i) = 0 \in A \otimes_{A^e} A^e$$

从而由 ∂ 的定义，容易看出 $A \otimes_{A^e} \partial = 0$ 。

综上两方面，直接计算之，

$$\begin{aligned} \text{HH}_k(A) &= H_k(A \otimes_{A^e}^L A) \\ &= H_k(A \otimes_{A^e} \mathcal{K}_A) \\ &= A \otimes_{A^e} \mathcal{K}_k \\ &= A \otimes \bigwedge^k (\mathbb{C}^n) \end{aligned}$$

从而得证。 □

事实上对于一般的含么结合 K -代数 A ， $\text{HH}_\bullet(A)$ 扮演了“微分形式”的角色。这是 Hochschild 同调的一种几何解释。

对于一般的 A ， A 作为双 A -模，由一种典范的投射消解，称之为 **Bar-复形**：

定义 1.2.3. (*Bar-复形*)

对于含么结合 K -代数 A ，定义以下双 A -模链复形

$$\cdots \rightarrow B_2 A \xrightarrow{b} B_1 A \xrightarrow{b} B_0 A \xrightarrow{b} A \rightarrow 0$$

如下：

$$B_n A := A \otimes A^{\otimes n} \otimes A \quad (n \geq 0)$$

$$b : a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \cdots \otimes a_n$$

称之为 **Bar-复形**。

首先容易验证 $b^2 = 0$, 从而 $B_\bullet A \xrightarrow{b} A \rightarrow 0$ 确实是链复形。对于 $n \geq 1$, 具体验证如下:

$$\begin{aligned}
b^2(a_0 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_n) &= b \left(\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a_0 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \right) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k b(a_0 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \left[\sum_{l=0}^{k-2} (-1)^l a_0 \otimes \dots \otimes (a_l a_{l+1}) \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \right. \\
&\quad + (-1)^{k-1} a_0 \otimes \dots \otimes (a_{k-1} a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \\
&\quad + (-1)^k a_0 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1} a_{k+2}) \otimes \dots \otimes a_n \\
&\quad \left. - \sum_{l=k+2}^{n-1} (-1)^l a_0 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes (a_l a_{l+1}) \otimes \dots \otimes a_n \right] \\
&= \sum_{\substack{0 \leq k < l \leq n-1 \\ l-k \geq 2}} \left(-(-1)^{k+l} + (-1)^{k+l} \right) a_0 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes (a_l a_{l+1}) \otimes \dots \otimes a_n \\
&\quad + \sum_{0 \leq k \leq n-2} \left((-1)^{2k+1} + (-1)^{2k} \right) a_0 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1} a_{k+2}) \otimes \dots \otimes a_n \\
&= 0
\end{aligned}$$

从而验证完毕。

我们可以把 $a_0 \otimes \dots \otimes a_n$ 想象为直线上依次排列的 $n+1$ 个质点, 将算子 b 想象为相邻质点两两“碰撞”。

性质 1.2.4. 记号同之前, 则 Bar -复形

$$B_\bullet A \rightarrow A \rightarrow 0$$

是 A 的投射消解。

证明. 对任意 $n \geq 0$, $B_n A = A \otimes A^{\otimes n} \otimes A$ 是投射 K -模 (这是因为由最初的假定, A 是投射 K -模, 从而其张量积也投射) 于是我们只需再验证该链复形是正合的。

为此, 我们构造链同伦

$$\begin{aligned}
h : B_{n-2} A &\rightarrow B_{n-1} A \quad (n \geq 1, B_{-1} A = A) \\
a_0 \otimes \dots \otimes a_n &\mapsto 1 \otimes a_0 \otimes \dots \otimes a_n
\end{aligned}$$

只需验证 $hb + bh = 1$, 之后与性质 1.1.5 的证明类似。

注意到对于任意 $n \geq 0$, 成立

$$\begin{aligned}
bh(a_0 \otimes \dots \otimes a_n) &= b(1 \otimes a_0 \otimes \dots \otimes a_n) \\
&= a_0 \otimes \dots \otimes a_n - \sum_{k=0}^{n-1} 1 \otimes a_0 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \\
&= a_0 \otimes \dots \otimes a_n - 1 \otimes b(a_0 \otimes \dots \otimes a_n) \\
&= (1 - hb)a_0 \otimes \dots \otimes a_n
\end{aligned}$$

因此 $bh + hb = 1$ ，证毕。 □

定义 1.2.5. 设 M 为双 A -模，定义 **Hochschild** 链复形

$$\begin{aligned} C_\bullet(A, M) &:= M \otimes_{A^e} B_\bullet A \\ \cdots M \otimes A^{\otimes 3} &\rightarrow M \otimes A^{\otimes 2} \rightarrow M \otimes A \rightarrow M \end{aligned}$$

方便起见，该链复形的边缘算子仍记作 b 。

则易知 M 的 Hochschild 同调无非是 Hochschild 链复形的同调：

$$H_n(A, M) = H_n(C_\bullet(A, M))$$

注意到有双 A -模同构

$$C_n(A, M) = M \otimes_{A^e} (A \otimes A^{\otimes n} \otimes A) \cong M \otimes A^{\otimes n}$$

在此同构意义下，容易验证 $C_\bullet(A, M)$ 的边缘算子 b 有如下显示表达：

对任意 $m \in M$ ，以及 $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ ，成立

$$\begin{aligned} b(m \otimes (a_1 \otimes \dots \otimes a_n)) &= m \otimes_{A^e} (b(1 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_n \otimes 1)) \\ &= m \otimes_{A^e} [a_1 \otimes \dots \otimes a_n \otimes 1 \\ &\quad + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k 1 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \otimes 1 \\ &\quad + (-1)^n 1 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_n] \\ &= (m \cdot a_1) \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_n \\ &\quad + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k m \otimes a_1 \otimes \dots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \dots \otimes a_n \\ &\quad + (-1)^n (a_n \cdot m) \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_{n-1} \end{aligned}$$

Hochschild 链复形的边缘算子的显式表达与 Bar-复形非常相似，从上式最右边的前两项可以看出：区别在于上式最右边的第三项。

1.3 Hochschild 上同调

对于双 A -模 M ，既然我们已经考虑余中心 $M \otimes_{A^e} A$ ，那么我们自然也会去考虑 $\text{Hom}_{A^e}(A, M)$ 。我们称双 A -模 $\text{Hom}_{A^e}(A, M)$ 为 M 的**导出中心**（derived center）。

性质 1.3.1.（导出中心的结构）对于双 A -模 M ，则有双 A -模同构

$$\text{Hom}_{A^e}(A, M) \cong \{m \in M \mid a \cdot m - m \cdot a = 0 \ \forall a \in A\}$$

容易验证 $\{m \in M | a.m - m.a = 0 \ \forall a \in A\}$ 为 M 的双 A -子模。粗俗地说，该子模由“与 A 中所有元素交换”的元素构成，故谓之“中心”。

证明. 对于任意的 $\varphi \in \text{Hom}_{A^e}(A, M)$ 以及 $a \in A$ ，则 $\varphi(a)$ 的取值由 $\varphi(1)$ 完全决定：

$$\varphi(a) = \varphi(a.1) = a.\varphi(1)$$

而另一方面，

$$\varphi(a) = \varphi(1.a) = \varphi(1).a$$

从而有 $a.\varphi(1) = \varphi(1).a$ 。于是我们可以构造如下双 A -模同态：

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{A^e}(A, M) &\rightarrow \{m \in M | a.m - m.a = 0 \ \forall a \in A\} \\ \varphi &\mapsto \varphi(1) \end{aligned}$$

容易验证该模同态为同构。证毕。 □

然后我们考虑 $\text{Hom}(-, M)$ 的导出函子，自然地去定义如下：

定义 1.3.2. (*Hochschild* 上同调)

对于双 A -模 M ，以及 $n \geq 0$ ，定义 M 的第 n 个 *Hochschild* 上同调

$$H^n(A, M) = \text{Ext}_{A^e}^n(A, M)$$

特别地，我们记

$$H^n(A) = \text{Ext}_{A^e}^n(A, A)$$

由定义知， M 的第 0 个 *Hochschild* 上同调为 $\text{Hom}_{A^e}(A, M)$ ，是 M 的导出中心。回顾 Bar-复形，我们考虑如下的 **Hochschild** 上链复形

$$C^\bullet(A, M) = \text{Hom}_{A^e}(B_\bullet A, M)$$

该上链复形的微分算子 ∂ 由 Bar-复形 $B_\bullet A$ 的边缘算子 b 所诱导。则 M 的 *Hochschild* 上同调满足

$$H^n(A, M) = H^n(C^\bullet(A, M), \partial) = H^n(\text{Hom}_{A^e}(B_\bullet A, M), \partial)$$

注意有自然的双 A -模同构

$$C^n(A, M) = \text{Hom}_{A^e}(A \otimes A^{\otimes n} \otimes A, M) \cong \text{Hom}(A^{\otimes n}, M)$$

(即取值于 M 的 n 重 K -线性映射) 于是对于任意的 $\varphi \in C^n(A, M) = \text{Hom}(A^{\otimes n}, M)$ ，容易知道 $\partial\varphi \in \text{Hom}(A^{\otimes n+1}, M)$ 具有如下显式表达：对任意 $a_0, a_1, \dots, a_m \in A$ ，

$$\begin{aligned} \partial\varphi(a_0, a_1, \dots, a_n) &= a_0.\varphi(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ &\quad - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \varphi(a_0, \dots, (a_k a_{k+1}), \dots, a_n) \\ &\quad - (-1)^n \varphi(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}).a_n \end{aligned}$$

接下来讨论 Hochschild 上同调的几何意义。我们已经知道第 0 个 Hochschild 上同调为 M 的导出中心；现在我们看 $H^1(A, M)$ ，我们将发现它是 A 的取值于 M 的外导子。

回顾导子 (derivation) 的概念如下：

定义 1.3.3. (导子) 对于双 A -模 M , K -线性映射

$$D : A \rightarrow M$$

称为 A 的取值于 M 的导子 (derivation), 如果对任意的 $a_1, a_2 \in A$, 成立

$$D(a_1 a_2) = D(a_1) \cdot a_2 + a_1 \cdot D(a_2)$$

对于 $m \in M$ 我们定义

$$\begin{aligned} \text{ad}_m : A &\rightarrow M \\ a &\mapsto [m, a] := m \cdot a - a \cdot m \end{aligned}$$

则容易验证 ad_m 为 A 的取值于 M 的导子, 称形如这样的导子为内导子 (inner derivation)。

我们记

$$\text{Der}(A, M) := \{D : A \rightarrow M \mid D \text{ 为导子}\}$$

$$\text{Inn}(A, M) := \{\text{ad}_m \mid m \in M\} \subseteq \text{Der}(A, M)$$

注意 $\text{Inn}(A, M)$ 与 $\text{Der}(A, M)$ 都有显然的 K -模结构, 且前者是后者的 K -子模。

性质 1.3.4. ($\text{HH}^1(A, M)$ 的结构)

对于双 A -模 M , 成立

$$\text{HH}^1(A, M) \cong \frac{\text{Der}(A, M)}{\text{Inn}(A, M)}$$

我们称上式右边的集合当中的元素为 A 的取值于 M 的外导子 (outer derivation)。

证明. 只需考虑 Hochschild 上链复形

$$C^0(A, M) \xrightarrow{\partial^0} C^1(A, M) \xrightarrow{\partial^1} C^2(A, M) \rightarrow \dots$$

我们只需具体计算之。对于 $\varphi \in C^1(A, M) \cong \text{Hom}(A, M)$, 则 $\partial^1 \varphi \in C^2(A, M) \cong \text{Hom}(A^{\otimes 2}, M)$ 满足: 对任意 $a_1, a_2 \in A$, 成立

$$\partial^1 \varphi(a_1, a_2) = a_1 \cdot \varphi(a_2) - \varphi(a_1 a_2) + \varphi(a_1) \cdot a_2$$

可见 $\varphi \in \ker \partial^1$ 当且仅当 $\varphi \in \text{Der}(A, M)$. 也就是说 $\ker \partial^1 = \text{Der}(A, M)$.

另一方面, 对于 $m \in C^0(A, M) \cong M$, 以及 $a \in A$, 成立

$$(\partial^0 m)(a) = a \cdot m - m \cdot a = -\text{ad}_m(a)$$

因此 $\ker \partial^0 \cong \text{Inn}(A, M)$. 从而

$$\text{HH}^1(A, M) = \frac{\ker \partial^1}{\text{Im } \partial^0} \cong \frac{\text{Der}(A, M)}{\text{Inn}(A, M)}$$

□

特别地, 当 $M = A$ 时,

$$\text{HH}^1(A) = \text{Der}(A, A) / \text{Inn}(A, A)$$

注意到 $\text{Der}(A, A)$ 上面还有更多的结构: 对于 $\forall D_1, D_2 \in \text{Der}(A, A)$, 定义

$$[D_1, D_2] := D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1 : A \rightarrow A$$

容易验证 $[D_1, D_2]$ 仍然为 A 的导子, 并且 $[-, -]$ 为 $\text{Der}(A, A)$ 上的李括号 (Lie bracket)。

另外容易验证

$$[\text{Der}(A, A), \text{Inn}(A, A)] \subseteq \text{Inn}(A, A)$$

具体地, 对于 $D \in \text{Der}(A, A)$ 以及 $m \in M$, 成立

$$[D, \text{ad}_m] = \text{ad}_{D(m)}$$

也就是说 $\text{Inn}(A, A)$ 是 $\text{Der}(A, A)$ 的理想。于是 $[-, -]$ 诱导了 $\text{HH}^1(A) = \frac{\text{Der}(A, A)}{\text{Inn}(A, A)}$ 上的李括号结构。

如果 A 是交换 K -代数, 则 $\text{Inn}(A, A) = 0$ 。于是

$$\text{HH}^1(A) \cong \text{Der}(A, A)$$

可被认为是“切向量场”(此时 A 被认为是“函数环”)。

我们再去考虑 $\text{HH}^2(A, M)$. 对于任意的

$$\varphi \in C^2(A, M) = \text{Hom}(A^{\otimes 2}, M)$$

则对 $a_0, a_1, a_2 \in A$, 成立

$$\partial\varphi(a_0, a_1, a_2) = a_0 \cdot \varphi(a_1, a_2) - \varphi(a_0 a_1, a_2) + \varphi(a_0, a_1 a_2) - \varphi(a_0, a_1) \cdot a_2$$

引理 1.3.5. 对于双 A -模 M , 以及 $\varphi \in C^2(A, M) = \text{Hom}(A^{\otimes 2}, M)$, 我们令

$$\hat{A} := A \oplus M$$

并赋以如下的 K -代数结构: 对于任意 $a_1, a_2 \in A$ 以及 $m_1, m_2 \in M$, 规定 \hat{A} 的乘法 $\hat{\bullet}_\varphi$ 为

$$(a_1 \oplus m_1) \hat{\bullet}_\varphi (a_2 \oplus m_2) := a_1 a_2 \oplus [a_1 \cdot m_2 + m_1 \cdot a_2 + \varphi(a_1, a_2)]$$

那么 $(\hat{A}, \hat{\bullet}_\varphi)$ 为结合代数, 当且仅当 $\partial\varphi = 0$.

证明. 这是简单的计算验证. 对于任意的 $a_0, a_1, a_2 \in A$ 以及 $m_0, m_1, m_2 \in M$, 直接计算之,

$$\begin{aligned} & [(a_0 \oplus m_0) \hat{\bullet}_\varphi (a_1 \oplus m_1)] \hat{\bullet}_\varphi (a_2 \oplus m_2) \\ &= a_0 a_1 a_2 \oplus [a_0 a_1 \cdot m_2 + a_0 \cdot m_1 \cdot a_2 + m_0 \cdot a_1 a_2 + \varphi(a_0, a_1) \cdot a_2 + \varphi(a_0 a_1, a_2)] \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} & (a_0 \oplus m_0) \bullet_\varphi [(a_1 \oplus m_1) \bullet_\varphi (a_2 \oplus m_2)] \\ = & a_0 a_1 a_2 \oplus [a_0 a_1 \cdot m_2 + a_0 \cdot m_1 \cdot a_2 + m_0 \cdot a_1 a_2 + a_0 \cdot \varphi(a_1, a_2) + \varphi(a_0, a_1 a_2)] \end{aligned}$$

因此 \bullet_φ 满足结合性，当且仅当

$$\varphi(a_0, a_1) \cdot a_2 + \varphi(a_0 a_1, a_2) = a_0 \cdot \varphi(a_1, a_2) + \varphi(a_0, a_1 a_2)$$

而此式等价于 $\partial\varphi = 0$. □

注意到在 \hat{A} 当中，对任意的 $m_1, m_2 \in M$ ，以及任意 $\varphi \in C^2(A, M)$ ，总有 $m_1 \bullet_\varphi m_2 = 0$ 。于是我们不妨将 “ $A \oplus M$ ” 当中的 “ M ” 理解为 “一阶小量”。我们考虑 $\varphi = 0$ 时 $\hat{A}_0 := A \oplus M$ 的代数结构

$$(a_1 \oplus m_1) \bullet (a_2 \oplus m_2) := a_1 a_2 \oplus (a_1 \cdot m_2 + m_1 \cdot a_2)$$

显然 (\hat{A}_0, \bullet) 为结合代数。若 $\partial\varphi = 0$ ，则结合代数 $(\hat{A}, \bullet_\varphi)$ 为 (\hat{A}_0, \bullet) 的一阶形变，而 φ 为其 “形变参数”。

从而 M 的第 2 个 Hochschild 上同调

$$H^2(A, M) \cong \frac{\{\varphi | (\hat{A}, \bullet_\varphi) \text{ 是结合代数}\}}{\text{Im}(\partial : C^1(A, M) \rightarrow C^2(A, M))}$$

商掉的东西 ($\text{Im } \partial$) 为形如以下的一类特殊的一阶形变：

$$\begin{aligned} \varphi_f : A \otimes A & \rightarrow M \\ a_1 \otimes a_2 & \mapsto a_1 \cdot f(a_2) + f(a_1) \cdot a_2 - f(a_1 a_2) \end{aligned}$$

其中 $f \in C^1(A, M) = \text{Hom}(A, M)$ ， $\varphi_f = \partial f$ 。

我们考察一个 Hochschild 上同调的具体算例。

性质 1.3.6. 若 $A = \mathbb{C}[x^1, \dots, x^n]$ 为 \mathbb{C} 上的 n 元多项式环，则

$$\text{HH}^k(A) \cong \text{Hom}\left(\bigwedge^k(\mathbb{C}^n), A\right)$$

证明. 对于这个特例，采用 Koszul 复形计算更佳简便。有关记号同性质 1.2.2 的证明过程。考虑 Koszul 复形

$$\mathcal{K}_A : \dots \xrightarrow{\partial} A^e \otimes \bigwedge^{k+1}(\mathbb{C}^n) \xrightarrow{\partial} A^e \otimes \bigwedge^k(\mathbb{C}^n) \xrightarrow{\partial} A^e \otimes \bigwedge^{k-1}(\mathbb{C}^n) \xrightarrow{\partial} \dots$$

然后将函子 $\text{Hom}_{A^e}(-, A)$ 作用于之上。注意到有 \mathbb{C} -线性同构

$$\begin{aligned} & \text{Hom}_{A^e}\left(A^e \otimes \bigwedge^k(\mathbb{C}^n), A\right) \\ \cong & \text{Hom}\left(\bigwedge^k(\mathbb{C}^n), \text{Hom}_{A^e}(A^e, A)\right) \\ \cong & \text{Hom}\left(\bigwedge^k(\mathbb{C}^n), A\right) \end{aligned}$$

此外再注意到，上链复形 $\text{Hom}_{A^e}(\mathcal{K}_A, A)$ 的微分算子 $d := \text{Hom}_{A^e}(\partial, A) = 0$. 这是因为对于 $\varphi \in \text{Hom}_{A^e}(A^e \otimes \wedge^k(\mathbb{C}^n), A)$, $\omega \in \wedge^{k+1}(\mathbb{C}^n)$ 以及 $f \in A^e$, 成立

$$d\varphi(f \otimes \omega) = \varphi(\partial(f \otimes \omega))$$

回顾 Koszul 复形边缘算子运算规则

$$\partial : \eta^i \mapsto x^i - y^i \in A^e$$

又由于 φ 为 A^e -模同态，从而对于任意 $\tilde{\omega} \in \wedge^k(\mathbb{C}^n)$, 成立

$$\varphi(x^i \otimes \tilde{\omega}) = x^i \cdot \varphi(1 \otimes \tilde{\omega}) = \varphi(1 \otimes \tilde{\omega}) \cdot x^i = \varphi((x^i)^{\text{op}} \otimes \tilde{\omega}) = \varphi(y^i \otimes \tilde{\omega})$$

也就是说 $\varphi((x^i - y^i) \otimes \tilde{\omega}) = 0$. 由此可见 $d = 0$. 综上可知

$$\text{HH}^k(A) \cong \text{Hom}\left(\wedge^k(\mathbb{C}^n), A\right)$$

□

注意到 $\text{Hom}\left(\wedge^k(\mathbb{C}^n), A\right)$ 之中的元素形如

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} f_{i_1 \dots i_k} \partial_{i_1} \wedge \dots \wedge \partial_{i_k}$$

回顾 $\text{HH}_\bullet(A)$ 中的元素可被认为是“微分形式”，可见 $\text{HH}^\bullet(A)$ 中的元素则是“多重切向量场”。

1.4 Hochschild (上) 同调的例子

定义 1.4.1. (约化 Bar-复形) (*reduced Bar-complex*)

对于 K -代数 A , 则视 K 为 A 的 K -子模, 并且令 K -模

$$\bar{A} := A/K$$

我们定义如下的约化 Bar-复形 $(\bar{B}_\bullet A, b)$:

$$\bar{B}_n A := A \otimes \bar{A}^{\otimes n} \otimes A \quad \forall i \geq 0$$

边缘算子 $b : \bar{B}_n A \rightarrow \bar{B}_{n-1} A$ 如下定义:

$$\begin{aligned} b(a_0 \otimes (\bar{a}_1 \otimes \dots \otimes \bar{a}_n) \otimes a_{n+1}) &:= (a_0 a_1) \otimes (\bar{a}_2 \otimes \dots \otimes \bar{a}_n) \otimes a_{n+1} \\ &+ \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i a_0 \otimes (\bar{a}_1 \otimes \dots \otimes (\bar{a}_i a_{i+1}) \otimes \dots \otimes \bar{a}_n) \otimes a_{n+1} \\ &+ (-1)^n a_0 \otimes (\bar{a}_1 \otimes \dots \otimes \bar{a}_{n-1}) \otimes (a_n a_{n+1}) \end{aligned}$$

注意到 $\bar{B}_\bullet A$ 是 $B_\bullet A$ 的商模:

$$\bar{B}_n A = \frac{B_n A}{\{a_0 \otimes (a_1 \otimes \dots \otimes a_{i-1} \otimes 1 \otimes a_{i+1} \otimes \dots \otimes a_n) \otimes a_{n+1}\}}$$

容易发现约化 Bar-复形的“ b ”正是 Bar-复形的 b . 但是我们要验证 b 的良好性, 即与代表元选取无关。这是容易验证的。进而, 我们可以由约化 Bar-复形构造 A 的投射消解:

$$\overline{B}_\bullet A \rightarrow A \rightarrow 0$$

与之前 Bar-复形完全类似, 我们容易验证此复形也是正合的。只需构造同伦算子

$$\begin{aligned} h: \overline{B}_{n-1} A &\rightarrow \overline{B}_n A \\ a_0 \otimes (\overline{a_1} \otimes \cdots \otimes \overline{a_{n-1}}) \otimes a_n &\mapsto 1 \otimes (\overline{a_0} \otimes \overline{a_1} \otimes \cdots \otimes \overline{a_n}) \otimes a_{n+1} \end{aligned}$$

验证 $bh + hb = 1$ 即可。

定义 1.4.2. (约化 Hochschild (上) 链复形)

对于双 A -模 M , 我们令

$$\begin{aligned} \overline{C}_\bullet(A, M) &:= M \otimes_{A^e} \overline{B}_\bullet A \cong M \otimes \overline{A}^{\otimes \bullet} \\ \overline{C}^\bullet(A, M) &:= \text{Hom}_{A^e}(\overline{B}_\bullet A, M) \cong \text{Hom}(\overline{A}^{\otimes \bullet}, M) \end{aligned}$$

称之为关于 M 的约化 Hochschild (上) 链复形。

由于约化 Bar-复形也是 A 的投射消解, 从而我们也可以由约化 Hochschild (上) 链复形来计算 Hochschild (上) 同调:

$$\begin{aligned} H_\bullet(\overline{C}_\bullet(A, M)) &= H_\bullet(A, M) \\ H^\bullet(\overline{C}^\bullet(A, M)) &= H^\bullet(A, M) \end{aligned}$$

关于 (约化) Bar-复形, 我们还有另一种理解方式: 关于 A 的 (约化) Bar-复形是 A 与某个微分分次代数的自由乘积。

定义 1.4.3. (微分分次代数)

\mathbb{Z} -分次 K -代数

$$A := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n$$

称为微分分次代数 (differential graded algebra), 若它配以 K -线性算子 $d: A \rightarrow A$, 并且满足:

$$\begin{cases} d(A_n) \subseteq A_{n+1} & \forall n \in \mathbb{Z} \\ d^2 = 0 \\ d(\alpha\beta) = (d\alpha)\beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha(d\beta) & \forall \alpha, \beta \in A, \text{ 并且 } \alpha \text{ 是齐次元} \end{cases}$$

对于微分分次代数 (A, d) , 由于 A 的分次以及 $d^2 = 0$, 从而自然有上链复形

$$\cdots \rightarrow A_{-1} \xrightarrow{d} A_0 \xrightarrow{d} A_1 \rightarrow \cdots$$

我们将此上链复形也记为 (A, d) .

微分分次代数最直接的例子是, 对于光滑流形 X , 考虑 $A := \Omega^\bullet(X)$ 为 X 上的微分形式。 A 上的乘法即为微分形式的外积 \wedge , 微分结构即为外微分 d 。

我们可以适当修改微分分次代数的定义, 将条件 “ $d(A_n) \subseteq A_{n+1}$ ” 改为 “ $d(A_n) \subseteq A_{n-1}$ ”, 此时的微分算子我们习惯记为 “ ∂ ”。对于这样的微分分次代数 (A, ∂) , 它可以被视为链复形。

例子 1.4.4. 我们考虑如下 K -代数:

$$A := K[\varepsilon] := K \oplus K\varepsilon \oplus K\varepsilon^2 \oplus \cdots$$

其中 ε 为形式变量, 并且规定 $\deg \varepsilon = 1$, 由此诱导出 $K[\varepsilon]$ 的分次结构。其微分算子 ∂_ε 由以下诱导:

$$\partial_\varepsilon(1) = 0 \quad \partial_\varepsilon(\varepsilon) = 1$$

注意 $\deg \varepsilon = 1$, 按照微分代数的定义可计算出

$$\partial_\varepsilon(\varepsilon^2) = \partial_\varepsilon(\varepsilon)\varepsilon + (-1)^{\deg \varepsilon} \varepsilon \partial_\varepsilon(\varepsilon) = \varepsilon - \varepsilon = 0$$

一般地, 对于非负整数 n 我们有

$$\partial_\varepsilon(\varepsilon^n) = \begin{cases} 0 & n \text{ 为偶数} \\ \varepsilon^{n-1} & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

从而链复形 $(K[\varepsilon], \partial_\varepsilon)$:

$$\cdots \rightarrow K\varepsilon^4 \xrightarrow{0} K\varepsilon^3 \xrightarrow{1} K\varepsilon^2 \xrightarrow{0} K\varepsilon \xrightarrow{1} K \rightarrow 0$$

是正合的。其中 $1: K\varepsilon^{2n+1} \rightarrow K\varepsilon^{2n}$ 将 ε^{2n+1} 映为 ε^{2n} 。

众所周知, 对于两个 K -代数 A, B , 我们可以谈论它们的自由乘积 (free product) $A * B$ 。若 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A_i$ 是微分分次代数, 其微分算子为 d , 则容易知道 $A * B$ 自然也有微分分次代数结构:

$$\begin{cases} \deg b = 0 & \forall b \in B \\ \deg a = n & \forall a \in A_n \subseteq A \\ db = 0 & \forall b \in B \end{cases}$$

容易知道 $A * B$ 中的 N 次齐次元必形如以下元素的有限和:

$$b_1 a_1 b_2 a_2 \cdots b_m a_m b_{m+1} \quad (b_i \in B, a_i \in A_{n_i}, \sum_{i=1}^m n_i = N)$$

性质 1.4.5. 对于 K -代数 A , 则有链复形的同构

$$(B_\bullet A \rightarrow A, b) \cong (A * K[\varepsilon], \partial_\varepsilon)$$

其中 $(K[\varepsilon], \partial_\varepsilon)$ 为例子 1.4.4 当中的微分分次代数, 视为链复形; 同构映射为

$$\begin{aligned} \varphi_n: B_n A &\rightarrow (A * K[\varepsilon])_n \\ a_0 \otimes (a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) \otimes a_{n+1} &\mapsto a_0 \varepsilon a_1 \varepsilon a_2 \cdots \varepsilon a_n \varepsilon a_{n+1} \end{aligned}$$

这给出了 Bar-复形的又一种理解方式。

证明. 容易验证 φ_n 为 K -模同构, 且逆映射 φ_n^{-1} 由以下诱导:

$$\varepsilon^n \mapsto \underbrace{1\varepsilon 1\varepsilon 1 \cdots 1\varepsilon 1}_{n \uparrow \varepsilon}$$

然后只需验证 $\varphi_\bullet : (B_\bullet \rightarrow A, b) \rightarrow (A * K[\varepsilon], \partial_\varepsilon)$: 是链映射, 也就是要验证交换关系 $\varphi \circ b = \partial_\varepsilon \circ \varphi$

$$\begin{array}{ccc} B_n A & \xrightarrow{b} & B_{n-1} A \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi \\ (K[\varepsilon] * A)_n & \xrightarrow{\partial_\varepsilon} & (K[\varepsilon] * A)_{n-1} \end{array}$$

而这容易验证, 验证如下:

$$\begin{aligned} & \varphi \circ b(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes a_{n+1}) \\ &= \varphi \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k a_0 \otimes \cdots \otimes (a_k a_{k+1}) \otimes \cdots \otimes a_{n+1} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k a_0 \varepsilon a_1 \varepsilon \cdots \varepsilon a_{n+1} \\ &= \partial_\varepsilon(a_0 \varepsilon a_1 \varepsilon \cdots \varepsilon a_n \varepsilon a_{n+1}) \\ &= \partial_\varepsilon \circ \varphi(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes a_{n+1}) \end{aligned}$$

□

我们还可以考虑 $(K[\varepsilon], \partial_\varepsilon)$ 的商代数 $K[\varepsilon]/\varepsilon^2$, 易知 $(K[\varepsilon]/\varepsilon^2, \partial_\varepsilon)$ 也构成微分分次代数, 从而也通过微分算子 ∂_ε 视为链复形. 在此代数中, $\varepsilon^2 = 0$.

类似地, 我们可以给出约化 Bar-复形的另一种理解方式:

性质 1.4.6. 对于 K -代数 A , 则有链复形同构

$$(\overline{B}_\bullet A \rightarrow A, b) \cong (A * K[\varepsilon]/\varepsilon^2, \partial_\varepsilon)$$

只需注意到 $A * K[\varepsilon]/\varepsilon^2$ 当中的 n 次齐次元必形如以下元素的有限和:

$$a_0 \varepsilon a_1 \varepsilon \cdots \varepsilon a_n \varepsilon a_{n+1} \quad (a_i \in A)$$

证明. 完全类似. 事实上此链复形同构映射由 $\varphi_n : B_n A \rightarrow (A * K[\varepsilon])_n$ 诱导, 其良定性由下式保证: 对任意 $1 \leq i \leq n$,

$$\begin{aligned} & \varphi_n(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{i-1} \otimes 1 \otimes a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) \\ &= a_0 \varepsilon a_1 \cdots a_{i-1} \varepsilon 1 \varepsilon a_{i+1} \cdots \varepsilon a_{n+1} \\ &= a_0 \varepsilon a_1 \cdots a_{i-1} 1 \varepsilon^2 a_{i+1} \cdots \varepsilon a_{n+1} \\ &= 0 \pmod{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

□

本节最后简单介绍以下 Hochschild (上) 同调与其它常见的 (上) 同调理论的关系。

例子 1.4.7. (群的上同调)

设 G 是一个群, $M \in \text{Rep}(G)$ 为群 G 的一个左 K -表示, 则有 G -模链复形

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\delta} C^1(G, M) \xrightarrow{\delta} C^2(G, M) \xrightarrow{\delta} \dots$$

其中

$$C^n(G, M) := \text{Hom}(G^n, M) = \{f : G^n \rightarrow M\}$$

并且微分算子 δ 满足

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \delta(m)(g) & = & g.m - m \\ (\delta f)(g_0, g_1, \dots, g_n) & = & g_0.f(g_1, g_2, \dots, g_n) \\ & & - \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k f(g_1, \dots, g_k g_{k+1}, \dots, g_n) \\ & & - (-1)^n f(g_0, g_1, \dots, g_{n-1}) \end{array} \right.$$

容易验证 $\delta^2=0$. 此链复形的上同调

$$H^\bullet(G, M) := H^\bullet(C^\bullet(G, M), \delta)$$

称之为群的上同调 (*group cohomology*)

由 δ 的表达式容易看出, 群的上同调与 Hochschild 上同调有以下关系:

性质 1.4.8. 设 G 是一个群, M 为群 G 的一个左 K -模, 考虑群代数 $A := K[G]$, 于是 M 自然有左 A -模结构。那么有同构:

$$H^\bullet(G, M) \cong H^\bullet(K[G], M)$$

其中左边为群 G 关于 M 的上同调, 右边为群代数 $K[G]$ 关于 M 的 *Hochschild* 上同调。

注意 M 仅仅是左 $K[G]$ -模, 并没有双 $K[G]$ -模结构呀, 怎么谈论 Hochschild 上同调?

(强行规定 G 在 M 上的右作用恒为 1, 通过 K -线性扩张得到 $K[G]$ 在 M 的右作用, 这样就得到 M 的双 $K[G]$ -模结构了。)

证明. 注意到 $\text{Hom}(G^n, M)$ 中的元素可以自然地 K -线性延拓为 $\text{Hom}(K[G]^n, M)$ 中的元素, 这给出它们之间的同构。然后注意到 $A = K[G]$ 的 Hochschild 上链复形的微分算子的显式表达式, (见定义 1.3.2 的下方) 它与群上同调相应的上链复形的微分算子显式表达式“相同”。细节从略。 \square

若熟悉李代数同调, 我们可以将李代数同调与其泛包络代数的 Hochschild 同调联系起来:

例子 1.4.9. (李代数同调) 对于李代数 \mathfrak{g} , M 为李代数 \mathfrak{g} 的一个左 K -模。令 $A := \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 为 \mathfrak{g} 的泛包络代数, 则 A 自然有左 A -模结构。(再通过某种“比较平凡”的方式给出右作用? 与上例类似?) 则有同构

$$H_\bullet(\mathcal{U}(\mathfrak{g}), M) \cong H_\bullet^{\text{Lie}}(\mathfrak{g}, M)$$

其中左边是 A 关于 M 的 *Hochschild* 同调, 右边是李代数同调。

并没有在此叙述李代数同调的定义。留给感兴趣者。此处从略。

事实上, 也可以考虑群的同调、李代数上同调, 它们也有对应的 Hochschild 同调、上同调。

1.5 循环同调

$\mathrm{HH}_\bullet(A) \rightsquigarrow$ noncommutative differential forms.

$B \leftarrow -$ de rham

cyclic group action

$$C_\bullet(A, A) = C_\bullet(A) = A \otimes A$$

$$C_n(A) = A^{\otimes n+1}$$

we consider the $\mathbb{Z}/(n+1)\mathbb{Z}$ acting on $C_n A$,

$$\lambda : C_n(A) \rightarrow C_n(A)$$

$$a_0 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_n \mapsto (-1)^n a_n \otimes a_0 \otimes \dots \otimes a_{n-1}$$

then λ is generator,

$$\lambda^{n+1} = (-1)^{n(n+1)} = 1$$

Let

$$C_\bullet^\lambda(A) := C_\bullet(A)/(1 - \lambda)$$

cyclic co-invariant.

性质 1.5.1. *Hochschild differential b (on $C_\bullet(A)$) induces a differential on $C_\bullet(A)/(1 - \lambda)$*

证明. Let us define

$$b' : C_\bullet(A) \rightarrow C_{\bullet-1}(A)$$

$$b'(a_0 \otimes \dots \otimes a_n) = a_0 a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \pm \dots \pm a_0 \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_{n-1} a_n$$

$$((C_\bullet(A), b') = (B_\bullet A \rightarrow A))$$

claim that

$$(1 - \lambda)b' = b(1 - \lambda)$$

$$[b, \lambda] = (1 - \lambda)(b - b')$$

In particular, $b : \mathrm{Im}(1 - \lambda) \mapsto \mathrm{Im}(1 - \lambda)$

”proof”:

□

so, b acts on $C_\bullet^\lambda(A) = C_\bullet(A)/(1 - \lambda)$, called **Connes' complex**

$$H_\bullet^\lambda(A) = H_\bullet(C_\bullet^\lambda(A), b)$$

Introduce

$$\mathcal{N} : C_n(A) \rightarrow C_n(A)$$

性质 1.5.2.

$$b'\mathcal{N} = Nb$$

we have an exact sequence

定义 1.5.3. the cyclic bi-complex $CC_\bullet(A)$

Let $\text{Tot}(CC_\bullet(A))$ be the total complex of $CC_\bullet(A)$ with a natural map of complexes

$$\text{Tot}(CC_\bullet(A)) \rightarrow C_\bullet^\lambda(A)$$

is a quasi-isomorphism.

$$HC_\bullet(A) := H_\bullet(\text{Tot}(CC_\bullet(A))) \cong H_\bullet^\lambda(A)$$

Intuitively, we can delete "exact sequence" and get rid of 蓝色框框,

1.6 始有一如，独一之神，其名在阿尔达称为伊露维塔。

Cyclic v.s. de Rham

Last time "Cyclic homology"

$$\lambda : a_0 \otimes \dots \otimes a_n \mapsto (-1)^n a_n \otimes a_1 \otimes \dots \otimes a_{n+1}$$

$$H_\bullet^\lambda(A) = H_\bullet(C_\bullet(A)/(1-\lambda), b)$$

$$\mathcal{N} : C_n(A) \rightarrow C_n(A)$$

$$\mathcal{N} = 1 + \lambda + \dots + \lambda^n$$

$$HC_\bullet(A) = \text{Tot}(\text{cyclic bi-complex})$$

Today:

性质 1.6.1.

$$B \circ b + b \circ B = 0$$

where B is Connes' operator

Easy to check.

$$(C_\bullet(A)[u^{-1}], b + uB)$$

$$C_\bullet(A)[u^{-1}] := C_\bullet(A) \oplus C_\bullet(A)u^{-1} \oplus C_\bullet(A)u^{-2} \oplus \dots$$

性质 1.6.2.

$$H_{\bullet}^{\lambda}(A) \cong H_{\bullet}(C_{\bullet}(A)[u^{-1}], b + uB)$$

$$(b + uB)^2 = 0$$

$$\deg(b) = -1, \quad \deg(B) = 1, \quad \deg(u) = -2$$

where u is a formal variable.

注记 1.6.3. (Geometry anelogue) **Hodge theory**

A complex m.f.d., X , complex(or algebraic) geometry, has an operator $\bar{\partial}$;
topology: consider de-rham operator $d = \partial + \bar{\partial}$.

Consider $d_u := \bar{\partial} + u\partial$, called "Hodge filtration". A bridge between "topology" and "complex geometry".
"Stability condition".

Periodic cyclic homology

$$CC_{\bullet}^{per}(A) := (C_{\bullet}(A)((u)), b + uB)$$

$$H_{\bullet}(CC_{\bullet}^{per}(A), b + uB)$$

is called periodic cyclic homology.

negative cyclic homology

$$CC_{\bullet}^{-}(A) := (C_{\bullet}(A)[u], b + uB)$$

$$CC_{\bullet}^{per} \rightsquigarrow \text{de rham homology} \rightsquigarrow \text{open-closed string states}$$

$$CC_{\bullet}(A) \rightsquigarrow \text{open string states} \rightleftarrows \text{gauge theory}$$

$$CC_{\bullet}^{-}(A) \rightsquigarrow \text{closed string states} \rightleftarrows \text{gravity}$$

Why "B" is like de-rham differential?

$$B : \overline{C}_n(A) \rightarrow \overline{C}_{n+1}(A)$$

$$a_0 \otimes \overline{a_1} \otimes \dots \otimes \overline{a_n} \mapsto \sum_i \pm 1 \otimes \overline{a_i} \otimes \dots \otimes \overline{a_n} \otimes \dots \otimes \overline{a_{i-1}}$$

$$H_{\bullet}(\overline{C}_{\bullet}(A)[u^{-1}], b + uB) \cong \text{cyclic homology of } A$$

例子 1.6.4. Consider $A = K$ as K -algebra. $\overline{A} = 0$. So,

$$\overline{A}_{\bullet} A = A \otimes "0"$$

$$b = 0 \quad B = 0$$

$$\bullet(A)[[u^{-1}]] \rightsquigarrow HC_n(K) = \begin{cases} K & n \geq 0 \text{ even} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$K, Ku^{-1}, Ku^{-2} \dots H_{\bullet}(\mathbb{C}P^{\infty} = B \cup (1))$$

$$C_{\bullet}^{\lambda}A = C_{\bullet}(K)/(1-\lambda)$$

$$C_n(K) : 1 \overbrace{\otimes 1 \otimes \dots \otimes 1}^n =: \varepsilon_n$$

$$\lambda(\varepsilon_n) = (-1)^n \varepsilon_n$$

$$\begin{cases} \varepsilon_{\text{even}} \text{ is cyclic invariant} \\ \varepsilon_{\text{odd}} = 0 \text{ in } C_{\bullet}^{\lambda}(K) \end{cases}$$

$$b(\varepsilon_{2m}) = \varepsilon_{2m-1}$$

$$0 = b \text{ acts on } C_{\bullet}^{\lambda}(K)$$

$$H_{\bullet}^{\lambda}(K) = C_{\bullet}^{\lambda}(K) = K\varepsilon_0 \oplus K\varepsilon_2 \oplus \dots$$

compute it by 3 ways...

例子 1.6.5. $A = K[x^i]$, then $HH_{\bullet}(A) = \Omega^{\bullet}(A) = \mathbb{C}[x^i, dx^i]$. Explicitly, we define

$$\Phi : \overline{C}_p(A) \rightarrow \Omega^p(A)$$

$$a_0 \otimes \overline{a_1} \otimes \dots \otimes \overline{A_p} \mapsto \frac{1}{p!} a_0 da_1 \wedge da_2 \wedge \dots \wedge da_p$$

Check: $\Phi \circ b = 0$. i. e.

$$\Phi : (\overline{C_{\bullet}(A)}, b) \rightarrow (\Omega^0(A), 0)$$

si a chain map.

So, we have an isomorphism

$$HH_{\bullet}(A) \cong \Omega^{\bullet}(A)$$

Check:

$$\Phi \circ B = d \circ \Phi$$

So,

$$\Phi : ((\overline{C})_{\bullet}(A), b, B) \rightarrow (\Omega^{\bullet}(A), 0, d)$$

Cyclic homology,

$$\Phi : ((\overline{C})_{\bullet}(A), b + uB) \rightarrow (\Omega^{\bullet}(A)[u^{-1}], u d)$$

If $A = K[x^i]$

$$\dots \xrightarrow{d} \Omega^\bullet(A) \xrightarrow{d} \Omega^\bullet(A) \xrightarrow{d} \Omega^\bullet(A) \rightarrow 0$$

then

$$H_\bullet(\Omega^\bullet(A), d) = H_0 = K$$

"Poincare lemma"

性质 1.6.6.

$$HC_\bullet(K[x^i]) = \frac{\Omega^\bullet(A)}{d\Omega^\bullet(A)} \oplus u^{-1}K[u^{-1}]$$

注记 1.6.7. Φ has a splitting

$$\eta : \Omega^\bullet(A) \rightarrow \overline{C}_\bullet(A)$$

$$a_0 da_1 \wedge da_2 \wedge \dots \wedge da_p \mapsto \sum_{\sigma \in S_p} (-1)^{|\sigma|} a_0 \otimes a_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes a_{\sigma(p)}$$

Check: $b \circ \eta = 0$.

So, $\eta : \Omega^\bullet(A) \rightarrow HH_\bullet(A)$ which is inverse of Φ .

Cyclic cohomology

$$C_n(A) \cong A^{\otimes n+1}$$

定义 1.6.8.

$$C^n(A) := \text{Hom}(A^{\otimes n+1}, K)$$

with $f \in C^n(A)$ is called cyclic invariant if

$$f(a_0, a_1, \dots, a_n) = (-1)^n f(a_n, a_0, \dots, a_{n-1})$$

cyclic cochains form a subcomplex

$$C_\lambda^n(A) \subseteq C^n(A)$$

which is dual to

$$C_n(A) \rightarrow C_n^\lambda(A)$$

$$b^* : C_\lambda^n(A) \rightarrow C_\lambda^{n+1}(A)$$

定义 1.6.9. Cyclic cohomology

$$H^\bullet(H_\lambda^\bullet(A), d^*) =: H_\lambda^\bullet(A) = HC^\bullet(A)$$

例子 1.6.10.

$$f \in C_\lambda^0(A) : A \rightarrow K$$

$$b^* f \in C_\lambda^1(A)$$

$$b^* f(a_0, a_1) = f(b(a_0 \otimes a_1)) = f(a_0 a_1 - a_1 a_0)$$

$$b^* = 0 \iff f : A/[A, A] \rightarrow K$$

f behaves like "trace". $HC^0(A) = \text{"trace operators"}$

Pairing M, N are bi-module, then there is a pairing

$$C^n(A, M) \otimes C_0(A, N) \rightarrow N \otimes_{A^e} M$$

So,

$$H^n(A, M) \otimes H_n(A, N) \rightarrow N \otimes_{A^e} M$$

$$H^n(A, A^*) \otimes H_n(A, A) \rightarrow A^* \otimes_{A^e} A \xrightarrow{ev} K$$

术语索引

Bar-复形, 8

cocenter 余中心, 4

derivation 导子, 12

derived center 导出中心, 10

differential graded algebra 微分分次代数, 16

exact 正合, 5

group cohomology 群的上同调, 19

Hochschild 同调, 6

Hochschild 上同调, 11

Hochschild 上链复形, 11

Hochschild 链复形, 10

inner derivation 内导子, 12

Lie bracket 李括号, 13

opposite algebra 反代数, 3

outer derivation 外导子, 12

projective module 投射模, 3

projective resolution 投射消解, 6

reduced Bar-complex 约化 Bar-复形, 15