

一、选择题

休克患者最典型的早期表现是？

- A. 血压升高
- B. 皮肤湿冷、面色苍白
- C. 呼吸深慢
- D. 脉搏有力

答案：B

解析：休克早期因血管收缩导致皮肤湿冷、苍白（文档症状描述）。

休克急救时，以下哪项措施正确？

- A. 让患者坐起以保持清醒
- B. 将双脚垫高超过心脏水平
- C. 给患者喂温水
- D. 拨打救护车后等待救援，不做任何处理

答案：B

解析：抬高下肢可促进血液回流，增加脑部供血（急救措施②）。

以下哪种情况不会导致休克？

- A. 大面积烧伤
- B. 急性心肌梗死
- C. 轻微擦伤
- D. 严重感染

答案：C

解析：轻微擦伤通常不会引发休克（文档列举的休克原因）。

二、填空题

休克患者应采取_____位，将双脚垫高至_____，以增加脑部供血。

答案：平卧；高于心脏水平

解析：平卧可减少耗氧，抬高下肢促进血液回流（急救措施②）。

休克急救中，若患者呼吸困难，应将头和肩部垫高约_____度，以保持呼吸道通畅。

答案：15-30

解析：适度抬高头部可缓解呼吸困难（急救措施③）。

休克患者需注意保暖，可用_____或_____覆盖，但禁止使用_____。

答案：毯子；被子；电热毯

解析：避免局部过热导致烫伤或血管扩张加重休克（急救措施④）。

三、判断题

() 休克患者应立即喂食糖水以补充能量。

答案：×

解析：休克时胃肠缺血，进食可能引发呕吐或窒息（文档未提及进食）。

() 休克患者若无外伤出血，可让其保持站立姿势等待救援。

答案：×

解析：站立会加重脑部缺血，必须平卧（急救措施①②）。

() 休克患者血压恢复正常后，可停止监测。

答案：×

解析：需持续监测直至救护车到达，防止病情反复（急救措施⑤）。

四、简答题

简述休克急救的核心步骤。

答案：

1. 步骤①：立即呼叫救护车，检查呼吸、脉搏及外伤出血；
2. 步骤②：平卧位，抬高双脚（高于心脏）；
3. 步骤③：保持呼吸道通畅（必要时垫高头部）；
4. 步骤④：保暖但避免局部加热；
5. 步骤⑤：持续监测生命体征，勿随意搬动患者。

为什么休克患者需要抬高下肢？

答案：

1. 下肢抬高可促进静脉血液回流至心脏，增加心脏输出量；
2. 改善脑部和重要器官的供血，延缓休克进展。