

《关节扭伤急救》测试题

一、选择题

关节扭伤后 24 小时内应采取的紧急处理是？

- A. 热敷消肿
- B. 冷敷减少出血
- C. 按摩活血
- D. 立即贴膏药

踝关节扭伤后，正确的抬高高度应为？

- A. 高于心脏水平
- B. 与心脏平齐
- C. 低于心脏水平
- D. 任意高度

扭伤后 48 小时内的禁忌行为是？

- A. 冷敷
- B. 热敷
- C. 休息
- D. 抬高患肢

膝关节扭伤后，怀疑半月板损伤应如何处理？

- A. 继续行走观察
- B. 立即冰敷并就医
- C. 自行按摩
- D. 热水泡脚

关节扭伤后，弹性绷带包扎的原则是？

- A. 越紧越好
- B. 松紧适度，不影响末端血运
- C. 随意缠绕
- D. 仅固定关节上方

二、判断题

- 1. （ ）扭伤后疼痛轻微时可继续运动。
- 2. （ ）扭伤后 24 小时内可热敷促进吸收。
- 3. （ ）扭伤后肿胀消退即可正常活动。

三、填空题

- 1. 关节扭伤的典型表现为_____、_____。
- 2. 冷敷的作用是_____和_____。
- 3. 扭伤后若出现关节不稳，可能提示_____损伤。

四、简答题

- 1. 简述关节扭伤与骨折在症状上的主要区别。
- 2. 为何扭伤后需避免过早热敷？