

一、选择题

有机磷农药中毒的特异性症状是？

- A. 呕吐物有蒜臭味
- B. 皮肤发红
- C. 腹泻
- D. 咳嗽

答案：A

解析：有机磷中毒后，呕吐物和呼出气体带有特征性蒜臭味（文档症状描述）。

皮肤接触有机磷农药后，应立即采取的措施是？

- A. 用酒精擦拭皮肤
- B. 脱去污染衣物并清洗皮肤
- C. 用热水冲洗皮肤
- D. 包裹衣物防止扩散

答案：B

解析：皮肤接触需立即脱衣并彻底清洗（急救措施①）。

口服有机磷农药中毒后，急救的首要步骤是？

- A. 立即催吐
- B. 大量喝水稀释
- C. 自行驾车送医
- D. 按压舌根催吐

答案：A

解析：催吐可快速排出毒物，但需注意安全（急救措施②）。

二、填空题

有机磷中毒患者瞳孔会缩小至_____状，呼出气体带有_____味。

答案：针尖；蒜臭

解析：瞳孔缩小和蒜臭味是有机磷中毒的典型特征（文档症状描述）。

皮肤接触农药后，应立即_____污染衣物，并用_____清洗皮肤。

答案：脱去；大量清水

解析：避免毒物持续吸收（急救措施①）。

口服中毒患者催吐后，仍需尽快送医进行_____和_____治疗。

答案：洗胃；药物（如阿托品）

解析：洗胃可清除残留毒物，药物拮抗毒性（急救措施②）。

三、判断题

（ ）有机磷中毒患者昏迷时，应强行灌水催吐。

答案：×

解析：昏迷患者禁止催吐，避免误吸（文档步骤③）。

（ ）皮肤接触农药后，用肥皂水清洗可增强解毒效果。

答案：√

解析：肥皂水可辅助去除脂溶性农药残留（常识补充）。

（ ）口服中毒患者催吐后，若症状缓解可暂不送医。

答案：×

解析：需专业洗胃和药物治疗，防止二次中毒（急救措施②）。

四、简答题

简述有机磷农药中毒的急救流程。

答案：

1. 步骤①：立即脱离中毒环境，脱去污染衣物并清洗皮肤；
2. 步骤②：清醒患者立即催吐，昏迷患者保持侧卧位防窒息；
3. 步骤③：尽快送医进行洗胃、药物治疗（如阿托品）；
4. 步骤④：监测呼吸、心跳，必要时进行心肺复苏。

为什么有机磷中毒患者会出现瞳孔缩小？

答案：

1. 有机磷抑制胆碱酯酶活性，导致乙酰胆碱蓄积；
2. 乙酰胆碱过度刺激瞳孔括约肌，使瞳孔缩小如针尖。