

发烧急救

正常人腋下体温为 $36^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ ，当腋下体温超过 37.2°C 时，就是发烧了。成人体温超过 39°C 、小儿体温超过 40°C ，就是高烧。许多种疾病都可能伴有发烧。多数情况下，发烧是机体与侵入体内的病原体斗争的表现，一般不必着急降温。但如果是持续性高烧，就可能对患者不利，特别是小儿，高烧可能引起抽搐，应及时采取降温措施。成人发烧不超过 38.5°C 时，不需要马上吃退烧药。



降温方法：

- ①降低环境温度，脱去部分衣服等。
- ②多喝水，多排尿。
- ③温水擦浴。
- ④用冷湿毛巾或冰袋放在额头、腋窝、腹股沟处冷敷，每 $3 \sim 5$ 分钟更换一次。

如果体温超过 38.5°C ，用一般方法不能降温，就应服用退烧药。如果高烧不退，要尽早到医院诊治。婴幼儿高烧容易引起惊厥(抽搐)，出现全身或局部的肌肉痉挛，需要采取以下保护措施：

- ①解开患者的衣扣，以免影响呼吸。

②将患者头歪向一侧，保持呼吸道通畅，便于呕吐物排出。

③冷敷降温，并迅速送到医院就诊。