

## 《呼吸道异物阻塞急救》测试题

### 一、选择题

患者因呼吸道异物阻塞昏迷，急救时应优先采用哪种方法？

- A. 背部叩击法
- B. 卧位腹部冲击法
- C. 心肺复苏（CPR）
- D. 等待救护车

婴幼儿发生呼吸道异物阻塞且无法哭喊时，正确的自救方法是？

- A. 让其趴在家长的前臂上拍背
- B. 用手指抠出异物
- C. 倒提婴幼儿双腿拍背
- D. 立即灌水

下列哪种情况不适合使用腹部冲击法？

- A. 孕妇
- B. 肥胖患者
- C. 清醒的儿童
- D. 普通成年患者

海姆立克急救法的冲击位置是？

- A. 肋骨下方
- B. 肚脐上方两横指
- C. 胸骨剑突处
- D. 腰部两侧

患者呼吸道部分阻塞但能咳嗽时，应如何处理？

- A. 立即进行腹部冲击
- B. 鼓励其继续咳嗽并拍背
- C. 用手掏出异物
- D. 注射肾上腺素

## 二、判断题

- 1. ( ) 呼吸道异物阻塞患者若出现窒息，应先拍背再尝试腹部冲击。
- 2. ( ) 孕妇发生呼吸道阻塞时，禁止使用任何冲击法。
- 3. ( ) 患者咳嗽无力时，可让其弯腰并用椅背撞击上腹部。

## 三、填空题

- 1. 腹部冲击法的冲击频率约为每秒\_\_\_\_\_次，连续\_\_\_\_\_次为一组。
- 2. 呼吸道异物阻塞昏迷患者的急救体位是\_\_\_\_\_。
- 3. 自救时，患者可将上腹部压在\_\_\_\_\_（如椅背、桌角）进行冲击。

## 四、简答题

- 1. 简述呼吸道异物阻塞患者昏迷时的急救流程。
- 2. 为什么孕妇或肥胖患者需改用胸部冲击法？