

呼吸道异物阻塞急救

某种疾病(如脑血管病后遗症等)和不良的进食习惯(如吃饭时说笑、吞咽过猛,小孩边跑边吃果冻、花生或是嘴里含着笔帽、玻璃球等),是造成呼吸道阻塞的常见原因。部分阻塞危害较轻,完全阻塞则会危及生命,患者会不由自主地用手扶颈部,出现憋气和剧烈的咳嗽,呼吸困难,张口说不出话,口唇青紫,严重时昏迷,甚至迅即死亡。

呼吸道异物阻塞常用的急救方法:


①如果患者呼吸尚可,能说话、咳嗽,尽量鼓励他咳嗽,并让他弯腰,拍打他的背部,协助他把异物排出来。



②如果患者不能说话、咳

嗽,呼吸比较困难,但神志清醒,能站立,可让患者弯腰,拍打

患者的背部,可连续5次,如已排出及时停止。如未能排出,可采取上腹部冲击法解救,即急救者站在患者背



后，双手环抱患者腰部，让患者弯腰，头向前倾。急救者一手握空心拳，将拇指顶住患者腹部正中线肚脐上方两横指处，另一手紧握在握拳手之上，两手用力向患者腹部的后上方挤压，约每秒钟挤压一次，可连续 5~6 次，如已排出及时停止。每次挤压动作要明显分开。



③患者也可采取以下方法自救，将自己脐上两横指处压在椅背、桌边、床栏杆等硬物处，连续向腹部后上方冲击 5~6 次，直至异物排出。异物排出后应去医院检查腹部有没有因为撞击

而受到损伤。

④如果患者是孕妇或由于肥胖不适宜使用腹部冲击法，急救者可挤压患者胸骨下半段。连续按压 5 次后观察效果，无效时应重复进行。



⑤如果患者出现昏迷，也应按照卧位的腹部冲击法或胸部冲击法继续抢救，并紧急呼叫救护车。如果患者心跳、呼吸停止，应立即进行心肺复苏抢救，直至救护车到来。