

一、选择题

心绞痛发作时，患者最典型的疼痛部位是？

- A. 左侧胸部（胸骨后）
- B. 右侧胸部
- C. 上腹部
- D. 腰背部

答案：A

解析：心绞痛典型表现为胸骨后压迫性疼痛，可能放射至左肩、左臂（文档症状描述）。

心绞痛发作时，以下哪种急救措施正确？

- A. 站立活动以缓解疼痛
- B. 舌下含服硝酸甘油
- C. 大量饮水
- D. 立即进食缓解低血糖

答案：B

解析：硝酸甘油可扩张冠脉，缓解心肌缺血（急救措施②）。

以下哪种情况禁止使用硝酸甘油？

- A. 血压正常
- B. 血压低于平时水平
- C. 疼痛持续 3 分钟
- D. 无过敏史

答案：B

解析：低血压患者服用硝酸甘油可能加重病情（急救措施②禁忌）。

二、填空题

心绞痛发作时，患者应立即采取_____位休息，避免活动。

答案：坐位、半卧位或卧位

解析：减少耗氧量，防止病情恶化（急救措施①）。

硝酸甘油的作用是_____冠脉血流，缓解心肌缺血，通常_____分钟内起效。

答案：扩张；3

解析：硝酸甘油通过扩张血管改善心肌供血（急救措施②）。

若心绞痛疼痛持续_____分钟未缓解，需立即呼叫救护车。

答案：15

解析：超过 15 分钟可能发展为心肌梗死（文档隐含逻辑）。

三、判断题

() 心绞痛患者发作时，可通过深呼吸缓解疼痛。

答案：×

解析：深呼吸可能加重耗氧，应保持安静休息（急救措施①）。

() 舌下含服硝酸甘油后，若症状未缓解，可自行追加剂量。

答案：×

解析：两次含服无效需立即送医，避免药物过量（急救措施②）。

() 心绞痛患者日常需随身携带硝酸甘油，并定期检查有效期。

答案：√

解析：硝酸甘油需避光保存，失效后可能延误救治（常识补充）。

四、简答题

简述心绞痛的急救流程。

答案：

1. 步骤①：立即停止活动，就地休息（坐位/卧位）；
2. 步骤②：舌下含服硝酸甘油（注意血压正常）；
3. 步骤③：若 5 分钟未缓解，再次含服并呼叫救护车；
4. 步骤④：监测生命体征，保持患者放松。

为什么心绞痛患者需避免自行驾车就医？

答案：

1. 疼痛可能突然加重，驾驶存在安全隐患；
2. 专业救护车可提供监护和紧急救治（如心电监护、除颤）。