

一、选择题

急性心肌梗死发作时，患者应如何处理？

- A. 立即自行前往医院
- B. 就地休息并拨打“120”
- C. 走动缓解疼痛
- D. 自行服用硝酸甘油

答案：B

解析：就地休息可减少耗氧，拨打“120”确保专业救治（文档措施①）。

急性心肌梗死的先兆症状不包括？

- A. 心绞痛频繁发作
- B. 硝酸甘油效果减弱
- C. 突发剧烈胸痛
- D. 恶心、呕吐

答案：C

解析：突发剧烈胸痛是急性发作症状，非先兆表现（文档先兆描述）。

急救过程中为何禁止患者自行活动？

- A. 防止血压升高
- B. 减少心肌耗氧
- C. 避免情绪激动
- D. 防止呕吐误吸

答案：B

解析：活动会加重心肌缺血，需绝对卧床（文档措施③）。

二、填空题

急性心肌梗死患者急救的首要措施是_____并拨打急救电话“_____”。

答案：就地休息；120

解析：减少活动、争取抢救时间是关键（文档措施①）。

急性心肌梗死的典型症状包括_____、_____、面色苍白、大汗淋漓。

答案：剧烈胸痛；濒死感

解析：疼痛性质与心绞痛相似但更严重（文档症状描述）。

急性心肌梗死患者需观察的生命体征包括_____、_____和意识状态。

答案：呼吸；脉搏

解析：判断是否发生心搏骤停（文档措施②）。

三、判断题

（ ）急性心肌梗死患者若意识清醒，可自行步行至医院。

答案：×

解析：活动会加剧心肌损伤，需严格卧床（文档措施③）。

（ ）硝酸甘油对所有急性胸痛患者均有效。

答案：×

解析：硝酸甘油仅适用于心绞痛，对心肌梗死可能无效（文档先兆描述）。

（ ）急性心肌梗死患者呕吐时，应强行按压舌根催吐。

答案：×

解析：呕吐时需侧头以防误吸，禁用暴力操作（文档未提及催吐）。

四、简答题

简述急性心肌梗死的急救流程。

答案：

1. 立即让患者就地平卧，解松衣物保持呼吸通畅；
2. 拨打“120”呼叫急救，切勿自行送医；
3. 持续监测呼吸、脉搏，若消失立即心肺复苏；
4. 陪伴安抚患者，避免其紧张或活动。

为什么急性心肌梗死患者需禁食禁水？

答案：

1. 防止呕吐误吸导致窒息；
2. 减少胃肠道血流量，优先保障心肌供血；
3. 避免因进食加重心脏负担。