

急性腹痛

急性腹痛是指患者自觉腹部突发性疼痛，常由腹腔内或腹腔外器官疾病所引起，腹痛的部位常为病变之所在。急性腹痛起病急、变化多、发展快，如不及时处理，可在短期内危及生命，应及时去医院诊断、正确治疗。

急性腹痛的早期处理措施：

①解松衣物，让患者躺在安静的室内休息，取俯卧位可使腹痛减轻，可用双手适当压迫腹部使疼痛缓解。

②若是暴饮暴食所致，可用桐油按摩腹部，往往可起到一定的止痛效果。

③不论何种原因引起的急性腹痛，发作时都要禁食、禁饮。所以，不宜劝患者吃东西、喝水。

④适当给予解痉药物，如阿托品、654-2 或维生素 k₃，可暂时缓解腹痛。不要给患者服止痛药（如止痛药、强痛定、吗啡、杜冷丁等），并禁用泻药，禁止灌肠以免掩盖病情，给医生诊断带来假象。

⑤腹痛剧烈且伴有呕吐、高热、血便时，应速送医院治疗，不宜滞留家中以免耽误病情。出现呕吐时，可将冰袋放置在上腹部，而不要强制呕吐，注意观察呕吐物颜色、数量、



次数等。了解呼吸、脉搏和血压的情况，为医生诊治提供可靠的资料。

小儿急性腹痛中最常见的情况是肠痉挛，是由于肠壁平滑肌阵阵强烈收缩而引起的阵发性腹痛。

引起肠痉挛的病因：可能是饮食不当（如摄入大量的生冷食品、暴饮暴食或食物中含糖量过高而引起肠内积气等）导致；也可能是气候变化（如感寒受凉等）使小儿出现肠痉挛；还可能是因为肠寄生虫毒素的刺激导致。

小儿肠痉挛的治疗：

①对于较小的小孩要安抚情绪，并用热水袋焐婴儿腹部，可服用中药或二甲基硅油进行治疗。较大的小孩可用解痉药，无效者可用盐酸双环胺，注意 6 个月以下的婴儿慎用。

②要注意饮食中的蛋白质。母乳喂养儿的母亲应避免食用牛奶、鱼等含蛋白质丰富的食品，人工喂养儿可选用豆奶或水解酪蛋白的奶方，这些都可以明显改善婴儿肠痉挛的情况。

小儿肠痉挛的预防：

①由于部分孩子的腹痛可能与对牛奶过敏有关，因此，反复发生肠痉挛的孩子可以试着暂时停止喝牛奶并改用豆浆或其他代乳品进行观察。



②严防孩子暴饮暴食，而且不得进食大量冷食。

③注意婴儿的喂奶量不可过多，奶中加糖量也不宜过多。

④必须注意腹部的保暖，防止受凉。