

一、选择题

急性腹痛发作时，以下哪项处理是错误的？

- A. 解松衣物，保持安静
- B. 俯卧位缓解疼痛
- C. 口服阿司匹林止痛
- D. 禁食禁饮

答案：C

解析：止痛药可能掩盖病情，需避免（文档步骤④）。

小儿肠痉挛的常见诱因不包括？

- A. 暴饮暴食生冷食物
- B. 腹部受凉
- C. 过敏性体质
- D. 高强度运动

答案：D

解析：运动非直接诱因，饮食和受凉是主要因素（文档小儿肠痉挛病因）。

急性腹痛伴以下哪种症状需立即送医？

- A. 轻微腹胀
- B. 呕吐咖啡色液体
- C. 排气增多
- D. 食欲减退

答案：B

解析：血便、呕血提示消化道出血，需紧急处理（文档步骤⑤）。

二、填空题

急性腹痛患者应避免使用_____类药物，以免掩盖病情。

答案：止痛药（如吗啡、杜冷丁）

解析：止痛药可能干扰诊断（文档步骤④）。

小儿肠痉挛治疗中，较大儿童可口服_____缓解痉挛。

答案：解痉药（如阿托品、654-2）

解析：解痉药是主要治疗手段（文档小儿肠痉挛治疗①）。

预防小儿肠痉挛，母乳喂养的母亲应避免食用_____等高蛋白食物。

答案：牛奶、鱼

解析：过敏原可能诱发肠痉挛（文档预防①）。

三、判断题

（ ）急性腹痛患者可自行热敷缓解疼痛。

答案：×

解析：热敷可能加重炎症或穿孔风险，需遵医嘱（文档未推荐热敷）。

（ ）小儿肠痉挛发作时，应立即喂食缓解饥饿。

答案：×

解析：禁食禁饮是急性腹痛的基本原则（文档步骤③）。

（ ）游泳时肠痉挛应立即上岸休息并热敷腹部。

答案：√

解析：脱离危险环境并保暖是关键（结合文档游泳痉挛处理与小儿肠痉挛预防）。

四、简答题

简述急性腹痛的早期处理原则。

答案：

1. 解松衣物，保持安静；
2. 俯卧位缓解疼痛，避免移动；
3. 禁食禁饮，禁用止痛药、泻药和灌肠；

4. 观察呕吐物、生命体征，及时送医。

如何预防小儿肠痉挛反复发作？

答案：

1. 母乳喂养母亲避免高蛋白饮食；
2. 避免暴饮暴食和冷食；
3. 注意腹部保暖，预防感冒；
4. 调整奶粉种类（如改用豆奶）。