

手足口病

有多种肠道病毒可引起手足口病。最常见的是柯萨奇病毒 A16 型及肠道病毒 71 型。其感染途径包括消化道、呼吸道及接触传播。手足口病主要发生在 5 岁以下的儿童，潜伏期多为 2 ~ 10 天，平均 3 ~ 5 天。

手足口病的预防措施：

①饭前便后、外出后要用肥皂或洗手液等给儿童洗手，不要让儿童喝生水、吃生冷食物，避免接触患病儿童。



②看护人接触儿童前、替幼童更换尿布、处理粪便后均要洗手，并妥善处理污物。

③婴幼儿使用的奶瓶、奶嘴使用前后应充分清洗。

④本病流行期间不宜带儿童到人群聚集、空气流通差的公共场所。注意保持家庭环境卫生，居室要经常通风，勤晒衣被。

⑤儿童出现相关症状要及时到医疗机构就诊。患儿不要接触其他儿童；父母要及时对患儿的衣物进行晾晒或消毒，对患儿粪便及时进行消毒处理；轻症患儿不必住院，宜居家休息、治疗，以减少交叉感染。

⑥每日对玩具、个人卫生用具、餐具等物品进行清洗、消毒。

⑦托幼单位每日进行晨检，发现可疑患儿时，及时采取送诊、居家休息的措施；对患儿所用的物品要立即进行消毒处理。

⑧患儿增多时，要及时向教育和卫生部门报告。根据疫情控制需要，当地教育和卫生部门可决定采取托幼机构或小学放假措施。