

一、选择题

患者出现晕厥前兆时，应立即采取哪种措施？

- A. 站立不动，等待缓解
- B. 立即蹲下或躺下
- C. 快速跑向安全区域
- D. 强行吞咽口水

答案：B

解析：蹲下或躺下可避免摔伤，防止意识丧失后跌倒（急救措施①）。

晕厥患者清醒后，若仍有以下哪种症状，需立即送医？

- A. 轻微头晕
- B. 持续胸痛
- C. 口渴
- D. 短暂乏力

答案：B

解析：胸痛、呼吸困难可能提示心脏病等严重疾病（急救措施④）。

以下哪种做法可能加重晕厥风险？

- A. 松开患者衣领
- B. 保持环境通风
- C. 让患者平躺并抬高双脚
- D. 捏住患者人中穴

答案：D

解析：掐人中无科学依据，可能延误正规处理（文档未推荐）。

二、填空题

晕厥急救中，患者清醒后需观察_____、_____、_____等症状，决定是否送医。

答案：胸痛、呼吸困难、意识模糊

解析：这些症状可能提示潜在严重疾病（急救措施④）。

晕厥患者应保持_____体位，抬高双脚至_____，以促进脑部供血。

答案：平卧；高于心脏水平

解析：体位调整可改善血液回流（急救措施②）。

预防晕厥的关键措施包括避免_____、保持情绪稳定、_____。

答案：长时间站立；合理饮食

解析：低血糖、脱水易诱发晕厥（文档隐含建议）。

三、判断题

() 晕厥患者清醒后，若无其他症状，可自行回家无需就医。

答案：×

解析：需排除心脏病、低血糖等潜在病因（急救措施⑤）。

() 晕厥时掐人中或摇晃患者有助于恢复意识。

答案：×

解析：刺激可能加重不适，应保持环境安静（文档未推荐）。

() 晕厥患者若伴有面色苍白、冷汗，应立即保暖并送医。

答案：√

解析：休克样表现需紧急处理（急救措施③）。

四、简答题

简述晕厥的急救流程。

答案：

1. 步骤①：患者出现前兆时，立即蹲下或躺下防摔伤；
2. 步骤②：保持平卧，抬高双脚，松开衣领，保持通风；
3. 步骤③：若清醒后仍有胸痛、呼吸困难等症状，立即送医；
4. 步骤④：即使症状缓解，仍需就医排查病因。

为什么晕厥后不能立即让患者坐起或站立？

答案：

1. 突然坐起可能因脑供血不足再次晕厥；
2. 平卧可促进血液回流至心脏和大脑，保障重要器官供氧。