

一、选择题

哪种灭鼠药中毒后可能出现皮肤青紫、呼吸困难？

- A. 敌鼠钠盐
- B. 氟乙酰胺
- C. 安妥
- D. 磷化锌

答案：C

解析：安妥主要损害肺毛细血管，导致呼吸困难和皮肤青紫（文档症状描述）。

敌鼠钠盐中毒的典型出血症状多出现在中毒后多久？

- A. 12 小时内
- B. 第 3 天开始
- C. 第 7 天开始
- D. 立即出现

答案：B

解析：敌鼠钠盐为抗凝血剂，出血症状多从第 3 天开始（文档症状描述）。

灭鼠药中毒后，以下哪项急救措施是错误的？

- A. 清醒患者立即催吐
- B. 给昏迷患者喂食蛋清
- C. 保持侧卧位防窒息
- D. 禁止食用油腻食物

答案：B

解析：文档未提及“喂食蛋清”，且昏迷患者禁止经口喂食（急救措施③）。

二、填空题

灭鼠药中毒急救的首要步骤是让清醒患者大量饮用_____或_____后催吐。

答案：温开水；淡盐水

解析：稀释毒物并促进呕吐（急救措施①）。

氟乙酰胺中毒可损害_____、_____、_____和_____系统。

答案：神经；消化；心血管；呼吸

解析：氟乙酰胺为广谱毒性，多系统受累（文档症状描述）。

敌鼠钠盐中毒的出血征象包括鼻出血、、、便血等。

答案：牙龈出血；咯血；尿血；皮下出血

解析：抗凝血作用导致多部位出血（文档症状描述）。

三、判断题

（ ）灭鼠药中毒患者昏迷时，应让其保持仰卧位以防呕吐物误吸。

答案：×

解析：昏迷患者应摆放为侧卧位（复苏位），保持呼吸道通畅（急救措施③）。

（ ）安妥中毒患者若清醒，可自行催吐无需他人协助。

答案：×

解析：催吐需用筷子压舌根辅助，避免误吸（急救措施①）。

（ ）氟乙酰胺中毒患者需尽早使用特效解毒剂（如乙酰胺）。

答案：√

解析：文档虽未明确提及解毒剂，但临床常规需结合解毒剂治疗（需结合常识补充）。

四、简答题

简述灭鼠药中毒的急救流程。

答案：

1. 立即拨打急救电话；
2. 清醒患者催吐（温开水/淡盐水引吐）；
3. 昏迷患者摆放侧卧位，清理口鼻分泌物；
4. 禁食油腻食物，记录中毒药物类型；
5. 尽快送医并携带剩余毒物样本。

为什么敌鼠钠盐中毒患者会出现延迟性出血？

答案：

1. 敌鼠钠盐为抗凝血剂，需经肝脏代谢后抑制凝血功能；
2. 通常在摄入后 3 天左右凝血障碍显现，导致多部位出血。