

一、选择题

结核病治疗的核心原则中，哪一项是错误的？

- A. 早期治疗可提高治愈率
- B. 剂量不足易导致耐药菌产生
- C. 症状缓解后可自行停药
- D. 联合用药可增强疗效

答案：C

解析：规律用药要求全程不间断，自行停药易复发（文档治疗原则⑤）。

结核病预防措施中，属于“保护易感人群”的是？

- A. 及时发现并治疗患者
- B. 接种卡介苗
- C. 注意开窗通风
- D. 消毒餐具

答案：B

解析：接种疫苗直接提升个体免疫力（文档预防措施③）。

肺结核的典型症状不包括？

- A. 低热、盗汗
- B. 咯血
- C. 剧烈头痛
- D. 慢性咳嗽

答案：C

解析：头痛非结核病典型症状（文档症状描述）。

二、填空题

结核病治疗需遵循五大原则：早期、**联合**、**规律**、**适量**、**全程**。

答案：适量；全程

解析：剂量不足易耐药，全程治疗防复发（文档治疗原则②⑤）。

结核病主要通过_____传播，预防需注意_____通风。

答案：飞沫；开窗

解析：呼吸道传播是主要途径（文档传播途径）。

预防结核病的关键人群保护措施包括_____和_____。

答案：接种卡介苗；增强体质

解析：疫苗和免疫力是双重防线（文档预防措施③）。

三、判断题

（ ）结核病患者只需短期服药即可痊愈。

答案：×

解析：需全程规范治疗，否则易复发（文档治疗原则⑤）。

（ ）结核病预防中，开窗通风可降低空气中结核菌浓度。

答案：√

解析：通风可减少飞沫传播风险（文档预防措施②）。

（ ）肺结核患者咯血时，应立即服用止血药。

答案：×

解析：止血需医生指导，自行用药可能掩盖病情（文档未提及自行用药）。

四、简答题

简述结核病治疗原则中“联合用药”的意义。

答案：

1. 防止单一药物产生耐药性；

2. 多种药物协同作用增强疗效；
3. 针对不同代谢状态的结核菌全面覆盖。

如何通过日常行为降低结核病感染风险？

答案：

1. 避免密切接触结核病患者；
2. 保持室内通风，定期消毒；
3. 均衡饮食、规律作息，增强免疫力；
4. 接种卡介苗（适用于高危人群）。