

结膜炎

正常情况下，结膜具有一定防御能力，但当防御能力减弱或外界致病因素增加时，将引起结膜组织炎症，这种炎症统称为结膜炎（红眼病），按病程可分为超急性、急性、亚急性、慢性结膜炎。

结膜炎的个人预防：

①“红眼病”高发季节，要养成良好的个人卫生习惯，勤剪指甲，饭前便后要洗手。


②保持良好的个人卫生，最好不要用手触摸眼睛，触摸眼睛前后要彻底洗手。

③可用板蓝根、野菊花、夏枯草、黄芩、栀子、金银花等熬汤或泡茶服用，提高免疫力。

④不要与别人共用毛巾或个人卫生用品，用流水洗脸和手。不接触患者用过的洗脸用具、手帕及治疗使用过的医疗器具。

⑤不要用酒店提供的毛巾擦脸，以免因毛巾消毒不完全而感染红眼病。

⑥不要与他人共用眼部药物、眼部化妆品和其他可能接触眼部的药品或用品；不采用集体滴眼药的方式预防眼病。



⑦保持大便通畅，便秘者可用番泻叶泡茶饮用。

⑧在日常生活中，少到游泳场等公共场所，尤其是免疫力低的小孩，以免感染病菌。

⑨在流行期，公用水龙头、电梯扶手、门把手、电话、用具、玩具等要注意消毒；接触电脑键盘后要洗手，切忌揉眼、搓脸，尤其是使用公共键盘者。