

一、选择题

被钉子扎伤后，以下哪种做法是错误的？

- A. 立即拔出钉子
- B. 用干净纱布包扎伤口
- C. 尽快送医
- D. 保持伤口低于心脏位置

答案：A

解析：立即拔出钉子可能导致伤口扩大或异物残留（文档步骤①）。

注射破伤风抗毒素的最佳时间是？

- A. 48 小时内
- B. 24 小时内
- C. 72 小时内
- D. 一周内

答案：B

解析：破伤风抗毒素需在 24 小时内注射以预防感染（文档步骤③）。

老人或儿童被钉子扎伤后，应特别注意什么？

- A. 立即热敷消肿
- B. 细致检查伤口避免遗漏
- C. 自行拔出钉子
- D. 仅观察不处理

答案：B

解析：老人、儿童容易忽视深部伤口，需仔细检查（文档步骤④）。

二、填空题

脚扎伤后，若出血较多，应采用_____止血法包扎伤口。

答案：间接加压

解析：间接加压可避免直接按压钉子导致嵌入更深（文档步骤②）。

钉子扎伤后，即使伤口较小也应警惕_____感染。

答案：破伤风杆菌

解析：深窄伤口易形成无氧环境，利于破伤风杆菌繁殖（文档背景）。

脚扎伤后，无论症状轻重，均应在_____小时内注射破伤风抗毒素。

答案：24

解析：破伤风抗毒素需尽早使用以中和毒素（文档步骤③）。

三、判断题

（ ）被钉子扎伤后，应立即用止血带捆扎止血。

答案：×

解析：止血带可能加重组织损伤，间接加压更安全（文档步骤②）。

（ ）扎伤后，若无明显出血，可自行拔出钉子并消毒。

答案：×

解析：钉子可能携带污物，需由医生评估后处理（文档步骤①）。

（ ）破伤风抗毒素需在受伤后 24 小时内注射才有效。

答案：√

解析：破伤风潜伏期短，需尽早预防（文档步骤③）。

四、简答题

简述脚扎伤的急救处理步骤。

答案：

1. 保持冷静，切勿拔出钉子；
2. 用干净纱布或绷带包扎固定伤口；
3. 若出血多，采用间接加压止血；
4. 立即送医，并在 24 小时内注射破伤风抗毒素。

为什么脚扎伤后不能自行拔出钉子？

答案：

1. 钉子可能断裂残留，导致二次损伤；
2. 拔出后伤口扩大，增加感染风险；
3. 需由医生评估是否需手术清创。