

《过敏反应急救》测试题

一、选择题

过敏性休克的首选急救药物是？

- A. 肾上腺素
- B. 地塞米松
- C. 氯雷他定
- D. 维生素 C

严重过敏反应的早期症状可能包括？

- A. 皮肤瘙痒、呼吸困难、血压下降
- B. 腹泻、呕吐、发热
- C. 头晕、乏力、嗜睡
- D. 咳嗽、流涕、打喷嚏

发生过敏反应时，患者出现喉头水肿应如何处理？

- A. 立即气管切开
- B. 保持气道通畅并呼叫救护车
- C. 自行服用抗过敏药
- D. 大量饮水

蜂蜜过敏患者再次接触蜂蜜时，可能发生哪种反应？

- A. 速发型过敏反应
- B. 迟发型过敏反应
- C. 免疫耐受
- D. 无反应

过敏性鼻炎发作时，以下哪种做法正确？

- A. 用热水冲洗鼻腔
- B. 避免接触过敏原

- C. 自行注射肾上腺素
- D. 大量饮酒缓解症状

二、判断题

1. () 过敏反应患者若清醒，应让其饮用大量温水稀释过敏原。
2. () 注射肾上腺素后，患者症状未缓解应再次注射。
3. () 过敏体质者可随身携带抗过敏药以防万一。

三、填空题

1. 过敏性休克的典型“三联征”是_____、_____、_____。
2. 轻度过敏反应可通过口服_____缓解。
3. 蜜蜂蜇伤后，应尽快拔除_____并冷敷。

四、简答题

1. 简述过敏反应的急救步骤。
2. 为何过敏患者需避免抓挠皮肤？