

一、选择题

发现轻度醉酒者，以下哪种做法最恰当？

- A. 立即催吐
- B. 多喝浓茶醒酒
- C. 多喝温开水促进排泄
- D. 让其独自休息

答案：C

解析：温开水可稀释酒精并促进代谢（文档措施①）。

重度醉酒者出现昏迷时，应如何安置体位？

- A. 仰卧位
- B. 俯卧位
- C. 侧卧位
- D. 坐位

答案：C

解析：侧卧位可防止呕吐物误吸（文档措施②）。

以下哪种行为可能加重酒精中毒风险？

- A. 催吐后继续饮酒
- B. 保持环境安静
- C. 补充富含维生素的食物
- D. 监测呼吸和脉搏

答案：A

解析：反复催吐可能损伤食道或加重脱水（文档未提及但符合急救原则）。

二、填空题

酒精中毒解救的首要措施是让患者_____，以促进酒精排泄。

答案：多喝温开水

解析：稀释酒精浓度，减轻中枢抑制（文档措施①）。

重度醉酒者催吐后，若症状未缓解，应立即将其摆放为_____位。

答案：侧卧位

解析：防止呕吐物阻塞气道（文档措施②）。

酒精中毒患者急救中，_____是导致窒息死亡的主要原因。

答案：呕吐物误吸

解析：侧卧位可减少误吸风险（文档措施③）。

三、判断题

（ ）对重度醉酒者，催吐是无效的急救措施。

答案：×

解析：催吐可快速减少胃内酒精吸收（文档措施②）。

（ ）酒精中毒患者若无呕吐，可让其饮用咖啡以保持清醒。

答案：×

解析：咖啡因可能加重心脏负担，禁用刺激性饮料（常识推断）。

（ ）醉酒者单独睡觉时，需定时唤醒观察意识状态。

答案：√

解析：防止睡眠中窒息（文档措施③）。

四、简答题

简述酒精中毒的急救流程。

答案：

1. 轻度中毒：卧床休息，多喝温开水；
2. 重度中毒：立即催吐（清醒状态下），侧卧位防窒息；
3. 持续监测呼吸、脉搏，必要时送医；
4. 禁止催眠药、镇静剂，避免混合饮酒。

为什么重度醉酒者禁止自行催吐？

答案：

1. 昏迷患者催吐可能导致误吸或窒息；
2. 剧烈呕吐可能引发贲门黏膜撕裂、出血等并发症。