

一、选择题

鱼刺卡喉后，以下哪种做法是正确的？

- A. 大量吃醋软化鱼刺
- B. 吞咽米饭或馒头将鱼刺压下
- C. 立即停止进食并保持镇静
- D. 用手指抠挖咽喉

答案：C

解析：停止进食可避免鱼刺进一步刺入，镇静有助于喉部肌肉放松（文档措施①）。

若鱼刺较小且位置较浅，可尝试用哪种方法排出？

- A. 喝温水
- B. 用手刺激喉咙催吐
- C. 吞咽韭菜
- D. 大声说话

答案：B

解析：催吐可通过恶心反射将鱼刺吐出（文档措施②）。

以下哪种情况需立即就医？

- A. 鱼刺卡喉后 10 分钟未缓解
- B. 鱼刺较小且无疼痛感
- C. 能看见鱼刺在口腔内
- D. 吞咽时仅有轻微异物感

答案：A

解析：30 分钟未缓解或大鱼刺需专业处理（文档措施③）。

二、填空题

鱼刺卡喉后应立即_____进食和饮水，防止鱼刺刺入更深。

答案：停止

解析：进食可能推动鱼刺嵌入黏膜（文档措施①）。

小而软的鱼刺可通过_____喉咙诱发呕吐，尝试将鱼刺排出。

答案：刺激

解析：催吐反射可能帮助排出浅表鱼刺（文档措施②）。

鱼刺卡喉后，若出现_____、_____或呼吸困难，应高度警惕并紧急送医。

答案：胸痛、吞咽剧痛

解析：提示鱼刺可能刺入食管或邻近器官（常识补充）。

三、判断题

() 喝醋能有效软化鱼刺，帮助排出。

答案：×

解析：醋无法在短时间内软化鱼刺，反而可能灼伤黏膜（文档否定民间偏方）。

() 鱼刺卡喉后，只要能正常说话，说明情况不严重。

答案：×

解析：鱼刺可能卡在食管入口或深处，无症状不代表无危险（文档强调及时就医）。

() 儿童吃鱼时应避免说话或玩耍，以减少卡喉风险。

答案：√

解析：分心进食易导致误吞（文档预防措施④）。

四、简答题

简述鱼刺卡喉的正确急救流程。

答案：

1. 步骤①：立即停止进食、饮水，保持冷静；
2. 步骤②：尝试低头弯腰，轻拍背部或刺激咽喉催吐；
3. 步骤③：若无效，用镊子小心夹取可见鱼刺（避免自行用工具暴力操作）；
4. 步骤④：30 分钟内未缓解或症状加重，立即就医。

为什么吞饭、喝醋等土方法不推荐？

答案：

1. **吞饭：**可能将鱼刺推入食管深处，甚至刺穿主动脉；
2. **喝醋：**醋酸无法快速软化鱼刺，且可能腐蚀消化道黏膜。