

一、选择题

麻疹的主要传播途径是？

- A. 血液传播
- B. 空气飞沫传播
- C. 食物传播
- D. 蚊虫叮咬

答案：B

解析：麻疹病毒通过感染者咳嗽、打喷嚏或说话产生的飞沫传播（文档传播途径）。

麻疹患者出疹的顺序是？

- A. 耳后→发际→面部→躯干→四肢→手足
- B. 手足→四肢→躯干→面部→发际→耳后
- C. 躯干→四肢→面部→耳后→发际
- D. 面部→耳后→发际→躯干→四肢

答案：A

解析：皮疹先从耳后、发际开始，逐渐蔓延至面部、躯干、四肢，最后到手足（文档症状描述）。

以下哪项是麻疹的特异性体征？

- A. 口腔溃疡
- B. 科氏斑（颊黏膜小白点）
- C. 荨麻疹
- D. 水疱疹

答案：B

解析：科氏斑是麻疹早期特征性表现（文档症状描述）。

二、填空题

麻疹患者从潜伏期最后_____天至出疹后_____天内具有传染性。

答案：1-2； 5

解析：传染期覆盖潜伏期末至出疹后5天（文档传染性描述）。

预防麻疹的关键措施是及时接种_____疫苗，尤其是_____人群。

答案：麻疹；儿童、老年人、免疫力低下者

解析：疫苗是核心预防手段（文档措施②）。

麻疹患者衣物应_____暴晒，居住环境需_____并用紫外线照射。

答案：阳光下；通风

解析：消毒措施可减少病毒存活（文档措施⑥）。

三、判断题

（ ）麻疹患者终身免疫，无需接种疫苗。

答案：√

解析：文档明确提到“麻疹治好后一般是终身免疫的”。

（ ）接触麻疹患者后超过 5 天注射免疫血清球蛋白仍有效。

答案：×

解析：文档指出“接触后 5 天内注射有效，超过 6 天无效”。

（ ）麻疹流行季节应减少去人群密集场所，如医院和商场。

答案：√

解析：避免接触传染源是关键（文档措施⑥）。

四、简答题

简述麻疹的预防措施。

答案：

1. 接种麻疹疫苗（尤其是儿童、老人和高危人群）；
2. 保持手卫生，避免接触患者分泌物；
3. 患者隔离至出疹后 5 天，衣物暴晒、环境消毒；
4. 流行季节减少前往密闭公共场所。

为什么接触麻疹患者后需尽早注射免疫血清球蛋白？

答案：

1. 免疫血清球蛋白可提供短期被动免疫（维持 8 周）；
2. 超过 5 天注射可能无法阻止发病，需结合疫苗长期保护。