中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 2 日

1 核心模型与快速识别

Bloch 定理（能带理论基础）

数学形式：

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

物理图像：

- $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$：自由电子行波（*plane wave*）
- $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$：原子轨道局域波函数
- 周期势场导致两者”折衷”形成能带

▷ **看到”周期势场”立即写此形式！**

关键区分：

- *Crystal momentum* $\mathbf{k} \neq$ 物理动量 $\mathbf{p}$
- 简约区方案（*reduced zone*）vs 扩展区方案

散射问题：Born vs 分波法

快速决策树：

$$ka \gg 1 \Rightarrow \text{Born 近似} ka \ll 1 \Rightarrow \text{分波法（s 波主导）}$$

Born 近似一级公式：

$$f_B(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\mathbf{q})$$

其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$（动量转移）

球对称势快速公式：

$$\tilde{V}(q) = \frac{4\pi}{q}\int_0^\infty rV(r)\sin(qr)dr$$

▷ **记住这个积分形式！**

紧束缚模型（*Tight-Binding*）

色散关系：

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_0 - t\sum_{\langle i,j\rangle} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)}$$

一维单带简化：

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t\cos(ka)$$

物理意义：

- t：跃迁积分（hopping），决定带宽
- $t > 0$：能带底部在 $k = 0$
- 带边有效质量：$m^* = \hbar^2/(2ta^2)$

常见陷阱

- 混淆 *reduced mass* μ 与 *effective mass* m^*
- 一维态密度 $g(E) \propto 1/\sqrt{E}$（发散！）
- 三维自由电子 $g(E) \propto \sqrt{E}$
- 费米能级定义：$E_F = \hbar^2 k_F^2/(2m)$（$T = 0$）

二次量子化本质

核心思想：多体问题 → 场算符的单体问题

产生湮灭算符：

$$\hat{c}_i^\dagger|\ldots, n_i, \ldots\rangle = \sqrt{n_i + 1}|\ldots, n_i + 1, \ldots\rangle$$

场算符：

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_\alpha \phi_\alpha(\mathbf{r})\hat{c}_\alpha$$

物理图像：粒子是场算符的激发态，类似光子在电磁场中。

2 定态微扰论（*Stationary Perturbation Theory*）

定态微扰论框架

基本设定：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad \hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$$

展开形式：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$
$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots$$

中间归一化： $\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$，即 $\langle n^{(0)}|n^{(k)}\rangle = 0$ $(k \geq 1)$

▷ **先判断简并性！非简并 vs 简并完全不同**

非简并微扰论（*Non-Degenerate*）

一级能量修正：

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = V_{nn}}$$

二级能量修正：

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}}$$

一级态修正：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle$$

三级能量修正：

$$E_n^{(3)} = \sum_{m\neq n}\sum_{k\neq n} \frac{V_{nm}V_{mk}V_{kn}}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})} - V_{nn} \sum_{m\neq n} \frac{|V_n}{(E_n^{(0)} -}$$

微扰论解题步骤

Step 1：识别 判断简并性

Step 2：计算矩阵元 $V_{mn} = \langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle$

Step 3：代入公式

- 非简并：直接用上述公式
- 简并：在简并子空间对角化

Step 4：检查 能量修正是否实数？态矢量是否归一化？

非简并微扰适用条件

- $|V_{mn}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$（微扰远小于能级间距）
- 分母不能为零（不能用于简并能级！）
- 级数收敛性：通常要求 λ 足够小

关键：二级能量修正的分母是 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$，注意符号！

简并微扰论（ ）

问题核心： 对于 g 重简并能级 $E_n^{(0)}$，非简并公式分母为零：

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \to \infty$$

解决方案： 在简并子空间 $\mathcal{H}_n^{(0)}$ 中对角化微扰矩阵：

$$\boxed{\mathbf{V}^{(n)}\mathbf{c}^{(k)} = E_{n,k}^{(1)}\mathbf{c}^{(k)}}$$

其中 $V_{ij}^{(n)} = \langle n, i|\hat{V}|n, j\rangle$

物理意义： 微扰 $\hat{V}$ 解除简并，选取”正确”的零级态使矩阵对角化。

简并微扰解题套路

Step 1： 确定简并子空间维数 g

Step 2： 选取基矢 $|n, i\rangle$ $(i = 1, ..., g)$

Step 3： 构造 $g \times g$ 微扰矩阵 V_{ij}

Step 4： 对角化求本征值 $E_{n,k}^{(1)}$ 和本征矢 $\mathbf{c}^{(k)}$

Step 5： 构造正确零级态：

$$|n, k^{(0)}\rangle = \sum_{i=1}^{g} c_i^{(k)}|n, i\rangle$$

Step 6： 简并解除后，对各自态用非简并公式算高阶修正

简并微扰二级修正

简并解除后（假设 $E_{n,k}^{(1)} \neq E_{n,l}^{(1)}$），可用非简并公式：

$$E_{n,k}^{(2)} = \sum_{m\notin\mathcal{D}_n} \frac{|\langle m^{(0)}|\hat{V}|n, k^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

注意：求和排除简并子空间 $\mathcal{D}_n$！

简并微扰常见错误

- 未在简并子空间对角化直接用非简并公式
- 二级修正时忘记排除简并子空间
- 混淆”正确零级态”与原始基矢
- 忽略微扰可能不解除简并的情况（如对称性保护）

非简并 vs 简并对比

	非简并	简并
零级态	唯一确定	子空间中超 position
一级能量	V_{nn}	$V^{(n)}$ 本征值
关键操作	直接展开	先对角化
态修正	对所有 $m \neq n$	排除子空间

简并微扰是更一般的框架，非简并是其特例。

3 二级结论速查

量子力学

- 不确定性：$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle [A,B]\rangle|$
- Ehrenfest 定理：$i\hbar \frac{d}{dt}\langle A\rangle = \langle [A,H]\rangle$
- 突然近似：$\psi(t=0^+) = \psi(t=0^-)$
- 绝热近似：保持在瞬时本征态
- Berry 相位：$\gamma_n = i\oint \langle n|\nabla_R n\rangle \cdot d\mathbf{R}$

微扰论要点

- $E_n^{(1)} = V_{nn}$（对角元）
- 二级修正 $\propto |V_{mn}|^2/\Delta E$
- 简并：在子空间对角化
- 久期方程（*secular equation*）
- 斯塔克效应（*Stark effect*）用简并微扰

统计力学

- 费米分布：$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}$
- 玻色分布：$n_B(E) = \frac{1}{e^{\beta E}-1}$
- 理想气体：$PV = Nk_BT$
- 费米能：$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$
- 索末菲展开：低温展开技巧

固体物理

- 德拜温度：$\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$
- 等离子体频率：$\omega_p = \sqrt{ne^2/(m\varepsilon_0)}$
- 有效质量：$m_{ij}^* = \hbar^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j}\right)^{-1}$
- 态密度（d 维）：$g(E) \propto E^{d/2-1}$
- 德鲁德电导率：$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

散射理论

- Born：$f_B = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\mathbf{q})$
- 光学定理：$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\mathrm{Im} f(0)$
- 相移与散射截面相联系
- 低能 s 波：$\sigma_0 = 4\pi a_s^2$
- 共振：$\sigma_l \propto 1/(E-E_R)^2$

格林函数

- $G^R(\omega) = (\omega - H + i\eta)^{-1}$
- DOS：$\rho(\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}\, G^R$
- Dyson：$G = G_0 + G_0\Sigma G$
- 谱函数：$A = -2\mathrm{Im}\, G^R$
- 松原(Matsubara)：$\omega_n = (2n+1)\pi/\beta$

A 附录：定态微扰论完整推导

非简并微扰论详细推导

设定： $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}, \quad \hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$

展开：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$
$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots$$

使用中间归一化：$\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$，则 $\langle n^{(0)}|n^{(k)}\rangle = 0$（$k \geq 1$）。

零级方程（λ^0）：

$$\hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$$

这是未微扰问题，已知解。

一级方程（λ^1）：

$$\hat{H}_0|n^{(1)}\rangle + \hat{V}|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(0)}\rangle$$

整理得：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V})|n^{(0)}\rangle$$

一级能量修正： 左乘 $\langle n^{(0)}|$：

$$\underbrace{\langle n^{(0)}|\hat{H}_0|n^{(1)}\rangle}_{E_n^{(0)}\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle=0} + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\underbrace{\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle}_{0} + E_n^{(1)}$$

得：

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = V_{nn}$$

一级态修正： 将 $|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} c_m^{(1)}|m^{(0)}\rangle$ 代入一级方程，左乘 $\langle m^{(0)}|$（$m \neq n$）：

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})c_m^{(1)} = -\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = -V_{mn}$$

解得：

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

因此：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle$$

二级能量修正： 收集 λ^2 项：

$$\hat{H}_0|n^{(2)}\rangle + \hat{V}|n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$：

$$0 + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(1)}\rangle = 0 + E_n^{(1)} \cdot 0 + E_n^{(2)}$$
$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}\langle n^{(0)}|\hat{V}|m^{(0)}\rangle$$
$$= \sum_{m\neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

简并微扰论详细推导

问题设定： 设能级 $E_n^{(0)}$ 有 g 重简并，基矢为 $|n, i\rangle$（$i = 1, ..., g$）。

关键困难： 非简并微扰中态修正系数：

$$c_m^{(1)} = \frac{\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

当 $|m^{(0)}\rangle$ 也在简并子空间时，分母为零，发散！
解决方案：在简并子空间中找到”正确”的零级态 $|n,k^{(0)}\rangle$，使微扰不混合这些态。
设正确零级态为：

$$|n,k^{(0)}\rangle = \sum_{i=1}^{g} c_i^{(k)} |n,i\rangle$$

一级方程：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n,k^{(1)}\rangle = (E_{n,k}^{(1)} - \hat{V})|n,k^{(0)}\rangle$$

自洽性要求：左式与简并子空间正交（因 $\hat{H}_0 - E_n^{(0)}$ 消灭子空间内所有态），故右式也必须与子空间正交：

$$\langle n,i|(E_{n,k}^{(1)} - \hat{V})|n,k^{(0)}\rangle = 0, \quad \forall i$$

展开得：

$$\sum_{j=1}^{g} \langle n,i|\hat{V}|n,j\rangle c_j^{(k)} = E_{n,k}^{(1)} c_i^{(k)}$$

即久期方程：

$$\mathbf{V}^{(n)}\mathbf{c}^{(k)} = E_{n,k}^{(1)}\mathbf{c}^{(k)}$$

对角化后：微扰矩阵在正确基底下对角化：

$$\langle n,k^{(0)}|\hat{V}|n,l^{(0)}\rangle = E_{n,k}^{(1)}\delta_{kl}$$

此时可用非简并公式计算态修正，求和自动排除简并子空间（因矩阵元为零）。

氢原子斯塔克效应（*Stark Effect*）

基态（$n=1$，非简并）：
$\hat{V} = e\mathcal{E}z = e\mathcal{E}r\cos\theta$
一级修正：

$$E_1^{(1)} = e\mathcal{E}\langle 100|z|100\rangle = 0$$

（被积函数 $|\psi_{100}|^2 z$ 为奇函数，积分为零）
二级修正：

$$E_1^{(2)} = \sum_{n=2}^{\infty}\sum_{l,m} \frac{|\langle nlm|e\mathcal{E}z|100\rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

能量分母为负，故 $E_1^{(2)} < 0$。
计算得：

$$E_1^{(2)} = -\frac{9}{4}a_0^3\mathcal{E}^2$$

物理意义：外电场诱导电偶极矩 $\mathbf{p} = \alpha\mathcal{E}$，其中极化率 $\alpha = 9a_0^3/2$。
$n=2$ **能级**（4 重简并：$|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21,-1\rangle$）：
选择定则：$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0$，微扰只连接 $|200\rangle \leftrightarrow |210\rangle$。
微扰矩阵：

$$\mathbf{V} = -3e\mathcal{E}a_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对角化得本征值：$\pm 3e\mathcal{E}a_0, 0, 0$
对应本征态：

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle), \quad E = +3e\mathcal{E}a_0$$
$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle), \quad E = -3e\mathcal{E}a_0$$

$|211\rangle, |21,-1\rangle$ 仍为简并，能量不变。
特征：线性斯塔克分裂 $\Delta E \propto \mathcal{E}$ 是简并微扰的标志。

祝考试顺利！Good luck with the exam!