中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 15 日

1 量子力学：压缩算符与标度变换

题目：压缩算符的标度变换

定义压缩算符（*squeezing operator*）：

$$S(\xi) = \exp\left\{\frac{1}{2}\left(\xi^* a^2 - \xi (a^\dagger)^2\right)\right\}$$

其中 a 和 $a^\dagger$ 是谐振子的升降算符。若取 $\xi = r$ 为实数，证明 $S(r)$ 为标度变换，即证明 $S^\dagger(r)XS(r)$ 正比于 X，$S^\dagger(r)PS(r)$ 正比于 P；证明两者的比例系数互为倒数，并求出具体的比例系数。

考点快速分析

- **算符代数**：指数算符酉变换 $e^{-G}Ae^{G}$ 的微分方程处理
- **压缩态**：相空间中的几何形变（一个方向压缩、另一个方向膨胀）
- **Bogoliubov 变换**：玻色子配对哈密顿量的对角化基础

标准解题过程

Step 1：算符关系构建

在自然单位 $\hbar = m = \omega = 1$ 下：

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger), \quad P = \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)$$

Step 2：转化为微分方程

令 $a(r) = S^\dagger(r)aS(r)$。由于 $S(r) = e^{rG}$ 且 $G = \frac{1}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)$，有

$$\frac{da(r)}{dr} = [a(r), G]$$

计算对易子：

$$[a, G] = \frac{1}{2}\left[a, a^2 - (a^\dagger)^2\right] = -a^\dagger$$

建立耦合方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{da(r)}{dr} = -a^\dagger(r) \\ \dfrac{da^\dagger(r)}{dr} = -a(r) \end{cases}$$

Step 3：求解并代入

双曲函数解（初始条件 $a(0) = a$）：

$$a(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$$

$$a^\dagger(r) = a^\dagger \cosh r - a\sinh r$$

对于 X：

$$\begin{aligned} S^\dagger XS &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a(r) + a^\dagger(r)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)(\cosh r - \sinh r) = e^{-r}X \end{aligned}$$

对于 P：

$$\begin{aligned} S^\dagger PS &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a(r) - a^\dagger(r)) \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)(\cosh r + \sinh r) = e^{r}P \end{aligned}$$

核心结论

$$S^\dagger(r)XS(r) = e^{-r}X, \qquad S^\dagger(r)PS(r) = e^{r}P$$

比例系数 e^{-r} 与 e^{r} 互为倒数，乘积为 1。

思路短路原因与解决策略

短路原因：

- **公式焦虑**：试图直接展开 $e^{A}Be^{-A}$ 的无限级数（BCH 公式），导致中间项计算极其混乱
- **系数混淆**：在 $X \sim a + a^\dagger$ 中纠结具体的 $1/\sqrt{2}$ 或 i 的正负号
- **静态思维**：将 r 看作死板的参数，而非动态演化的“时间”

解决策略：

- **微分化思维**：看到 $e^{r(\cdots)}$ 作用于算符，第一反应永远是求导建方程。这比硬算对易子快且准
- **线性保持原则**：记住压缩变换是线性的，X 变换后一定还是 X 的线性组合
- **结果逆推**：既然是“压缩”，必然一个方向缩 e^{-r}，另一个扩 e^{r}

举一反三与物理直觉

物理直觉——相空间“揉面团”：
把真空态在相空间中想象成一个圆（相干态的准概率分布）。压缩算符 $S(\xi)$ 所生成的变换是一种保辛结构（保面积）的仿射变换：它将圆挤压成椭圆，但满足最小不确定关系 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$。当 $\xi = r$ 为实数时，椭圆的长轴和短轴恰好与 X 轴、P 轴对齐，X 方向被压缩 e^{-r} 而 P 方向被拉伸 e^{r}。其来源是哈密顿量中的二次项 $a^2 - (a^\dagger)^2$ 打破了谐振子基态的旋转对称性，导致粒子对的产生与湮灭关联，从而在一个方向上实现了不确定度的塌缩。

拓展延伸：

- **复数参数** $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi) a S(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标轴 $X_{\theta/2} = X\cos(\theta/2) + P\sin(\theta/2)$ 和 $P_{\theta/2} = -X\sin(\theta/2) + P\cos(\theta/2)$，则有 $S^\dagger(\xi) X_{\theta/2} S(\xi) = e^{-r} X_{\theta/2}$，$S^\dagger(\xi) P_{\theta/2} S(\xi) = e^{r} P_{\theta/2}$。标度变换的方向不再是坐标轴 X, P，而是相空间中旋转了 $\theta/2$ 角度的倾斜轴。
- **BdG 变换联系**：玻色子配对哈密顿量 $H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}(a^2 + (a^\dagger)^2)$ 的对角化，本质上就是这个压缩变换的玻色子版本。其关键区别在于：为了保持玻色对易关系 $[b, b^\dagger] = 1$，变换系数必须满足 $u^2 - v^2 = 1$，因此用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$ 参数化；而费米子 BdG 变换为了保持反对易关系 $\{c, c^\dagger\} = 1$，系数满足 $u^2 + v^2 = 1$，因此用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 参数化。

解题思路模板（算符酉变换）

1. **识别生成元**：写出 G 并确认参数对应的动力学“时间”
2. **建立微分方程**：$\dfrac{dA(\lambda)}{d\lambda} = [A(\lambda), G]$
3. **利用线性性**：猜测解的形式（通常为双曲/三角函数线性组合）
4. **回代验证**：将解代回原始算符定义，检查系数与对易关系
5. **极限检查**：$\lambda \to 0$ 时是否恢复恒等变换？

2 补充说明：压缩算符问题的完整细节

2.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数
二级（方法）	算符酉变换、指数映射求导法
三级（关键词）	squeezing operator, $S^\dagger aS$, Bogoliubov transformation

▷ **看到 $S^\dagger(r)aS(r)$ 或 $e^{-G}Ae^{G}$，立即启动“参数求导 + 微分方程”套路，不要硬算 BCH。**

2.2 自然单位与非自然单位的对照

在谐振子问题中，严格的关系式为（不取自然单位）：

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X+\frac{i}{m\omega}P\right),\qquad a^\dagger=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X-\frac{i}{m\omega}P\right)$$

反解得：

$$X=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a+a^\dagger),\qquad P=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger-a)$$

当且仅当取自然单位 $\hbar=m=\omega=1$ 时，才简化为 $X=(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$，$P=-i(a-a^\dagger)/\sqrt{2}$。在考试中如果未声明自然单位，**必须保留 $\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ 等因子**，最终标度系数不变（仍为 $e^{\pm r}$），因为系数在标度变换中会被约去。

2.3 微分方程的来源与推导

设 $S(r)=e^{rG}$，其中 $G=\frac{1}{2}(a^2-(a^\dagger)^2)$。定义海森堡型演化算符 $a(r)\equiv S^\dagger(r)aS(r)=e^{-rG}ae^{rG}$。对参数 r 求导：

$$\begin{aligned}\frac{da(r)}{dr}&=\frac{d}{dr}\left(e^{-rG}ae^{rG}\right)\\&=(-G)e^{-rG}ae^{rG}+e^{-rG}ae^{rG}G\\&=e^{-rG}ae^{rG}G-Ge^{-rG}ae^{rG}\\&=[a(r),G]\end{aligned}$$

这正是 Heisenberg 方程的类比。**关键技巧**：G 不显含 r（除前面的系数 r 外），因此可以直接把 r 当作“时间”来求导。

2.4 微分方程的详细解法

由对易关系 $[a,a^\dagger]=1$ 得：

$$[a,G]=\frac{1}{2}\left[a,a^2-(a^\dagger)^2\right]=-a^\dagger,\qquad [a^\dagger,G]=-a$$

于是耦合方程组为：

$$\frac{da(r)}{dr}=-a^\dagger(r),\qquad \frac{da^\dagger(r)}{dr}=-a(r)$$

对第一式再求导一次：

$$\frac{d^2a(r)}{dr^2}=-\frac{da^\dagger(r)}{dr}=a(r)$$

即 $d^2a/dr^2-a=0$。特征方程 $\lambda^2-1=0$，通解为 $a(r)=A\cosh r+B\sinh r$。由初始条件：

- $r=0$ 时 $a(0)=a$，故 $A=a$
- $r=0$ 时 $\left.\frac{da}{dr}\right|_{r=0}=-a^\dagger(0)=-a^\dagger$，故 $B=-a^\dagger$

因此：

$$a(r)=a\cosh r-a^\dagger\sinh r,\qquad a^\dagger(r)=a^\dagger\cosh r-a\sinh r$$

2.5 考察的完整知识点

1. **升降算符与坐标动量的关系**：$a,a^\dagger$ 与 X,P 的线性映射（含非自然单位形式）
2. **基本对易关系**：$[a,a^\dagger]=1$，$[a,a]=[a^\dagger,a^\dagger]=0$

3. **高阶对易子**：$[a,(a^\dagger)^2]=2a^\dagger$，$[a^2,a^\dagger]=2a$
4. **指数算符的求导公式**：$\dfrac{d}{dr}e^{-rG}Ae^{rG}=[e^{-rG}Ae^{rG},G]$
5. **双曲函数恒等式**：$\cosh r-\sinh r=e^{-r}$，$\cosh r+\sinh r=e^{r}$
6. **物理图像**：不确定度在 X 方向被压缩 e^{-r} 倍，在 P 方向被膨胀 e^{r} 倍，满足 $\Delta X\Delta P=\hbar/2$（最小不确定态）

2.6 BdG 变换与压缩变换的数学联系

考虑玻色子配对哈密顿量：

$$H=\omega a^\dagger a+\frac{\Delta}{2}\left(a^2+(a^\dagger)^2\right)$$

这正是压缩态的生成哈密顿量。为了对角化 H，引入幺正变换 $S(r)=\exp\left\{\frac{r}{2}(a^2-(a^\dagger)^2)\right\}$，参数 r 满足：

$$\tanh(2r)=\frac{\Delta}{\omega}$$

经过变换后，$b\equiv S^\dagger(r)aS(r)=a\cosh r-a^\dagger\sinh r$，哈密顿量对角化为：

$$S^\dagger(r)HS(r)=Eb^\dagger b+\text{const},\qquad E=\sqrt{\omega^2-\Delta^2}$$

这与费米子版本的 BdG 变换（如超导 BCS 理论中的粒子-空穴变换 $c_k=u_k\gamma_k+v_k\gamma^\dagger_{-k}$）**在数学结构上完全平行**：两者都是通过线性混合产生/湮灭算符来消除哈密顿量中的非对角配对项。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：为了保持对易关系 $[b,b^\dagger]=1$，由 $b=ua+va^\dagger$ 可得 $u^2-v^2=1$，因此用双曲函数 $(\cosh r,\sinh r)$ 参数化；
- **费米子**：为了保持反对易关系 $\{c,c^\dagger\}=1$，由 $c=u\gamma+v\gamma^\dagger$ 可得 $u^2+v^2=1$，因此用三角函数 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 参数化。

2.7 拓展延伸

- **复数参数** $\xi=re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi)aS(\xi)=a\cosh r-a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标算符 $X_{\theta/2}=X\cos(\theta/2)+P\sin(\theta/2)$ 和 $P_{\theta/2}=-X\sin(\theta/2)+P\cos(\theta/2)$，则标度变换沿倾斜轴进行：$S^\dagger(\xi)X_{\theta/2}S(\xi)=e^{-r}X_{\theta/2}$，$S^\dagger(\xi)P_{\theta/2}S(\xi)=e^{r}P_{\theta/2}$。此时 $S^\dagger(\xi)XS(\xi)$ 和 $S^\dagger(\xi)PS(\xi)$ 一般不再是单独的 X 或 P，而是两者的线性组合。