

2024 年高考河北卷化学试题

一、单选题

1. 燕赵大地历史悠久，文化灿烂。对下列河北博物院馆藏文物的说法错误的是




战国宫门青铜铺首

西汉透雕白玉璧

五代彩绘石质浮雕

元青花釉里红瓷盖罐

- A. 青铜铺首主要成分是铜锡合金
B. 透雕白玉璧主要成分是硅酸盐
C. 石质浮雕主要成分是碳酸钙
D. 青花釉里红瓷盖罐主要成分是硫酸钙
2. 关于实验室安全，下列表述错误的是
- A. BaSO_4 等钡的化合物均有毒，相关废弃物应进行无害化处理
B. 观察烧杯中钠与水反应的实验现象时，不能近距离俯视
C. 具有  标识的化学品为易燃类物质，应注意防火
D. 硝酸具有腐蚀性和挥发性，使用时应注意防护和通风
3. 高分子材料在生产、生活中得到广泛应用。下列说法错误的是
- A. 线型聚乙烯塑料为长链高分子，受热易软化
B. 聚四氟乙烯由四氟乙烯加聚合成，受热易分解
C. 尼龙 66 由己二酸和己二胺缩聚合成，强度高、韧性好
D. 聚甲基丙烯酸酯(有机玻璃)由甲基丙烯酸酯加聚合成，透明度高
4. 超氧化钾(KO_2)可用作潜水或宇航装置的 CO_2 吸收剂和供氧剂，反应为 $4\text{KO}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{K}_2\text{CO}_3 + 3\text{O}_2$ ， N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
- A. 44gCO_2 中 σ 键的数目为 $2N_A$
B. 1molKO_2 晶体中离子的数目为 $3N_A$
C. $1\text{L}1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{CO}_3$ 溶液中 CO_3^{2-} 的数目为 N_A
D. 该反应中每转移 1mol 电子生成 O_2 的数目为 $1.5N_A$
5. 化合物 X 是由细菌与真菌共培养得到的一种天然产物，结构简式如图。下列相关表述错误的是



- A. 可与 Br_2 发生加成反应和取代反应
B. 可与 FeCl_3 溶液发生显色反应
C. 含有 4 种含氧官能团
D. 存在顺反异构
6. 下列实验操作及现象能得出相应结论的是

选项	实验操作及现象	结论
A	还原铁粉与水蒸气反应生成的气体点燃后有爆鸣声	H ₂ O具有还原性
B	待测液中滴加BaCl ₂ 溶液，生成白色沉淀	待测液含有SO ₄ ²⁻
C	Mg(OH) ₂ 和Al(OH) ₃ 中均分别加入NaOH溶液和盐酸，Mg(OH) ₂ 只溶于盐酸，Al(OH) ₃ 都能溶	Mg(OH) ₂ 比Al(OH) ₃ 碱性强
D	K ₂ Cr ₂ O ₇ 溶液中滴加NaOH溶液，溶液由橙色变为黄色	增大生成物的浓度，平衡向逆反应方向移动

A. A B. B C. C D. D

7. 侯氏制碱法工艺流程中的主反应为 $QR + YW_3 + XZ_2 + W_2Z = QWXZ_3 + YW_4R$ ，其中W、X、Y、Z、Q、R分别代表相关化学元素。下列说法正确的是


- A. 原子半径： $W < X < Y$ B. 第一电离能： $X < Y < Z$
 C. 单质沸点： $Z < R < Q$ D. 电负性： $W < Q < R$

8. 从微观视角探析物质结构及性质是学习化学的有效方法。下列实例与解释不符的是

选项	实例	解释
A	原子光谱是不连续的线状谱线	原子的能级是量子化的
B	CO ₂ 、CH ₂ O、CCl ₄ 键角依次减小	孤电子对与成键电子对的斥力大于成键电子对之间的斥力
C	CsCl晶体中Cs ⁺ 与8个Cl ⁻ 配位，而NaCl晶体中Na ⁺ 与6个Cl ⁻ 配位	Cs ⁺ 比Na ⁺ 的半径大
D	逐个断开CH ₄ 中的C-H键，每步所需能量不同	各步中的C-H键所处化学环境不同


A. A B. B C. C D. D

9. NH₄ClO₄是火箭固体燃料重要的氧载体，与某些易燃物作用可全部生成气态产物，如： $NH_4ClO_4 + 2C = NH_3 \uparrow + 2CO_2 \uparrow + HCl \uparrow$ 。下列有关化学用语或表述正确的是



- A. HCl的形成过程可表示为
 B. NH₄ClO₄中的阴、阳离子有相同的VSEPR模型和空间结构
 C. 在C₆₀、石墨、金刚石中，碳原子有sp、sp²和sp³三种杂化方式
 D. NH₃和CO₂都能作制冷剂是因为它们有相同类型的分子间作用力

10. 图示装置不能完成相应气体的发生和收集实验的是(加热、除杂和尾气处理装置任选)



选项	气体	试剂
A	SO ₂	饱和Na ₂ SO ₃ 溶液+浓硫酸
B	Cl ₂	MnO ₂ +浓盐酸
C	NH ₃	固体NH ₄ Cl+熟石灰
D	CO ₂	石灰石+稀盐酸

A. A


B. B

C. C

D. D

11. 在水溶液中, CN⁻可与多种金属离子形成配离子。X、Y、Z 三种金属离子分别与CN⁻形成配离子达平衡时,

$\lg \frac{c(\text{金属离子})}{c(\text{配离子})}$ 与 $-\lg c(\text{CN}^-)$ 的关系如图。



下列说法正确的是


A. 99%的 X、Y 转化为配离子时, 两溶液中CN⁻的平衡浓度: X>Y

B. 向 Q 点 X、Z 的混合液中加少量可溶性 Y 盐, 达平衡时 $\frac{c(X)}{c(X \text{ 配离子})} > \frac{c(Z)}{c(Z \text{ 配离子})}$

C. 由 Y 和 Z 分别制备等物质的量的配离子时, 消耗CN⁻的物质的量: Y<Z

D. 若相关离子的浓度关系如 P 点所示, Y 配离子的解离速率小于生成速率

12. 金属铋及其化合物广泛应用于电子设备、医药等领域。如图是铋的一种氟化物的立方晶胞及晶胞中 MNPQ 点的截面图, 晶胞的边长为a pm, N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是




A. 该铋氟化物的化学式为BiF₃

B. 粒子 S、T 之间的距离为 $\frac{\sqrt{11}}{4}a$ pm

C. 该晶体的密度为 $\frac{1064}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

D. 晶体中与铋离子最近且等距的氟离子有 6 个

我国科技工作者设计了如图所示的可充电Mg-CO₂电池, 以Mg(TFSI)₂为电解质, 电解液中加入 1, 3-丙二胺(PDA)以捕获CO₂, 使放电时CO₂还原产物为MgC₂O₄。该设计克服了MgCO₃导电性差和释放CO₂能力差的障碍, 同时改善了Mg²⁺的溶剂化环境, 提高了电池充放电循环性能。




回答下列问题。

13. 下列说法错误的是

- A. 放电时，电池总反应为 $2\text{CO}_2 + \text{Mg} = \text{MgC}_2\text{O}_4$
- B. 充电时，多孔碳纳米管电极与电源正极连接
- C. 充电时，电子由Mg电极流向阳极， Mg^{2+} 向阴极迁移
- D. 放电时，每转移1mol电子，理论上可转化1mol CO_2

14. 对上述电池放电时 CO_2 的捕获和转化过程开展了进一步研究，电极上 CO_2 转化的三种可能反应路径及相对能量变化如图(*表示吸附态)。



下列说法错误的是

- A. PDA捕获 CO_2 的反应为


$$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCOOH}$$
- B. 路径 2 是优先路径，速控步骤反应式为

$$*\text{CO}_2^- + \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCOOH} + \text{e}^- \longrightarrow *\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$$
- C. 路径 1、3 经历不同的反应步骤但产物相同；路径 2、3 起始物相同但产物不同
- D. 三个路径速控步骤均涉及 $*\text{CO}_2^*$ 转化，路径 2、3 的速控步骤均伴有 PDA 再生

二、解答题

15. 市售的溴(纯度99%)中含有少量的 Cl_2 和 I_2 ，某化学兴趣小组利用氧化还原反应原理，设计实验制备高纯度的溴。回答下列问题：

(1) 装置如图(夹持装置等略)，将市售的溴滴入盛有浓 CaBr_2 溶液的 B 中，水浴加热至不再有红棕色液体馏出。仪器 C 的名称为_____； CaBr_2 溶液的作用为_____；D 中发生的主要反应的化学方程式为_____。




(2)将 D 中溶液转移至____(填仪器名称)中,边加热边向其中滴加酸化的 KMnO_4 溶液至出现红棕色气体,继续加热将溶液蒸干得固体 R。该过程中生成 I_2 的离子方程式为_____。

(3)利用图示相同装置,将 R 和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体混合均匀放入 B 中,D 中加入冷的蒸馏水。由 A 向 B 中滴加适量浓 H_2SO_4 ,水浴加热蒸馏。然后将 D 中的液体分液、干燥、蒸馏,得到高纯度的溴。D 中蒸馏水的作用为_____和_____。

(4)为保证溴的纯度,步骤(3)中 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体的用量按理论所需量的 $\frac{3}{4}$ 计算,若固体 R 质量为 m 克(以 KBr 计),则需称取_____g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ($M=294\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)(用含 m 的代数式表示)。

(5)本实验所用钾盐试剂均经重结晶的方法纯化。其中趁热过滤的具体操作为漏斗下端管口紧靠烧杯内壁,转移溶液时用_____,滤液沿烧杯壁流下。

16. V_2O_5 是制造钒铁合金、金属钒的原料,也是重要的催化剂。以苛化泥为焙烧添加剂从石煤中提取 V_2O_5 的工艺,具有钒回收率高、副产物可回收和不产生气体污染物等优点。工艺流程如下。



已知:i 石煤是一种含 V_2O_3 的矿物,杂质为大量 Al_2O_3 和少量 CaO 等;苛化泥的主要成分为 CaCO_3 、 NaOH 、 Na_2CO_3 等。

ii 高温下,苛化泥的主要成分可与 Al_2O_3 反应生成偏铝酸盐;室温下,偏钒酸钙 $[\text{Ca}(\text{VO}_3)_2]$ 和偏铝酸钙均难溶于水。

回答下列问题:

(1)钒原子的价层电子排布式为_____;焙烧生成的偏钒酸盐中钒的化合价为_____,产生的气体①为_____(填化学式)。

(2)水浸工序得到滤渣①和滤液,滤渣①中含钒成分为偏钒酸钙,滤液中杂质的主要成分为_____(填化学式)。

(3)在弱碱性环境下,偏钒酸钙经盐浸生成碳酸钒发生反应的离子方程式为_____; CO_2 加压导入盐浸工序可提高浸出率的原因为_____;浸取后低浓度的滤液①进入_____(填工序名称),可实现钒元素的充分利用。

(4)洗脱工序中洗脱液的主要成分为_____(填化学式)。

(5)下列不利于沉钒过程的两种操作为_____(填序号)。


a. 延长沉钒时间 b. 将溶液调至碱性 c. 搅拌 d. 降低 NH_4Cl 溶液的浓度

17. 氯气是一种重要的基础化工原料,广泛应用于含氯化工产品的生产。硫酰氯及 1, 4-二(氯甲基)苯等可通过氯化反应制备。

(1)硫酰氯常用作氯化剂和氯磺化剂,工业上制备原理如下: $\text{SO}_2(\text{g})+\text{Cl}_2(\text{g})\rightleftharpoons\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ $\Delta H=-67.59\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。


①若正反应的活化能为 $E_{\text{正}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则逆反应的活化能 $E_{\text{逆}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (用含 $E_{\text{正}}$ 的代数式表示)。

②恒容密闭容器中按不同进料比充入 $\text{SO}_2(\text{g})$ 和其 $\text{Cl}_2(\text{g})$ ，测定 T_1 、 T_2 、 T_3 温度下体系达平衡时的 $\Delta p(\Delta p = p_0 - p, p_0$ 为体系初始压强， $p_0 = 240 \text{ kPa}$ ， P 为体系平衡压强)，结果如图。




上图中温度由高到低的顺序为____，判断依据为____。M点 Cl_2 的转化率为____， T_1 温度下用分压表示的平衡常数 $K_p = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kPa}^{-1}$ 。

③下图曲线中能准确表示 T_1 温度下 Δp 随进料比变化的是____(填序号)。



(2) 1, 4-二(氯甲基)苯(D)是有机合成中的重要中间体，可由对二甲苯(X)的氯化反应合成。对二甲苯浅度氯化时反应过程为




以上各反应的速率方程均可表示为 $v = kc(A)c(B)$ ，其中 $c(A)$ 、 $c(B)$ 分别为各反应中对应反应物的浓度， k 为速率常数($k_1 \sim k_5$ 分别对应反应①~⑤)。某温度下，反应器中加入一定量的X，保持体系中氯气浓度恒定(反应体系体积变化忽略不计)，测定不同时刻相关物质的浓度。已知该温度下， $k_1:k_2:k_3:k_4:k_5 = 100:21:7:4:23$ 。

①30min时， $c(X) = 6.80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，且30~60min内 $v(X) = 0.042 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，反应进行到60min时， $c(X) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。


②60min时， $c(D) = 0.099 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，若0~60min产物T的含量可忽略不计，则此时 $c(G) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；60min后，随T的含量增加， $\frac{c(D)}{c(G)}$ ____(填“增大”“减小”或“不变”)。

18. 甲磺司特(M)是一种在临床上治疗支气管哮喘、特应性皮炎和过敏性鼻炎等疾病的药物。M的一种合成路线如下(部分试剂和条件省略)。



回答下列问题：

- (1) A 的化学名称为_____。
 - (2) B $\rightarrow$ C 的反应类型为_____。
 - (3) D 的结构简式为_____。
 - (4) 由 F 生成 G 的化学方程式为_____。
 - (5) G 和 H 相比，H 的熔、沸点更高，原因为_____。
 - (6) K 与 E 反应生成 L，新构筑官能团的名称为_____。
 - (7) 同时满足下列条件的 I 的同分异构体共有_____种。
- (a) 核磁共振氢谱显示为 4 组峰，且峰面积比为 3:2:2:2；

(b) 红外光谱中存在 C = O 和硝基苯基()吸收峰。

其中，可以通过水解反应得到化合物 H 的同分异构体的结构简式为_____。