

猫肾病文献总目录与速查

共 69 篇 · 生成于 2026-09-18 · 与《猫肾病文献总集·卷一至卷六》配套

使用说明：本册是整套文献的索引与速查。每条给出中文标题、来源（期刊/年份/DOI）与中文要点，按卷分组；要点来自原文摘要或中文译文开头，引用数字前请回到原文核对。配套全文合集为《猫肾病文献总集·卷X》，PDF 阅读器侧栏书签可直接跳转到任意一篇。

#	文献（中文标题 / 原文标题 / 要点）	来源	页
1	卷1 • iCatCare 2026猫CKD诊断与管理共识指南 2026 iCatCare consensus guidelines on the diagnosis and management of chronic kidney disease in cats - PMC 2026年 iCatCare 关于猫慢性肾病（CKD）的诊断和管理共识指南 Samantha Taylor 1, Natalie Finch 2, Sarah Caney 3, Jonathan Elliott 4, Rebecca Geddes 5, Femke Mortier 6, Valerie Parker 7, Jessica Quimby 8, Gilad Segev 9, Joanna White 10 实际意义：慢性肾脏疾病（CKD）在老年猫中很常见。早期诊断可以促进干预，减缓疾病进展并最小化临床症状。根据国际肾脏研究协会（IRIS）CKD分期系统进行管理，可以延长患病猫的生...	—	135
2	卷1 • iCatCare 2026家长指南_Cat Carer Guide	—	10
3	卷1 • IRIS 2026 CKD分期指南（官方） 1. Staging of Chronic Kidney Disease based on blood creatinine and SDMA concentrations 1. 基于血肌酐和 SDMA 浓度对慢性肾脏疾病（CKD）的分期 在确诊慢性肾脏疾病（CKD）后，需要进行分期，以便为犬猫患者提供适当的治疗和监测。分期最初基于空腹血肌酐或空腹血 SDMA 浓度，或者（更好地）两者同时测定，并且在至少两次测定的水化、稳定患者中进行。然后，根据蛋白尿和血压对狗或猫进行亚分期。使用这些标准，可以针对这些病例提出一些经验性建议，关于使用哪种类型的治疗是合理的。此外，还可以根据临床经验对治疗的可能反应进行预测。* 血肌酐浓度适用于中等体型的狗——极端体型的狗可能有所不同。SDMA 的推荐依据已发表的文献，这些文献使用 IDEXX 专有技术测量 SDMA。目前尚不清...	—	7
4	卷1 • IRIS 2026猫CKD治疗建议（官方） Treatment recommendations fall into two broad categories, namely: ©2026 国际肾脏关心协会（IRIS）有限公司。IRIS有限公司是在英国注册的独立非营利性担保有限责任公司（注册号10213173）。所有慢性肾脏疾病（CKD）的治疗都需要根据个体患者进行定制。以下建议是大多数猫在各阶段的有用起点。对这些患者进行连续监测是理想的，并且治疗应根据治疗反应进行调整。请注意，疾病分期是在诊断出CKD后进行的——仅仅血清肌酐或SDMA浓度升高并不能诊断CKD。治疗建议大致分为两类，即：1. 那些能够减缓慢性肾病（CKD）进展的治疗，从而更长时间地保留残余肾功能的方案 2. 那些能够改善猫生活质量的治疗，针对CKD的临床症状 一般来说，在CKD的早期阶段（1期和2...	—	22
5	卷1 • IRIS CKD口袋指南2026（官方） Step 1: Diagnose CKD Clinical signs and physical examination findings worsen with increasing severity of kidney disease ©2026 国际肾脏关切学会（IRIS）有限公司。IRIS有限公司是在英国注册的独立非营利组织（注册编号 10213173）。慢性肾脏疾病（CKD）的诊断基于对稳定患者所有可用临床和诊断信息的评估。CKD 诊断后，IRIS 董事会建议使用血清肌酐或 SDMA（最好两者都用）来分期CKD，并根据动脉血压和蛋白尿的评估进行子分期。©2026 国际肾脏关切学会（IRIS）有限公司。IRIS有限公司是在英国注册的独立非营利组织（注册编号 10213173）。步骤 1: 诊断CKD 临床体征和体格检查结果会随着肾脏疾病严重程度增加而恶化 临床表现 考虑年龄、性别、品种易感性及相关病史信息，包...	—	4
6	卷1 • IRIS 猫CKD矿物质骨病FGF-23技术综述 Recent advances in Mineral and Bone Disorders in CKD — IRIS 慢性肾脏疾病（CKD）中矿物质和骨疾病的最新进展 Henk van den Broek & Jonathan Elliott, 英国伦敦 高磷血症是猫和狗慢性肾脏疾病（CKD）病程进展和生存的已知风险因素，多项研究已显示，通过喂食限制磷的临床肾脏饮食降低血清磷浓度对这些动物有益（Elliott 等，2000；Jacob 等，2002；Plantinga 等，2005；Ross 等，2006；Boyd 等，2008；Chakrabarti 等，2012）。由于CKD导致病变肾脏每日排磷能力下降，被认为是钙-磷稳态、骨疾病和软组织钙化等生化异常的根本原因，这些情况统称为慢性肾脏疾病（CKD）矿物质和...	—	3
7	卷1 • AAFP2021猫老年照护指南 2021 AAFP Feline Senior Care Guidelines 《2021年AAFP猫咪老年护理指南》由猫临床医学专家工作组编写，是2009年发布指南的更新和扩展。指南强调对个体患者的评估和衰老过程，并引用其他猫科诊所指南，以便更全面地讨论特定疾病。关注每只猫咪鼓励并赋能主人参与猫咪的每一步护理。体格检查和病史采集中的全面讨论，有助于根据猫咪及其家庭量身定制护理方案。每位患者的评估中会引入视频和连续历史测量分析。本指南介绍了新兴的虚弱概念，并描述了其在老年猫评估中的应用方法。讨论了最低数据库诊断，并提供了额外调查考虑的建议。例如，血压评估被列为明显健康和患病猫的最低诊断程序。猫...	Journal of Feline Medicine and Sur 2021	85

8	卷1 • AAHA-AAFP2021猫生命阶段指南 2021 AAHA/AAFP Feline Life Stage Guidelines 这些指南由一个由猫科临床医学专家组成的工作组编写，是对2010年发布的AAFP-AAHA猫生命周期指南的更新和扩展。该指南同时发表于《猫科医学与外科杂志》（第23卷，第3期，页211–233，DOI: 10.1177/1098612X21993657）和《美国动物医院协会杂志》（第57卷，第2期，页51–72，DOI: 10.5326/JAAHA-MS-7189）。与早期指南相比，一个值得注意的变化是将猫的生命周期划分为五个阶段，包括四个明确的与年龄相关的阶段（幼猫、青年成年猫、成熟成年猫和老年猫）以及生命终末阶段...	Journal of Feline Medicine and Sur 2021	62
9	卷1 • ISFM猫慢性肾脏病共识指南 ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis and Management of Feline Chronic Kidney Disease - PMC 国际猫科医学会（ISFM）关于猫慢性肾病（CKD）的诊断和管理共识指南 Andrew H Sparkes 1,*，Sarah Caney 2，Serge Chalhoub 3，Jonathan Elliott 4，Natalie Finch 5，Isuru Gajanayake 6，Catherine Langston 7，Hervé P Lefebvre 8，Joanna White 9，Jessica Quimby 10 实际意义：慢性肾病（CKD）是老年猫最常被诊断的疾病之一。在大多数猫中，CKD也是一种进行性疾病，可能伴随多种临床和临床病理变化。这些ISFM共识指南...	—	79
10	卷2 • 猫AIM蛋白与猫肾病易感性 Impact of feline AIM on the susceptibility of cats to renal disease www.nature.com/scientificreports 猫 AIM 对猫肾脏易感性的影响 Ryoichi Sugisawa1,*，Emiri Hiramoto1,*，Shigeru Matsuoka1,2，Satomi Iwai3，Ryosuke Takai1，Tomoko Yamazaki1，Nobuko Mori1,4，Yuki Okada5，Naoki Takeda6，Ken-ichi Yamamura6，肾功能衰竭由于其不可治愈性和患者医疗费用高昂，是最重要的社会问题之一。通过阐明猫对肾脏疾病高度易感的潜在机制，我们在此证明血清AIM蛋白从IgM的有效解离...	—	13
11	卷2 • 猫AIM外显子3变异与自然CKD进展 The protein apoptosis inhibitor of macrophages (AIM) is involved in kidney repair. An AIM (fAIM) genetic variant in 猫巨噬细胞凋亡抑制因子：外显子3变异等位基因与自然进程之间的潜在联系 巨噬细胞凋亡抑制蛋白（AIM）参与肾脏修复。猫的AIM（fAIM）基因变异导致结构域重复，可能会削弱fAIM对肾功能的保护作用。为了确认先前描述的fAIM结构域重复是由基因组水平上的外显子重复引起的，并确定患有慢性肾病（CKD）的猫如果携带变异fAIM等位基因，其肾功能下降的风险是否高于fAIM野生型猫。分析了华盛顿州立大学就诊猫的病历（n=172）和基因组DNA样本（n=100），这些猫均被诊断为CKD。使用测序和PCR来确定fAIM基因型。根据血清肌酐（SCr）浓度，猫按照IRIS CKD分期进行表型分类。使用Fish...	—	17
12	卷2 • AIM外显子3重复变异患病率 Prevalence of the AIM exon 3 duplication variant, a putative biomarker associated with progression of kidney disease, in 1000 cats 目标 一种称为巨噬细胞凋亡抑制因子（AIM）的蛋白有助于清除肾小管的废物。一些家猫在AIM基因的外显子3中存在重复，产生一种包含额外清道夫受体半胱氨酸富集亚基的四结构域AIM蛋白。这种变异已被认为与慢性肾病风险增加相关。初步研究表明，这种遗传变异的纯合状态在约20%的猫群体中存在。本研究目的是确定在大量家猫中野生型、杂合型和纯合型AIM外显子3基因型的流行情况。方法 从华盛顿州立大学个体化医学项目DNA银行中存档的1000只由客户拥有的猫的基因组DNA通过滴度数字PCR分析，以确定AIM外显子3的拷贝数变异。样本...	Journal of Feline Medicine and Sur 2026	12
13	卷2 • 猫CKD病理生理与风险因素综述 Feline CKD: Pathophysiology and risk factors — what do we know? - PMC 猫慢性肾病（CKD）的病理生理学与风险因素——我们了解多少？ Brice S Reynolds 1，Hervé P Lefebvre 1,* 实用相关性：慢性肾病（CKD）是猫中最常见的疾病之一，近年来发病率有所增加。虽然其潜在病因很少被确定，但猫CKD的常见最终结果是肾小管间质纤维化。了解CKD的病理生理学对于优化个体化患者管理是必要的，尤其是在诊断和治疗肾外并发症方面。患者群体：CKD在老年猫和高龄猫中最为常见，但在任何患有输尿管结石、甲状腺功能亢进、逆转录病毒感染、系统性高血压、心血管疾病或泌尿道感染的猫患者中也应考虑。证据基础：我们对慢性肾病（CKD）发病机制的了解大多是通过...	—	38
14	卷2 • 随机年龄组猫CKD患病率与分期 Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint di 随机从四个年龄组中选择的猫以及为退行性关节疾病研究招募的猫 Christina L Marino 1，B Duncan X Lascelles 2,3，Shelly L Vaden 1,3，Margaret E Gruen 2,4，Steven L Marks 1，慢性肾病（CKD）和退行性关节疾病在老年猫中都被认为是常见病。关于这两种疾病的共患率的信息尚缺。这项回顾性研究旨在确定两组猫中慢性肾病（CKD）的患病率：分别为从四个均匀分布的年龄组中随机选出的猫（RS组）以及为退行性关节疾病研究招募的猫（DJD组），并评估这两组猫中CKD与DJD的共存情况。RS组从6个月至20岁的四个...	—	22
15	卷2 • 猫CKD流行病学影响因素分析 Epidemiology of Chronic Kidney Disease (CKD) in Cats: An Analysis of the Factors Involved. 慢性肾病（CKD）是猫最常见且临床上相关的代谢性疾病之一，影响了相当比例的成年猫和老年猫群体。CKD的患病率随年龄增加而升高，据估计，超过10岁的猫中患病率为20%至50%。	Life (Basel, Switzerland) 2025	42

该疾病的病因涉及遗传易感性、饮食因素以及接触毒素或伴随疾病，这些因素可能加速肾脏损伤的进展。本研究综合了科学文献的数据，并结合对一组120只猫在四年期间进行的临床流行病学分析。结果显示，在研究队列中慢性肾病（CKD）（CKD）的总体患病率较高，九岁以上的猫患病频率明显更高，尤其是纯种猫。男性的患病率略高于女性，而生殖状态显示绝育猫患CKD的风险...

16 **卷2·希腊猫CKD真实世界数据临床特征与共病** [Veterinary sciences 2026](#) 21

A Real-World Data Analysis on Feline Chronic Kidney Disease in Greece: Clinical Profiles, Comorbidities, and Quality of Life.

猫慢性肾病（fCKD）在老年猫中非常常见，影响高达80%，并且是猫发病率的主要原因之一，其诊断具有挑战性。本研究旨在描述希腊真实临床环境中患有fCKD猫的临床特征、共病情况和生活质量。从208只主人拥有的fCKD猫中收集了真实世界数据进行分析，包括人口学信息、临床发现、身体和肌肉状况评分以及根据国际肾脏学会（IRIS）指南由临床医生评定的分期。此外，宠物主人还完成了VetMetrica™健康相关生活质量（HRQL）问卷。使用适当的统计分析评估了共病、IRIS分期与HRQL各领域之间的关联。在66.8%的猫中至少存在...

17 **卷2·多囊肾对猫慢性肾功能不全发生的贡献** [Veterinary Research Forum 2026](#) 19

Contribution of polycystic kidney disease to the development of chronic renal dysfunction in cats

多囊肾病（PKD）是一种遗传性疾病，其特征是肾囊肿逐渐形成，导致肾功能受损，并增加慢性肾病（CKD）的风险。本前瞻性、为期18个月的纵向研究评估了12只患有PKD的猫的诊断和预后指标，结合超声成像与生化分析进行研究。研究记录了囊肿体积增加14.00%、肾脏长度增大7.00%，以及血浆肌酐、磷和血BUN水平显著升高，强调了这些指标与疾病进展的相关性。血液学分析显示，与晚期CKD阶段相关的进行性贫血，进一步勾勒出PKD的全身性影响。这些研究结果强调，即使宠物主人和兽医提供了细心护理，患有多囊肾病（PKD）的猫咪慢性肾病...

18 **卷2·老龄化猫的发病共病与死亡模式7年队列** [Frontiers in Veterinary Science 2026](#) 18

Patterns of morbidity, multimorbidity, and mortality in aging cats: findings from seven years of the Cat Prospective Ageing and Welfare Study.

引言 随着年龄增长，猫的发病率、多发性疾病和死亡风险增加。然而，在该物种中，纵向队列研究相对有限。关于与年龄相关疾病的流行率和发生率、疾病组合以及死亡相关的因素的信息，可以提供关于衰老对家猫福祉影响的见解。方法 在一项前瞻性纵向队列研究中，对209只老龄猫的常见年龄相关疾病的流行率和发生率、多发性疾病的模式以及死亡的原因和风险因素进行了调查。猫在中年时入组，并每6个月接受一次兽医检查，直到死亡或审查，最长为7年。结果 共进行了1,241次检查（中位随访时间4.4年；范围0.0–6.9年）。在整个研究期间，牙科疾...

19 **卷2·慢性肾病急性加重结局差于单纯AKI** [Frontiers in Veterinary Science 2026](#) 9

Dogs and cats with acute-on-chronic kidney disease have worse outcomes than those with acute kidney injury following renal replacement therapy

目的 比较接受肾脏替代治疗（RRT）的急性加重慢性肾病（ACKD）犬猫与急性肾损伤（AKI）犬猫的出院生存率及长期预后，并识别与预后相关的因素。设计 回顾性观察设计。地点 单一转诊医院。动物 136 只客户拥有的动物（67 只犬和 69 只猫），在 2017 年至 2024 年间接受 RRT 治疗。测量及主要结果 本回顾性观察队列研究回顾了转诊医院的病历。动物被分类为 ACKD（n = 66）或 AKI（n = 70）。短期生存率通过出院生存率、受限平均生存时间（RMST）和逻辑回归模型进行评估。使用Kaplan-...

20 **卷2·猫CKD肾皮质铁处理与缺氧反应基因表达** [Veterinary Sciences 2026](#) 13

Iron-Handling, Lipid-Oxygenation, and Hypoxia-Response Gene Expression in the Renal Cortex of Cats with Chronic Kidney Disease: An Analysis-Plan-Guide

慢性肾病（CKD）（CKD）在老年猫中很常见，但皮质水平的转录关系在缺氧反应、铁处理和脂质氧化方面尚不清楚。本次基于分析计划的、假设生成的二次分析使用了公共猫肾RNA测序数据（GSE303653）。内部计划在审查当前表达结果之前，固定了基因面板、复合指标构建、主要推理检验和质量控制阈值，但未公开注册。经过技术质量控制后，分析了来自对照组、CKD 1/2 期和 CKD 3/4 期猫的21个肾皮质样本。使用似然比检验作为主要的面板级筛选，对23基因面板和全转录组差异表达进行了评估，同时以成对DESeq2对比、斯皮尔曼摘...

21 **卷3·SDMA与肌酐在猫CKD肾功能评估中的对比** — 13

Symmetric dimethylarginine (SDMA) has been shown to be an accurate and precise biomarker for calculating

血清对称性二甲基精氨酸和肌酐浓度作为肾功能的比较 对称二甲基精氨酸（SDMA）已被证明是计算人体估算肾小球滤过率（GFR）的准确且精确的生物标志物，同时也是比血清肌酐浓度（sCr）更敏感的评估肾功能障碍的生物标志物。本回顾性研究的目的是报告在猫体内测量血清SDMA浓度用于在通过常规sCr测量诊断之前检测慢性肾病（CKD）的实用性。慢性肾病（CKD）猫（n = 21）包括持续氮质血症≥3个月的猫（n = 15）、非氮质血症但GFR比正常猫的中位数GFR下降>30%的猫（n = 4），以及非氮质血症但患有草酸钙肾结石的猫（n = 2）。健康老年猫（n = 21）选自同一群体。对氨基二甲基精氨酸（...

22 **卷3·SDMA肌酐与GFR相关性第三方研究** — 15

Glomerular filtration rate (GFR) is the gold standard in assessing renal function but is impractical. Serum creatinine

猫在正常和肾功能下降情况下的浓度与肾小球滤过率（GFR）。肾小球滤过率（GFR）是评估肾功能的金标准，但操作不便。血清肌酐（sCr）在识别早期慢性肾病（CKD）方面敏感性有限，而对称二甲基精氨酸（SDMA）已被商业化为更准确的生物标志物。在猫中比较SDMA和sCr与GFR的研究有限。为进一步调查SDMA在非氮质血症和氮质血症猫中的诊断性能。研究对象为

49只客户拥有的猫：17只CKD猫，15只糖尿病（DM）猫，17只健康猫。回顾性研究，利用来自有记录的sCr和GFR结果的猫剩余血样进行SDMA分析。使用相关系数、敏感性、特异性和受试者工作特征曲线评估了SDMA和血清肌酐(sCr)的诊断性能。与...

23	卷3 • 纵向评估SDMA与肌酐不一致作为GFR标志物 Longitudinal evaluation of discordant symmetric dimethylarginine and creatinine as markers of glomerular filtration rate in radioiodine-treated hypert 目的 本研究的目的是确定在接受放射性碘（RAI）治疗的成熟和老年甲状腺功能亢进猫中，血清SDMA（SDMA）和肌酐浓度与GFR（GFR）不一致的频率及临床意义。研究的次要目标是比较两种SDMA上参考区间（RIs；>14和≥18 μg/dl）及肌酐（≥175 μmol/l）在检测GFR下降方面的敏感性和特异性，并评估两种生物标志物的个体内变异性。方法 对27只接受低剂量RAI治疗的客户拥有的甲状腺功能亢进猫进行了前瞻性纵向研究。在基础时、RAI治疗后1个月、6个月和12个月，对猫的甲状腺状况、GFR（GFR）、S... Journal of Feline Medicine and Sur 2026 25
24	卷3 • 猫CKD进展从病理生理到新兴生物标志物 Understanding the Progression of Chronic Kidney Disease in Cats: From Pathophysiology to Emerging Biomarkers 猫慢性肾病（CKD）是老年猫死亡的主要原因，其特征是肾功能的进行性和不可逆性丧失。尽管患病率很高，但由于肾单位的代偿机制以及传统生物标志物的敏感性有限，早期诊断仍然具有挑战性，从而产生了一个诊断空白，需要探索新的生物标志物以实现更早的检测。本文综述了该疾病的复杂病理生理学，包括肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活、肾小管间质纤维化和矿物质代谢紊乱。通过分析最新的科学文献，本文评估了当前的诊断现状以及新兴生物标志物的临床相关性。证据表明，SDMA和FGF-23-23可改善早期代谢和滤过变化的检测，而尿液生物标志物如胱抑素... Veterinary Sciences 2026 23
25	卷3 • 甲亢治疗后猫SDMA浓度的变化 Changes in serum symmetric dimethylarginine concentrations after treatment of feline hyperthyroidism with antithyroid medications. 目的 本研究的目的是报告猫甲状腺功能亢进症在使用抗甲状腺药物治疗后血清肌酐和对称性二甲基精氨酸（SDMA）浓度的变化，并比较治疗前血清肌酐和SDMA水平在治疗后出现或未出现氮质血症猫之间的差异。方法 在这项回顾性研究中，确定了在治疗后1个月（T1）和/或2-9个月（T2）恢复至甲状腺功能正常（总甲状腺素[TT4]浓度7-40nmol/l）的甲亢猫，并根据血清肌酐浓度定义的肾功能状态进行分组。比较使用非参数统计方法进行，并使用Spearman相关系数评估相关性。数据以中位数（最小值-最大值）表示。结果 共纳入19例... Journal of feline medicine and sur 2026 21
26	卷3 • 血清胱抑素C与尿胱抑素B提升猫CKD诊断精度 Beyond traditional biomarkers: do serum cystatin C and urinary cystatin B improve diagnostic precision in feline and canine renal disease? A systemati 慢性肾病（CKD）（CKD）是猫和狗中最常见的肾病，尤其在老年动物中，而急性肾损伤（AKI）则是一种急性发作的疾病，伴随高发病率和高死亡率。血清肌酐和尿素被广泛用于肾功能评估；然而，它们在早期发现肾功能障碍方面的敏感性较低。在此背景下，血清胱抑素C（sCysC）和尿液胱抑素B（uCysB）等替代生物标志物被作为潜在的诊断工具进行了研究。本研究按照PRISMA指南进行了荟萃分析，以评估这些生物标志物在患有CKD的猫和AKI的狗中的表现。纳入了三项关于sCysC的研究和两项关于uCysB的研究，比较了患病猫狗与健康对照... Frontiers in Veterinary Science 2026 14
27	卷3 • 尿KIM-1作为非氮质血症猫尿道梗阻肾小管损伤标志 Urinary KIM-1 as a Marker of Renal Tubular Injury Associated with Urethral Obstruction in Non-Azotemic Cats Animals : an open access journal f 2026 23
28	卷3 • 猫CKD尿谷胱甘肽过氧化物酶4评价 Evaluation of urine glutathione peroxidase 4 in cats with chronic kidney disease. 引言铁死亡是一种独特的受调控细胞死亡形式，其特征是依赖铁的脂质过氧化，这种过氧化会破坏细胞膜并导致细胞死亡。谷胱甘肽过氧化物酶4（GPX4）是唯一能够在细胞内还原脂质过氧化产物的酶，是该过程的关键调控因子。目的GPX4在猫慢性肾病（CKD）（CKD）中的作用此前尚未研究。本研究旨在确定尿液中GPX4水平是否与猫的CKD严重程度相关，并评估其作为疾病进展生物标志物的潜力。方法使用商业猫ELISA试剂盒测定尿液中GPX4水平。计算尿GPX4与肌酐比值（UGCR）。研究纳入了十五只健康猫、61只慢性肾病（CKD）猫和六只... Frontiers in veterinary science 2025 11
29	卷3 • 猫肾功能方程分类器_概念验证 Evaluation of equation as a classifier for kidney function in domestic cats: a proof-of-concept study. 在人体医学中，估算GFR（eGFR）常用于评估肾功能。而在猫中，目前尚无可靠的eGFR公式。为了验证一个包含四种代谢物的人类eGFR方程是否能有效区分肾功能不同的猫，我们回顾性地纳入了两组猫群。第一组包括34只群体猫，第二组包括29只宠物猫。在猫血清中定量了代谢物标志物，并使用改良方程（eRFfel）估算肾功能。对于eRFfel作为二分类器的受试者工作特征曲线下面积（ROC AUC），第一组和第二组分别为0.9714和0.9958；作为三分类器时，第一组和第二组分别为0.9731和0.9643。队列1中，eRFfe... npj aging 2026 23
30	卷3 • 猫肾盂肾炎血清淀粉样蛋白A与尿KIM-1 Increased serum amyloid A and urinary kidney injury marker-1 concentrations in cats with pyelonephritis: a diagnostic accuracy study. 目的：研究血清淀粉样蛋白A、嗜中性粒细胞/淋巴细胞比率、单核细胞/淋巴细胞比率在诊断猫肾盂肾炎中的鉴别潜力，并评估肾小管损伤。材料与方法：诊断准确性研究，使用前瞻性入组猫和储存样本。根据诊断将猫分类为肾盂肾炎、输尿管梗阻、慢性肾病、亚临床菌尿、膀胱炎或健... The Journal of small animal practi 2026 40

康。比较不同组别的血清淀粉样蛋白A、嗜中性粒细胞:淋巴细胞比率、单核细胞:淋巴细胞比率及尿液肾损伤标志物-1。利用受试者工作特征曲线分析评估炎症生物标志物的表现。血清淀粉样蛋白A和尿液肾损伤标志物-1在一部分肾盂肾炎猫中连续测量。结果纳入了71只猫的样本（肾盂肾炎 ...

31	卷3 • 早晚期猫CKD血清非靶向代谢组学 Page 1/32 Untargeted metabolomic proling of serum from client-owned cats with early and late-stage chronic kidney disease 第1页/共32页 客户拥有的猫在早期和晚期慢性肾脏疾病（CKD）中的血清非靶向代谢组分析 Nora Jean Nealon 美国俄亥俄州立大学兽医学院 Stacie Summers 美国俄勒冈州立大学卡尔森兽医学院 Jessica Quimby 美国俄亥俄州立大学兽医学院 Jenessa Winston 美国俄亥俄州立大学兽医学院 发布日期：2023年11月9日 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3538472/v1 许可：□ □ 本作品已根据知识共享署名 4.0 国际许可协议获得许可。 阅读全文许可 其他声明：未报告竞争利益。正式版本：本文预印本的一个...	—	32
32	卷3 • 氮质血症前肠道来源尿素毒素改变 Alterations in gut-derived uremic toxins before the onset of azotemic chronic kidney disease in cats 标准文章 小动物内科 肾脏学/泌尿学 肠源性尿素素在发病前的变化 猫氮质血症性慢性肾病（CKD） Laurens Van Mulders 1,2 Ellen Vanden Broecke 1,2 Ellen De Paepe 2 Femke Mortier 1 Lynn Vanhaecke 2,3 Sylvie Daminet 1 1 根特大学兽医学院，小动物系，Merelbeke, 2 兽医学院，转化生理学、感染学系 公共卫生，整合代谢组学实验室，根特大学，梅雷尔贝克，3贝尔法斯特女王大学，学院 生物科学，全球食品安全研究所，贝尔法斯特，英国 Sylvie Daminet...	—	14
33	卷3 • 猫血浆FGF-23浓度与生存时间 Fibroblast growth factor-23 (FGF-23) and parathyroid hormone (PTH) are commonly increased in cats with azotemic 猫慢性肾病（CKD）中血浆成纤维细胞生长因子（FGF-23）-23浓度与生存时间的关系 成纤维细胞生长因子（FGF-23）-23（FGF-23）和甲状旁腺激素（PTH）在患有氮质血症性慢性肾病（CKD）的猫中通常升高。这两者都是人类患者生存时间的预测指标，但这些关系在猫中尚未被研究。为了研究在猫CKD诊断时血浆FGF-23和PTH浓度与生存时间及疾病在12个月内进展的关系。本研究纳入214只氮质血症猫（≥9岁），均由客户拥有。回顾性研究：评估氮质血症CKD诊断时的生化和尿液变量，包括血浆FGF-23和PTH浓度，通过Cox回归分析其对生存时间（全因死亡率）的预测作用，并通过逻辑回归分析其对12...	—	14
34	卷3 • 猫FGF-23血浓度scoping review This study undertook a scoping review of research on blood fibroblast growth factor 23 (FGF-23) concentrations in 猫血液成纤维细胞生长因子（FGF-23）23浓度在有慢性肾病（CKD）猫中的情况：一项范围性综述 本研究对健康非氮质血症猫和慢性肾病（CKD）猫的血液成纤维细胞生长因子（FGF-23）23（FGF-23）浓度研究进行了范围性综述，以描述现有文献的数量和性质，确定已发表的研究是否为在临床实践中使用FGF-23作为生物标志物提供了充分证据，并识别知识中存在的任何空白。研究设计和执行范围性综述时采用了PRISMA扩展范围性综述指南。利用在线数据库，识别了截止2022年12月前发表的健康猫和CKD猫血液FGF-23浓度的观察性和临床研究。提取了研究和人群特征以及FGF-23浓度的描述性数据。 共审查...	—	25
35	卷3 • 2019猫CKD硫酸吲哚酚与FGF-23关联研究 The association of indoxyl sulfate with fibroblast growth factor-23 in cats with chronic kidney disease - PMC 吲哚硫酸盐（IS）与慢性肾病（CKD）猫纤维母细胞生长因子-23的关联 叶育伦 1, 周志忠 1,2, 李雅珍 3,4, 已有报道显示，吲哚硫酸盐（IS）不仅会随着肾功能损害的严重程度而增加，还可能与慢性肾病（CKD）人类中与纤维母细胞生长因子-23（FGF-23）相关的骨异常有关的因素。目前尚不清楚这种IS与FGF-23之间的相关性是否同样存在于CKD猫中。IS的积累与CKD猫的FGF-23分泌有关。回顾性评估了20只临床健康猫和73只CKD猫病例。血浆中IS和FGF-23的浓度分别通过高效液相色谱和ELISA测定。进展定义为血清肌酐浓度在3个月内增加0.5 mg/dL。随着肾功能下降...	—	26
36	卷4 • 长期富无机磷日粮对成年猫肾脏的影响 Renal disease has a high incidence in cats, and some evidence implicates dietary P as well. To investigate this further, 长期食用富含无机磷的饮食对成年猫肾脏及磷的影响 肾脏疾病在猫中发病率较高，一些证据也表明饮食中的磷可能是一个因素。为进一步研究这一点，对健康成年猫进行了两项研究。研究1（36周）包括48只猫，按控制组或实验组饮食进行分层，提供1.2或4.8 g/1000 kcal（4184 kJ）磷（0或约3.6 g/1000 kcal（4184 kJ）无机磷，钙磷比Ca:P 1.2, 0.6）。研究2（29周）包括50只猫，按控制组或实验组饮食进行分层，提供1.3或3.6 g/1000 kcal（4184 kJ）磷（0或约1.5 g/1000 kcal（4184 kJ）无机磷，钙磷比Ca:P 1.2, 0....	—	38
37	卷4 • 健康猫短期高无机磷日粮损伤肾功能指标 Effect of a high phosphorus diet on indicators of renal health in cats - PMC 高磷饮食对猫肾脏健康指标的影响 Britta Dobenecker 1, Anna Webel 1, Sven Reese 1, Ellen Kienzle 1, 高磷摄入可能进一步损害患有慢性肾病（CKD）猫的肾脏健康。本文在猫这一自然患CKD发生率较高的物种上，测试了高磷（HP）饮食是否对健康动物具有肾毒性。十三只健康成年猫食用磷摄入过量的饮食（约为维持需求量的五倍），并将HP组与食用平衡控制饮食	—	13

	(CON组)的猫进行比较。试验持续29天(包括10天的粪便和尿液收集)。在试验末期测定了内源性肌酐清除率。新鲜尿液用于检测葡萄糖和蛋白质。葡萄糖尿和微量白蛋白尿仅在HP组的9/13只猫中观察到...		
38	卷4 • 并非所有形式的膳食磷都相同 Phosphorus is present in diets as naturally occurring P from raw materials or added as an inorganic salt. However, little is known 并非所有形式的膳食磷都是相同的:一种对猫血浆餐后磷浓度的评估 磷在饮食中以来自原材料的天然存在的磷或作为无机盐添加的形式存在。然而,对于猫的磷吸收的餐后动力学知之甚少。在此,我们描述了几项研究,量化了摄入不同组成饮食后的餐后动力学。简而言之,猫在随机交叉设计中摄取相当于其代谢能量需求50%的餐食。通过头静脉导管采集餐前基线血样,并在餐后定期重复测量至6小时,以评估全血离子化钙、血浆磷和甲状旁腺激素(PTH)浓度。含有4.8克总磷/4184千焦(1000千卡)、3.5克来自磷酸二氢钠(NaH₂PO₄)的磷/4184千焦(1000千卡)且钙磷比为0.6的饮食,使血浆磷从基线显著...	—	15
39	卷4 • 早期CKD猫不同蛋白磷与钙磷比日粮的临床进展 Dietary protein and phosphorus (P) restriction is the mainstay for nutritional management of chronic kidney disease 针对不同蛋白质和磷含量以及钙磷比的疾病患猫饮食 管理慢性肾病(CKD)的营养干预主要依赖于限制蛋白质和磷(P)的摄入。然而,对于早期CKD猫的适当限制水平仍不明确。本研究旨在探讨早期CKD猫对不同膳食蛋白质、磷及钙(Ca):磷比例的反应。研究对象为19只国际肾脏兴趣协会(IRIS)阶段1-2 CKD的研究用猫群。在一次机会性纵向病例研究中,这些猫首先喂食低蛋白(59 g/Mcal)、低磷(0.84 g/Mcal)干粮饮食(LP-LP; Ca:P=1.9)18个月,随后过渡到中蛋白(76-98 g/Mcal)、中磷(1.4-1.6 g/Mcal)干湿结合饮食方案(MP-MP; Ca:P=1.4-1....	—	25
40	卷4 • 膳食钙磷比对早期CKD猫离子钙稳态的影响 Effect of dietary Ca:P ratio on ionized calcium and calcium homeostasis in cats with early-stage chronic kidney disease. 该研究的目的是比较两种钙磷比不同的肾脏食品对患有慢性肾病(CKD)猫的高钙血症表现及钙稳态调节的影响。九只患有自然发生的IRIS I期或II期CKD的猫(年龄11.0 ± 2.0岁)先食用了老年健康食品28天,然后随机分为两组,分别喂食一种提供1.8 g/Mcal钙、1.3 g/Mcal磷、钙磷比为1.4:1(MOD-Ca:P)的食品,或一种提供2.4 g/Mcal钙、1.3 g/Mcal磷、钙磷比为1.8:1(HIGH-Ca:P)的食品,共56天。经过28天的清洗期后,猫群交叉喂食另一种测试食品。在每个研究周期的...	PLOS One 2026	13
41	卷4 • 猫肾脏肾钙质沉着与肾结石共存 Co-occurrence of nephrocalcinosis and nephrolithiasis in feline kidneys. 背景 肾钙沉积在患有肾结石的猫中很常见。了解这些疾病之间的关联可能有助于理解其发病机制。假设/目的 肾钙沉积与肾结石相关。动物 对175只归属客户的猫的肾脏进行了尸后评估。方法 一项观察性横断面研究。高分辨率微射线摄影用于识别肾结石,并将实质性矿化分为条纹状或点状。在微射线照片上量化矿化百分比。使用卡方检验和逻辑回归(含比值比[OR]和95%置信区间[CI])估计在猫的整体水平(任意一侧肾脏存在疾病)和单个肾脏水平上,肾钙沉积症与肾结石的关联。结果显示,54%的猫(95/175)存在肾结石,84%...	Journal of Veterinary Internal Med 2026	24
42	卷4 • 猫CKD补充镁的双盲随机对照试验 Plasma total magnesium concentration (tMg) is a prognostic indicator in cats with chronic kidney disease (CKD), 疾病:一项前瞻性双盲随机对照试验 猫的血浆总镁浓度(tMg)是慢性肾脏疾病(CKD)猫的预后指标,低镁血症与生存时间较短相关。目前尚未探索这一风险因素是否可以通过膳食镁补充来改变。评估富镁低磷饮食(PRD)对CKD-矿物质骨病(CKD-MBD)变量的影响。招募了60只甲状腺功能正常且患有氮质血症CKD的宠物猫,其中27只分配到富镁PRD组,33只分配到对照PRD组。前瞻性双盲、平行组随机试验。在PRD上稳定的CKD猫,且无高镁血症(tMg >2.43 mg/dL)或高钙血症(血浆游离钙浓度(iCa) >6 mg/dL)的猫被纳入研究。进行了意向治疗分析和依从方案分析(食用≥50%的研究饮食...	—	28
43	卷4 • CKD猫与健康猫血清维生素D代谢物无差异 Serum vitamin D metabolites do not differ between cats with chronic kidney disease and healthy cats. 目的 本研究旨在比较慢性肾病(CKD)猫与健康猫的综合维生素D代谢物谱。方法 共前瞻性招募了33只健康猫和66只CKD猫(六只国际肾脏兴趣协会[IRIS]阶段1,36只IRIS阶段2,18只IRIS阶段3,六只IRIS阶段4)。通过液相色谱-串联质谱法分析血清维生素D代谢物,包括25-羟基维生素D₃(25[OH]D₃)、3-表位-25-羟基维生素D₃(3-epi-25[OH]D₃)、1,25-二羟基维生素D₃(1,25[OH]D₂D₃;活性维生素D₃)和24,25-二羟基维生素D₃(24,25[OH]D₂D₃)。...	Journal of Feline Medicine and Sur 2026	15
44	卷4 • DHA对多囊肾早期CKD猫的肾脏保护先导试验 Renoprotective effects of docosahexaenoic acid in cats with early chronic kidney disease due to polycystic kidney disease: a pilot study - PMC 因多囊肾病导致的慢性肾脏疾病(CKD):一项初步研究 小林沙织 1,☒,川崎正孝 2,青野彩美 3,长冢顺子 3,桥本智明 2,佐藤丽子 1 富含 n-3 脂肪酸的脂质据报道对肾功能具有保护作用,其中二十二碳六烯酸(DHA)被认为特别有效。然而,目前尚无报告证明 DHA 富集脂质对患有慢性肾脏疾病(CKD)猫的肾脏保护作用。因此,本初步研究的目的是研究 DHA 富集鱼油对猫的肾脏保护作用。五只健康猫和五只因常染色体显性多囊肾病(PKD)导致的早期非氮	—	20

质血症 CKD 猫被口服给予液体形式的 DHA 富集鱼油（分别为每公斤体重 [BW] 250 或 500 毫克以及每公斤体重 250 毫克 DHA...

45	卷4 • 从常规益生菌到精准营养_伴侣动物功能性疾病 From conventional probiotics to precision nutrition: host-specific probiotics in canine and feline functional foods. 益生菌因其在维护肠道健康、调节微生物群和支持代谢稳态方面的作用，广泛应用于伴侣动物营养。本文总结了益生菌在狗和猫功能性食品中的近期进展。我们概述了益生菌的菌株资源、功能机制及稳定技术，重点关注其对肠道屏障功能、免疫调节和代谢健康的影响。此外，还讨论了当前面临的挑战，包括宿主特异性不足、缺乏严格临床试验以及处理稳定性差。未来提出了针对伴侣动物精准益生菌开发的方向。本综述为宠物食品行业益生菌的合理设计和规范化应用提供了理论基础。	Frontiers in veterinary science 2026	9
46	卷5 • 猫CKD疗法证据系统综述 Therapies for Feline Chronic Kidney Disease: What is the Evidence? - PMC 有什么证据? Philip Roudebush 1,5, David J Polzin 2, Sheri J Ross 3, Todd L Towell 1, Larry G Adams 4, S Dru Forrester 1 实用相关性 成功治疗和预防宠物肾脏疾病需要多维方法，以识别并消除原因或加重因素，定期提供专业检查和护理，并在必要时规划和实施全面的治疗方案。证据基础 多年来，已经开发或倡导了许多慢性肾脏疾病（CKD）的治疗和预防干预措施，但疗效或有效性的证据往往缺乏或高度不稳定。因此，本系统评价的主要目标是识别并批判性地评估支持各种猫慢性肾病（CKD）管理方法的证据；即液体治疗、钙三...	—	48
47	卷5 • 猫内科临床治疗学新旧药物更新 Over the past 10 years, feline medicine has significantly advanced through the addition of new pharmaceuticals and alternative 猫医学临床治疗学：旧药与新药的更新 实际意义： 在过去的10年里，猫科医学通过新增的用于猫的药物和替代制剂，以及对现有药物知识的提高，取得了显著进展。通过持续的药物开发，猫的治疗选择正在不断增加。临床挑战： 在治疗猫科疾病时会遇到许多特定于物种的临床挑战。此外，治疗选择可能因地域而异，并随时间变化。证据基础： 本综述文章讨论了关于某些较新治疗药物的现有证据，这些药物目前可供猫科医学从业者使用，或正在开发中并进行临床试验。它们的近期引入意味着对其中一些药物的证据仍在不断出现。文章介绍了这些药物的临床使用情况、可用的药代动力学和药效学数据，以及在猫中报告的不良反应。观众： 本文中的信息与所有从...	—	20
48	卷5 • 猫肾性贫血综述 Anemia of Renal Disease: What it is, what to do and what's new - PMC 肾脏疾病贫血：是什么、该怎么办以及最新进展 Serge Chalhoub 1, Cathy Langston 2, Adam Eatroff 3 患者群体 据统计，15–30%的老年猫会发展为慢性肾病（CKD），而在这些猫中，随着肾脏疾病的加重，30–65%会出现贫血。肾性贫血的发病机制是多因素的，但主要原因是红细胞生成素（肾脏激素）产量减少，它控制骨髓红细胞的生成。随着肾脏疾病的进展，红细胞生成素的产生减少。实际意义 认识到肾性贫血的存在非常重要，以便采取适当的治疗来改善生活质量和代谢功能。促红细胞生成剂（ESAs），如阿法依波汀（epoetin alfa）、贝塔依波汀（epoetin...	—	44
49	卷5 • 莫立司他治疗猫CKD贫血RCT Erythropoietic effects of molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor, were 抑制剂，在猫慢性肾病（CKD）相关性贫血中的应用 Molidustat（一种缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂，HIF-PH抑制剂）的促红细胞生成作用在健康猫中已被验证。评估每日口服给予molidustat对慢性肾病（CKD）贫血猫的安全性和促红细胞生成作用。21只由客户拥有的CKD猫（4-17岁）伴有贫血。多中心现场研究；随机、盲法、安慰剂对照。猫每天口服治疗28天，给予对照产品（CP；n=6）或5 mg/kg molidustat（n=15）的悬液。每周评估血细胞比容（HCT）。个体猫治疗成功定义为HCT较基线增加≥4个百分点。对照组的平均血细胞比容（HCT）在整个研究期间保持较...	—	12
50	卷5 • HIF-PHI治疗猫CKD贫血的新选择 Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor as a new therapeutic option for treating anemia in feline chronic kidney disease. 贫血是患有慢性肾病（CKD）的猫常见的并发症，主要由于肾脏红细胞生成素（EPO）产生减少，这源于肾脏红细胞生成素产生（REP）细胞的丧失。贫血会通过引起嗜睡和厌食等临床症状影响生存和生活质量。通过监测HCT/压积（Htc/PCV）趋势早期发现贫血，对于在进行性肾损伤限制治疗效果之前启动治疗至关重要。Molidustat 是一种缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI），是一种新型口服药物，可以刺激内源性红细胞生成素的合成。然而，治疗必须在 REP 细胞仍然功能正常时开始，PCV 目标范围为...	Tierärztliche Praxis. Ausgabe K, K 2026	24
51	卷5 • 健康猫与CKD猫收缩压随时间变化 Hypertension is a common problem in older cats, most often associated with chronic kidney disease (CKD). Cross- 健康猫与慢性肾病（CKD）猫的收缩压（SBP）随时间变化 高血压是老年猫中常见的问题，最常与慢性肾病（CKD）相关。横断面研究表明，猫的血压会随着年龄的增长而升高。假设/目标旨在确定猫的血压是否会随年龄增加，以及这种情况是否独立于CKD的存在。同时调查患高血压的风险因素。回顾性地识别了265只患有CKD的猫和133只≥9岁的健康猫。根据初次评估的状态（CKD或健康）和最后一次随访时的血压（正常血压[NT]或发展为高血压[DH]），创建了	—	13

	四个组: Healthy-NT、Healthy-DH、CKD-NT和CKD-DH。比较了随时间变化的收缩压 (SBP) 斜率与0的差异及组间差异。研究了高血压发...		
52	卷5 • 替米沙坦vs贝那普利治疗猫CKD蛋白尿 The efficacy and benefits of telmisartan in cats with chronic kidney disease (CKD) have not previously been reported. 长期口服替米沙坦与贝那普利治疗慢性肾病 (CKD) 猫的疗效比较 替米沙坦在慢性肾病 (CKD) 猫中的疗效和益处此前未有报道。使用替米沙坦对慢性肾病 (CKD) 猫进行长期治疗, 可以降低尿蛋白与肌酐比值 (UPC) (UP/C), 效果与224只由客户拥有的成年CKD猫相似。前瞻性、多中心、对照、随机、平行组、盲法临床试验, 采用非劣效设计。猫按1:1的比例分配到替米沙坦组 (1 mg/kg; n = 112) 或贝那普利组 (0.5–1.0 mg/kg; n = 112), 每天口服一次 (q24 h)。主要终点预先定义为基于UP/C变化对数转换加权平均值 (AUC 0→t/t) 百分比变化的蛋白尿变化 (贝那普利: 替米沙坦), ...	—	17
53	卷5 • 非高血压CKD猫循环RAAS标志物 Circulating renin-angiotensin-aldosterone system markers in cats with non-hypertensive chronic kidney disease or systemic arterial hypertension. 背景关于非高血压慢性肾病 (NHT-CKD) 或系统性动脉高压 (SAH) 猫的经典和替代循环 RAAS (RAAS) 信息有限。年龄和饮食会影响RAAS结果。假设/目标比较健康猫与患有NHT-CKD或未治疗SAH的猫的血清平衡血管紧张素肽和醛固酮浓度, 并评估服用氨氯地平的高血压猫的这些浓度变化。动物 客户拥有的猫患有NHT-CKD (血清肌酐≥1.6 mg/dL, 收缩压 (SBP) [SBP]<160 mmHg;n = 17)、SAH (SBP≥160 mmHg或≥ 150 mmHg伴高血压眼部病变;n = 6), 或正常SBP (<1...	Journal of Veterinary Internal Med 2026	40
54	卷5 • 氮质血症猫犬离子低钙的严重度病因与结局 Severity, etiology and outcomes of ionized hypocalcemia in azotemic cats and dogs. 目的 描述在患有各种原因血氮增多症的犬猫群体中, 离子化低钙血症的严重程度、发生时间、病因及结果。方法 回顾性分析在单一机构中10年期间 (2014年1月1日至2023年12月31日) 同时患有离子化低钙血症和血氮增多症且在血清生化检测24小时内测量离子化钙 (iCa) 的犬猫的病历。离子化低钙血症在猫定义为iCa < 1.21 mmol/L, 在犬定义为iCa < 1.30 mmol/L。中度低钙血症定义为iCa < 1.00 mmol/L, 重度低钙血症定义为iCa < 0.75 mmol/L。血氮增多症定义为肌酐浓度 ≥...	Frontiers in Veterinary Science 2026	8
55	卷5 • 长期使用马罗匹坦控制CKD猫呕吐 Chronic use of maropitant for the management of vomiting and inappetence in cats with chronic kidney disease: a blinded, placebo-controlled clinical t 慢性使用马罗匹坦 (Maropitant) 治疗患有慢性肾病 (CKD) 猫的呕吐和食欲不振: 一项盲法、安慰剂对照的临床试验 Jessica M Quimby 1,✉, William T Brock 1, Kelsey Moses 2, David Bolotin 3, Kayla Patricelli 3 马罗匹坦 (Maropitant) 通常用于急性呕吐。一项针对猫的药代动力学和毒性研究表明, 长期使用似乎是安全的。本研究的目的是评估马罗匹坦 (Maropitant) 在猫慢性肾病 (CKD) 相关的慢性呕吐和食欲不振管理中的疗效。入组本随机、安慰剂对照、盲法临床研究的共有41只猫, 这些猫具有稳定的国际肾脏...	—	15
56	卷5 • 脂肪来源同种异体MSC治疗猫CKD随机对照试验 Assessment of intravenous adipose-derived allogeneic mesenchymal stem cells for the treatment of feline chronic kidney disease: a randomized, placebo- 用于治疗猫慢性肾脏疾病 (CKD) 的干细胞: 在八只猫中进行的随机、安慰剂对照临床试验 Jessica M Quimby 1,✉, Tracy L Webb 1, Elissa Randall 2, Angela Marolf 2, Alex Valdes-Martinez 2,* , Steve W Dow 1,3 猫慢性肾脏疾病 (CKD) 的特点是慢性肾小管间质性肾炎, 炎症会促进肾纤维化的进展。间充质干细胞 (MSC) (MSCs) 在啮齿动物CKD模型中已显示出抗炎和抗纤维化作用。然而, 关于MSC疗法对伴侣动物疾病效果的随机试验报道很少。本研究的目的是使用随机、安慰剂对照试验评估异体MSC治疗猫CKD...	—	17
57	卷5 • 同种异体冻存MSC治疗猫CKD三项先导试验 R E S E A R C H Open Access Safety and efficacy of intravenous infusion of 研究 开放获取 静脉输注的安全性和有效性 异体冷冻间充质干细胞 (MSC) 用于治疗猫慢性肾病 (CKD): 三项连续试点研究的结果 Jessica M Quimby 1*, Tracy L Webb 1、Lauren M Habenicht 1 和 Steven W Dow 1,2 引言: 间充质干细胞 (MSC) 的给药已被证明可改善慢性肾病 (CKD) 啮齿动物模型的肾功能, 部分机制是通过减少肾内炎症和抑制纤维化。猫的CKD以肾小管间质炎症和纤维化为特征, 因此用MSC治疗可能改善该疾病患者的肾功能和尿液炎症标志物。因此, 进行了一系列试点研究, 以评估静脉注射异体脂肪来源MSC (aMSCs) 在自然发生CKD的...	—	12
58	卷5 • 2025同种异体脂肪源MSC治疗重症猫CKD病例报告 Case Report: Allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells for severe feline chronic kidney disease - PMC 病例报告: 异体脂肪来源间充质干细胞 (MSC) 治疗严重猫慢性肾病 (CKD) 宋怡哲 1,* , † , # , 刘裕阳 1, † , # , 余瑜 1 , 王莹 1 , 穆云鹏 1 , 王思宇 1 , 韩婉婷 2 , 海玲 一只10岁的绝育雄性布偶猫出现食欲不振、恶心、呕吐、嗜睡和进行性体重下降的症状。实验室指标和临床表现提示其患有国际肾脏疾病学会 (IRIS) 慢性肾脏病 (CKD) III期。经过基础支持性治疗后, 临床症状缓解, 患者出院进行家庭管理。三个月后, 猫的病情加重, 经复查, 其符合IRIS CKD IV期的诊断标准。在按照IRIS指南进行为期4个月的规范化支持性治疗后, 临床症状和实验室指标均无明显变化, 猫仍表现为消瘦...	—	27

59	卷5 • 间充质干细胞治疗伴侣动物肾病从机制到临床 Advancing mesenchymal stem cell therapy for kidney diseases in companion animals: from mechanisms to clinical application 急性和慢性肾病（CKD）是伴侣动物中的主要临床挑战，但逆转已建立损伤的治疗选择仍然有限。间充质干细胞（MSC）（MSCs）因其免疫调节和组织修复特性而成为一种有前景的治疗方法。本综述综合了目前关于猫狗肾脏疾病MSC治疗的证据，重点关注其作用机制、预处理策略、给药途径和临床结果。关键发现表明，MSCs主要通过旁分泌介导的免疫调节发挥肾脏保护作用，而非直接分化。静脉给药虽然简单，但会导致超过80%的干细胞滞留在肺部，而肾脏归巢率不足5%；动脉或局部注射可将归巢率提高到15–20%，但存在操作风险且缺乏标准化剂量。预处理...	Frontiers in Veterinary Science 2026	17
60	卷5 • 姜黄素对CKD猫的肾脏保护作用 Renoprotective effects of curcumin in cats with chronic kidney disease. 背景 猫的慢性肾病（CKD）以氧化应激、炎症和细胞凋亡为特征。姜黄素在实验模型中显示出肾脏保护作用，但在患有CKD的猫中临床证据仍然有限。假设/目的 评估口服姜黄素补充剂（80 mg/猫/天）在标准治疗下是否能有利地调节患有国际肾脏兴趣学会（IRIS）3期CKD的猫的肾功能、氧化、炎症和凋亡生物标志物。动物 对象为十六只IRIS 3期CKD的顾客拥有的猫。方法 前瞻性、随机试验。猫被分配为仅接受药物治疗组（MT；n = 8）或药物治疗加姜黄素组（MT+C；n = 8）。姜黄素按80 mg/猫/天口服，分2次给...	Journal of Veterinary Internal Med 2026	36
61	卷5 • N-乙酰半胱氨酸降低肌酐BUN、SDMA与尿蛋白 N-acetylcysteine reduces serum creatinine, blood urea nitrogen, symmetric dimethylarginine and urine protein to creatinine ratio in cats with chronic 背景 氧化应激被认为是慢性肾病（CKD）的一个重要促成因素。迄今为止，文献中关于N-乙酰半胱氨酸（NAC）对自然发生CKD的猫的影响的临床数据仍然很少。本研究的目的是评估在治疗急性加重的CKD猫时，添加NAC是否能够比单纯静脉输液治疗更改善肾功能生物标志物。方法 本研究纳入了总计50只由客户拥有的猫。纳入标准包括先前被诊断为氮质血症性CKD（IRIS 2-4期）的猫，并且超声检查显示双侧肾脏体积减小、表面轮廓粗糙及肾皮质回声异常。所有猫都使用标准的临床程序进行检查，包括临床检查、血液分析、腹部超声检查、试纸尿液分...	BMC veterinary research 2026	7
62	卷5 • Renaltec治疗IRIS2-3期猫CKD的效果评价 Evaluation of the effect of Renaltec in cats with IRIS stage 2 and 3 chronic kidney disease 目标 慢性肾病（CKD）与血液和肾小管上皮细胞中尿素氮如靛基硫酸盐（IS）的积累有关，这些物质会促进CKD的进展。本前瞻性、随机、双中心临床试点研究的目的是评估口服球状碳质吸附剂Renaltec（Porus One）对IS血浆浓度、CKD进展、钙/磷稳态参数（总钙[tCa]、磷、FGF-2323 [FGF-23]）、尿蛋白:肌酐比值（UPC）以及粪便失衡指数（FDI）在2级和3级稳定CKD猫（根据国际肾脏兴趣学会IRIS分级）中的影响，观察期为6个月。方法 共19只患有慢性肾病（CKD）的猫被随机分配到Renalt...	Journal of Feline Medicine and Sur 2026	34
63	卷5 • SGLT2抑制剂用于非理想候选糖尿病猫 SGLT2 inhibitor therapy in diabetic cats: first clinical experiences with non-ideal candidates 病例系列总结 本回顾性病例系列描述了七只使用韦拉格列净（velagliflozin）治疗的糖尿病猫，这些猫被认为并非该疗法的理想候选者。这些更为复杂的糖尿病猫病例被转诊至比利时根特大学兽医学院小动物科。本病例系列的唯一纳入标准是在诊断为糖尿病后接受韦拉格列净（Senvelgo；勃林格殷格翰）治疗。所有猫的数据包括信号信息、病史、临床发现、诊断、治疗、反应及结果。所有猫的初次会诊时间均在2024年3月至2025年5月之间。相关性与新颖信息 目前关于钠-葡萄糖共转运蛋白2（SGLT2）抑制剂在猫科患者中使用的现有文献仍...	Journal of Feline Medicine and Sur 2026	19
64	卷6 • 549只老年猫健康筛查的疾病患病率 Prevalence of disease in 549 older cats undergoing health screening at two United Kingdom-based veterinary clinics. 背景 随着年龄增长，某些猫的疾病风险增加，包括慢性肾病(CKD)和甲状腺功能亢进，但照顾者可能将临床症状忽视为与年龄相关的变化。假设/目标 量化老年猫疾病及其他主要临床发现的患病率。动物 数据来自在英国两家初级护理兽医诊所接受常规健康筛查的猫（≥8岁），时间跨度为52个月（2018年10月2日至2023年2月14日）。方法 在筛查过程中，进行了病史收集、体格检查以及血浆生物化学检查，有的还包括血浆总甲状腺素浓度测定。在可能的情况下，进行了收缩压（SBP）测量（97.1%的病例；多普勒法）和尿液分析（41.3%...	Journal of Veterinary Internal Med 2026	32
65	卷6 • 猫共病心血管疾病与肾脏疾病 Feline comorbidities: cardiovascular and kidney diseases. 实际意义：心血管和肾脏疾病在猫中非常常见，且经常同时存在，尤其是在高龄猫中。心脏和肾脏之间的多种相互作用途径可能导致在一个或两个系统发生疾病时功能逐渐下降。在猫中发现心脏或肾脏疾病，应促使临床医生考虑该疾病及其治疗可能如何影响另一个器官的功能，以及共存的另一个器官的原发性疾病可能如何影响病例管理和患者预后。临床挑战：在充血性心力衰竭、急性肾损伤或慢性肾病的管理中，一个常见的目标是维持最佳的体液平衡；然而，针对一个系统的许多治疗方法往往与另一个系统的最佳利益相冲突。例如，肾病的治疗通常包括肠外补液治疗，目的是维持平均...	Journal of Feline Medicine and Sur 2026	51
66	卷6 • 猫CKD健康相关生活质量评估 Evaluation of health-related quality of life in cats with chronic kidney disease	Journal of Feline Medicine and Sur 2025	24

目标 本研究的目的是评估慢性肾病（CKD）猫的健康相关生活质量（HRQoL），并将这些结果与临床数据整合，以识别与HRQoL下降相关的因素。方法 照顾者完成了一份经过验证的HRQoL工具（VetMetrica），并收集了临床数据（病史、实验室检查、体格检查结果等）。使用非参数分析根据需要比较各组的活力、舒适度和情绪健康（EWB）评分。结果 收集了24只健康猫和68只CKD猫的数据。患有慢性肾病（CKD）的猫其活力、中度舒适度和情感幸福感（EWB）中位数评分显著低于健康猫（活力：41.7，范围4.3–64；舒适感...

67	卷6 • 照护者视角下的猫CKD_葡萄牙问卷研究 Caregivers’ perspectives on feline chronic kidney disease in Portugal: a questionnaire-based study 目的 本研究旨在评估照顾者对猫慢性肾病（CKD）的看法。方法 邀请在葡萄牙居住并照顾患有CKD 猫的人参与在线问卷调查。结果 共收集了 405 份有效问卷，其中大多数参与者（n = 309, 76.3%）是首次处理猫 CKD。国际肾脏兴趣学会（IRIS）CKD 分期向 260 名（64.2%）受访者进行了说明，但仅有 188 名（46.4%）确认在诊断时进行了血压评估。387 名（95.6%）受访者接收到肾脏饮食的建议，但仅有 341 名（84.2%）实际给予，其中 139 名（40.8%）最终每天至少提供一些...	Journal of Feline Medicine and Sur 2025	30
68	卷6 • 智能猫砂盆监测提升猫CKD检出 Enhancing Detection of Feline Chronic Kidney Disease Through Smart Litter Box Monitoring 慢性肾病（CKD）（CKD）在猫中很常见，并被认为是猫普遍死亡的主要原因之一，但猫的照顾者很难发现，尤其是在早期阶段。本回顾性研究旨在通过智能猫砂盆监测技术来增强猫照顾者对CKD的检测，该技术可追踪猫的排泄行为。我们建立了CKD猫和无已知疾病猫的队列，并分析了监测器捕捉的行为特征。混合效应模型识别出显著差异，然后将这些差异整合到机器学习框架中进行预测建模。该模型在使用交叉验证进行训练时实现了92.7%的加权F1分数，在验证时为89.9%，展示了对慢性肾病（CKD）预测的高精度。主要发现包括猫患CKD的行为特征独特，...	Animals : an Open Access Journal f 2026	31
69	卷6 • 猫CKD进展与血清胰脂肪酶浓度关联 Association between chronic kidney disease progression and serum feline pancreatic lipase concentrations in cats. 重要性 血清猫胰脂肪酶（fPL）用于诊断胰腺炎，但解释具有挑战性，因为fPL可能受到非胰腺疾病的影响，包括肾功能下降。目的 评估慢性肾病（CKD）分期与猫血清fPL的关联，并描述肾功能生物标志物与fPL的关系。方法 本回顾性研究评估了2024年2月至2025年3月在一家二级转诊兽医医院就诊猫的病历。纳入条件要求在同一天进行全血细胞计数、血清生化、血气分析、尿液分析、血清fPL及腹部超声检查。CKD 分期遵循国际肾脏兴趣学会指南，使用血清肌酐、尿比重（USG）（USG）和超声检查进行评估。采用 Kruska...	Journal of veterinary science 2026	23

尚未获取全文的文献（附官方链接，可自行下载）

#	文献	获取地址
1	iCatCare 2026护理指南_Nursing the cat with CKD	https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1098612X261466553/suppl_file/sj-pdf-2-jfm-10.1177_1098612x261466553.pdf
2	基于质谱的猫CKD尿液蛋白组学分析	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13498864/