

《植物生长调节剂的应用》学案

任务一：分析使用植物生长调节剂后巨峰葡萄果实生长情况（见下表），总结实验结果和结论。

	对照	5mg/L 的氯吡脞	25mg/L 的赤霉素	5mg/L 的氯吡脞 +25mg/L 赤霉素
横径（mm）	23.26	26.28	25.59	29.83
纵径（mm）	26.96	29.12	28.31	31.76
粒重（g）	9.41	12.89	11.95	17.42

实验结果：

实验结论：

任务二：分析部分氯吡脞使用说明书，思考植物生长调节剂施用，需要注意哪些事项？

产品性能用途：

本品是植物生长调节剂。能提高座果率；能克服天气引起的座瓜难和化瓜难题，具有促进保花保果、加速幼果生长发育，增产增收等作用。

技术和使用方法：

作用范围	防治对象	制剂用药量	使用方法
葡萄	调节生长、增产	50-100 倍液	浸幼果穗
西瓜	调节坐果率	50-100 倍液	浸、喷瓜藤

注：

1.西瓜:在开雌花当天或开花后 1-2 天以稀释 50- 100 倍的药液均匀浸、喷瓜胎。

2.葡萄:谢花后 15-20 天以稀释 50- 100 倍的药液浸果穗。

3.高浓度使用或不均匀喷雾易引起果实畸形、裂果、瓜苦等不良现象。

4.宜在早上露水干后或下午 4 时后使用，施药后 5 小时遇雨应补施。