


5.2 染色体变异

- 1.染色体变异是指生物体的_____细胞或_____细胞内染色体_____或_____的改变。
2. 染色体数目变异分为两类：整倍体变异，即细胞内染色体数目以的形式成倍增加或减少，如单倍体、多倍体等；非整倍体变异，细胞内_____的增加或减少。
- 3.染色体组是指_____、_____各不相同的一套_____染色体，包含了该种生物的一整套遗传信息。

练习：(1) 某生物正常体细胞的染色体数目为 8 条，下图中，表示含有一个染色体组的细胞是 ()




(2) 某生物的基因型 $AAaBbbbCCc$ ，那么它有多少个染色体组 ()


- A、2、 B、3 C、4 D、8

- 4.通常把由_____发育而来，体细胞中含有_____的个体统称为多倍体。
- 5.单倍体是指_____细胞中染色体数目与本物种染色体数目相同的个体。
- 6.染色体结构的变异包括_____、_____、_____、_____等类型。染色体结构的改变，会使排列在染色体上的基因发生改变。


根据同源染色体联会示意图，写出染色体结构变异的类型：




()




()



()



()



()

7.单倍体育种的一般程序是：用_____的方法获得杂种 F_1 ，取 F_1 的花药或花粉，进行_____获得单倍体植株。然后用_____诱导使这些植株的染色体数目加倍，随后生长成可育的_____植株。相比于杂交育种，其优势是_____。

8.多倍体植株具有茎秆_____、果实和种子_____、营养物质_____等特点，在生产上具有较好的经济价值。人们可以用人工诱导的方法来获得多倍体植株。最常用的处理手段是_____。

9.可遗传的变异是指由_____的变化引起的变异，其来源包括_____、_____、_____，均为生物进化提供了原材料。