

勘误和修改

打开本页，如果没有显示公式，请刷新页面。

[下载本页的 PDF 版](#)

一、勘误

2022年3月第1次印刷

1. 位置：29页，正文倒数第3行至最后

◦ 原文：

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\alpha_1 + \cdots + b_{1n}\alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = b_{n1}\alpha_1 + \cdots + b_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

◦ 修改为：

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\alpha_1 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = b_{1n}\alpha_1 + \cdots + b_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

2. 位置：30页，正文第3行至第5行

◦ 原文：

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

◦ 修改为：

$$[\beta_1 \quad \cdots \quad \beta_n] = [\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

3. 位置：30页，正文第11行至第13行

◦ 原文：

在同一个向量空间，由基 $[\alpha]$ 向基 $[\beta]$ 的过渡矩阵是 P ，则：

$$[\beta] = P[\alpha]$$

注意： $[\alpha]$ 和 $[\beta]$ 分别用行向量方式表示此向量空间的不同的基。

◦ 修改为：

在同一个向量空间，由基 $\{\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_n\}$ 向基 $\{\beta_1 \quad \cdots \quad \beta_n\}$ 的过渡矩阵是 P ，则：

$$[\beta_1 \quad \cdots \quad \beta_n] = [\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_n]P$$

4. 位置：30页，正文第13行

◦ 原文：注意： $[\alpha]$ 和 $[\beta]$ 分别用列向量方式表示此向量空间的不同的基。

◦ 修改说明：删除原文中的那一行。

5. 位置：30页，正文第15至第7行

- 原文：

$$x'_1\beta_1 + \cdots + x'_n\beta_n = x'_1b_{11}\alpha_1 + \cdots + x'_1b_{1n}\alpha_n \\ + \cdots \\ + x'_nb_{n1}\alpha_1 + \cdots + x'_nb_{nn}\alpha_n$$

- 修改为：

$$x'_1\beta_1 + \cdots + x'_n\beta_n = x'_1b_{11}\alpha_1 + \cdots + x'_1b_{n1}\alpha_n \\ + \cdots \\ + x'_nb_{1n}\alpha_1 + \cdots + x'_nb_{nn}\alpha_n$$

6. 位置：31页，正文第1行至第3行

- 原文

在某个向量空间中，由基 $[\alpha]$ 向基 $[\beta]$ 的过渡矩阵是 P 。某向量在基 $[\alpha]$ 的坐标是 x ，在基 $[\beta]$ 的坐标是 x' ，这两组坐标之间的关系是：

$$x = Px'$$

- 修改为：

在某个向量空间中，由基 $\{\alpha_1 \cdots \alpha_n\}$ 向基 $\{\beta_1 \cdots \beta_n\}$ 的过渡矩阵是 P 。某向量在基

$\{\alpha_1 \cdots \alpha_n\}$ 的坐标是 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ，在基 $\{\beta_1 \cdots \beta_n\}$ 的坐标是 $x' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$ ，这两组坐标

之间的关系是：

$$x = Px'$$

- 修改说明：从29页到31页，对过渡矩阵和坐标变换的推导中，有上述错误，更详细的说明请见文章：[重要更正第1号：过渡矩阵和坐标变换推导](#)

7. 位置：31页，正文，倒数第2行

- 原文：同样，在 $x'Oy'$ 中，分别以基向量的 \overrightarrow{Oi} 和 \overrightarrow{Oj} 的长度为单位长度并建立 x' 和 y' 坐标轴。
- 同样，在 $x'Oy'$ 中，分别以基向量的 $\overrightarrow{Oi'}$ 和 $\overrightarrow{Oj'}$ 的长度为单位长度并建立 x' 和 y' 坐标轴。
- 致谢：此错误由读者李韬指出，非常感谢。

8. 位置：36页，正文第2行

- 原文：设内积空间中的两个向量.....
- 修改为：设向量空间中的两个向量.....
- 说明：将原文中的“内积”，修改为“向量”。

9. 位置：39页，正文第1行

- 原文： $d(u, v) = u - v$
- 修改为： $d(u, v) = \|u - v\|$

10. 位置：39页，正文第2行

- 原文： $u - v = \sqrt{\langle (u - v), (u - v) \rangle}$
- 修改为： $\|u - v\| = \sqrt{\langle (u - v), (u - v) \rangle}$

11. 位置：41页，图1-5-4下第4行

- 原文： $d(u, v) = u_1 - v_1 + \cdots + u_n - v_n = \sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$
- 修改为： $d(u, v) = |u_1 - v_1| + \cdots + |u_n - v_n| = \sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$
- 修改说明：原文中的 $u_1 - v_1$ 和 $u_n - v_n$ 应该加上绝对值符号

12. 位置：46页，倒数第5行

- 原文: $\|\mathbf{u}\|_1 = u_1 + \cdots + u_n = \sum_{r=1}^{r=n} |u_i|$
- 修改为: $\|\mathbf{u}\|_1 = |u_1| + \cdots + |u_n| = \sum_{r=1}^{r=n} |u_i|$

13. 位置: 49页, 图1-5-9下的第1行

- 原文: 对于 $\triangle ABC$,
- 修改为: 对于 $\triangle OAB$,

14. 位置: 51页, 表1-5-1

- 原文:

表 1-5-1

	数学	是	基础	重要	很	打牢	要
文本 1	1	1	2	1	1	0	0
文本 2	2	0	1	1	1	1	1

- 修改说明: 将“文本2”中的“数学”项下的数字修改为“1”, “要”项下的数字修改为“2”

15. 位置: 51页, 表1-5-1之下的第 2 行

- 原文: $\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- 修改为: $\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

16. 位置: 58页, 正文第1行

- 原文:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 修改为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 修改说明: 对矩阵的排版样式给予修改。

17. 位置: 64页, 正文, 倒数第5行

- 原文: 如果用一个标量 c 乘以矩阵, 此计算结果仍然是与原矩阵形状一样的矩阵, 遵从乘法封闭的原则。

- 修改为：如果用一个标量 c 乘以矩阵，此计算结果仍然是与原矩阵形状一样的矩阵，遵从数量乘法封闭的原则。
- 修改说明：将“遵从乘法封闭的原则”，修改为“遵从数量乘法封闭的原则”。

18. 位置：71页，正文第10行、第11行

- 原文：但另一个被称为“线性函数”的 $f(x) = kx + b$ 不符合上述规定的第二条（ $f(cx) = kcx + b, c(fx) = ckx + cb$ ，得： $f(cx) \neq cf(x)$ ），
- 修改为：但另一个被称为“线性函数”的 $f(x) = kx + b$ 仅以上述规定的第二条考察（ $f(cx) = kcx + b, c(fx) = ckx + cb$ ，得： $f(cx) \neq cf(x)$ ），就明显不符合，
- 修改说明：表述方式进行修改

19. 位置：97页，正文第2行至第4行

- 原文：
性质
矩阵列向量线性无关 $\iff |\mathbf{A}| \neq 0$
矩阵列向量线性相关 $\iff |\mathbf{A}| = 0$
- 修改为：
性质
 - 矩阵列向量线性无关 $\iff |\mathbf{A}| \neq 0$
 - 矩阵列向量线性相关 $\iff |\mathbf{A}| = 0$
- 修改说明：
 - 原文中的“性质”二字是宋体字，应该修改为楷体字。
 - 在“性质”下面的两条性质前面，增加项目符号（小圆点，类似于97页底部所列其他性质那样）

20. 位置：102页，正文第1行

- 原文：观察可知，原线性方程组有解，又因为 $m = 3, n = 4, m < n$ ，所以原线性方程组有无穷多个解。
- 修改为：观察可知，原线性方程组有解；又因为阶梯形矩阵的非零行数量 $r = 3$ ，未知量个数 $n = 4, r < n$ ，所以原线性方程组有无穷多个解。

21. 位置：107页，正文，倒数第3行

- 原文：除在上述统计词频时生成稀疏矩阵之外，
- 修改为：除在上述统计字词频率时生成稀疏矩阵之外，
- 修改说明：将原文中的“词频”，修改为“字词频率”

22. 位置：114页，图2-7-4上面的第1行

- 原文：从 C 到 A 。
- 修改为：从 C 到 B 。
- 致谢：此错误由读者西交利物浦大学的周若骏同学指出，非常感谢。

23. 位置：115页，正文（不含代码），倒数第3行

- 原文：可以使用 NexworkX
- 修改为：可以使用 NetworkX
- 修改说明：将原文的“NexworkX”，修改为“NetworkX”

24. 位置：116页，正文，第4行

- 原文：利用 NexworkX 中的函数 `adjacency_matrix()` 可以得到图 G 的邻接矩阵。
- 修改为：利用 NetworkX 中的函数 `adjacency_matrix()` 可以得到图 G 的邻接矩阵。
- 修改说明：修改内容同上一条

25. 位置：120页，正文（不含代码）第1行

- 原文：依然使用 NetworkX 库中的方法创建图 2-7-2 对应的图 D，
- 修改为：依然使用 NetworkX 库中的方法创建图 2-7-7 对应的图 D，

26. 位置：125页，正文，第14行

- 原文： $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n| = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & -6 \\ 3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (-4 - \lambda)(5 - \lambda) + 1$
- 修改为： $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n| = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & -6 \\ 3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (-4 - \lambda)(5 - \lambda) + 18$

27. 位置：125页，正文，第15行

- 原文：即： $(-4 - \lambda)(5 - \lambda) + 1 = 0$,
- 修改为：即： $(-4 - \lambda)(5 - \lambda) + 18 = 0$,

28. 位置：132页，第1个代码段

- 原文：

```
1 import numpy as np
2 np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)
3 u0 = np.mat("0.21;0.68;0.11")
```

- 修改为：

```
1 import numpy as np
2 np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)
3 P = np.mat("0.65 0.15 0.12;0.28 0.67 0.36;0.07 0.18 0.52")
4 u0 = np.mat("0.21;0.68;0.11")
```

- 修改说明：在原代码段的第 2 行和第 3 行之间插入一行：`P = np.mat("0.65 0.15 0.12;0.28 0.67 0.36;0.07 0.18 0.52")`

29. 位置：133页，正文，倒数第1行公式：

- 原文：
$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - 1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & a_{ij} - 1 & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - 1 \end{bmatrix}$$
- 修改为：
$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - 1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & a_{ij} - 1 & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - 1 \end{bmatrix}$$

30. 位置：134页，正文，第3行，公式：

- 原文： $|\mathbf{A} - \mathbf{1}| = 0$
- 修改为： $|\mathbf{A} - \mathbf{1} \cdot \mathbf{I}_n| = 0$

31. 位置：137页，正文，3.3.1节的标题之下第4行

- 原文：设极大线性无关向量组 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_2\}$ 和 $\{\beta_1, \cdots, \beta_n\}$ 分别作为两个向量空间的基
- 修改为：设极大线性无关向量组 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_2\}$ 和 $\{\beta_1, \cdots, \beta_n\}$ 分别作为向量空间的两个基
- 修改说明：“两个向量空间的基”改为“向量空间的两个基”

32. 位置：137页，正文，3.3.1节的标题之下第9行

- 原文： $[\alpha] = \mathbf{P}^{-1}[\beta]$
- 修改为： $[\alpha] = [\beta]\mathbf{P}^{-1}$

33. 位置：137页，正文，倒数第1行

- 原文: $\overrightarrow{OM} = \mathbf{A}\mathbf{v}_\alpha$
- 修改为: $\overrightarrow{ON} = \mathbf{A}\mathbf{v}_\alpha$
- 致谢: 此错误由读者李韬指出, 非常感谢。

34. 位置: 154页, 正文, 第二行

- 原文: $\mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{im} \end{bmatrix}, (i = 1, 2, \dots, n)$
- 修改为: $\mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix}, (i = 1, 2, \dots, n)$
- 致谢: 此错误由读者西交利物浦大学的周若骏同学指出, 非常感谢。

35. 位置: 160页, 倒数第7行末尾和倒数第6行开头部分

- 原文: 它是向量 \mathbf{a} 的 l_2 范数,
- 修改为: 它是向量 \mathbf{a} 的 l_2 范数平方,

36. 位置: 161页, 正文, 第1行

- 原文: 再观察 (3.4.6) 是,
- 修改为: 再观察 (3.4.6) 式,

37. 位置: 162页, 正文, 第14行

- 原文: 由 (3.4.9) 可得
- 修改为: 由 (3.4.11) 可得

38. 位置: 164页, 正文, 倒数第 2 行

- 原文:正交投影量之后的残余量 (在平面空间中即图3-4-4中所示的 $\mathbf{x} - \mathbf{y}$) 。
- 修改为:正交投影量之后的残余量。

39. 位置: 168页, 正文, 第20行

- 原文: 即 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = \mathbf{v}^T \mathbf{v}_i = 1$
- 修改为: 即 $\|\mathbf{v}_i\|^2 = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = \mathbf{v}^T \mathbf{v}_i = 1$

40. 位置: 194页, 图4-1-3之上的第三行

- 原文: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$
- 修改为: $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$

41. 位置: 216页, 正文, 第4行

- 原文: $8x + 10 \leq 2800$
- 修改为: $8x + 10y \leq 2800$

42. 位置: 224页, 正文, 第4行

- 原文: 然后根据 (4.3.8) 式编写计算
- 修改为: 然后根据 (4.3.13) 式编写计算
- 修改说明: 将原文中的“ (4.3.8) ”修改为“ (4.3.13) ”

43. 位置: 224页, 正文, 导数第 2 行

- 原文: (4.3.8) 式中的
- 修改为: (4.3.13) 式中的
- 修改说明: 将原文中的“ (4.3.8) ”修改为“ (4.3.13) ”

44. 位置: 242页, 公式 (4.4.23-3) 下的第 1 行

- 原文: 根据 (4.4.9) 式可知,
- 修改为: 根据 (4.4.13) 式可知,

45. 位置：250页，正文，第2行

- 原文： $L_\delta = \begin{cases} \frac{1}{2}(y_i - \hat{y}_i)^2, & \text{if } |y_i - \hat{y}_i| \leq \delta \\ \delta|y_i - \hat{y}_i| - \frac{1}{2}\delta^2, & \text{其他} \end{cases}$
- 修改为： $L_\delta = \begin{cases} \frac{1}{2}(y_i - \hat{y}_i)^2, & \text{if } |y_i - \hat{y}_i| \leq \delta \\ \delta|y_i - \hat{y}_i| - \frac{1}{2}\delta^2, & \text{其他} \end{cases}$
- 修改说明：将原文中的“ $|y_i - \hat{y}_i| \leq \delta$ ”修改为“ $|y_i - \hat{y}_i| \leq \delta$ ”

46. 位置：250页，正文，第3行

- 原文：如果 $|\hat{y}_i - y_i| \leq \delta$,
- 修改为：如果 $|y_i - \hat{y}_i| \leq \delta$,

47. 位置：254页，图4-4-4-14

- 修改说明：将图4-4-14中的纵坐标名称 $f(x)$ 修改为 $f'(x)$

48. 位置：264页，倒数第3行

- 原文：例如 $\{H\}$ 就是
- 修改为：例如 H 就是

49. 位置：270页，正文，倒数第9行

- 原文：(B3)：若 $B \subset A$ ，则 $A \cap B = B$ ，故 $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)} \geq 1$
- 修改为：(B3)：若 $B \subset A$ ，则 $A \cap B = B$ ，故 $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)} \leq 1$
- 致谢：本错误是由读者“开花一季”指出，非常感谢。

50. 位置：273页，倒数第4行

- 原文： $P(B|A) = P(A)$ 同样说明两个事件相互对立。
- 修改为： $P(B|A) = P(A)$ 同样说明两个事件相互独立。
- 修改说明：将原文中的“对立”修改为“独立”。

51. 位置：277页，正文，第7行

- 原文：..... 取出2个黑球事件，
- 修改为：..... 取出2个黑球事件，

52. 位置：298页，正文，第1行

- 原文： $F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 1 - e^{\lambda y} & (y > 0) \\ 0 & (y \leq 0) \end{cases}$
- 修改为： $F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda y} & (y > 0) \\ 0 & (y \leq 0) \end{cases}$

53. 位置：300页，正文，第1行

- 原文： σ 为方差
- 修改为： σ 为标准差

54. 位置：311页，正文，倒数第3行

- 原文：再如二维多维连续型随机变量的分布式正态分布，
- 修改为：再如二维连续型随机变量的分布是正态分布，
- 修改说明：删除原文中的“多维”，并将“式”修改为“是”。

55. 位置：314页，正文，第11行

- 原文： $P\{X = x_i | Y = y_i\} = \frac{P(X=x_i, Y=y_i)}{P(Y=y_i)} = \frac{p_{ij}}{P(Y=y_i)}$
- 修改为： $P(X = x_i | Y = y_i) = \frac{P(X=x_i, Y=y_i)}{P(Y=y_i)} = \frac{p_{ij}}{P(Y=y_i)}$
- 修改说明：将原文的 $P\{X = x_i | Y = y_i\}$ 修改为 $P(X = x_i | Y = y_i)$

56. 位置：328页，正文，第11行，即 (5.5.7) 式之上的推导过程

- 原文：

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E([X - E(X)]^2) = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

○ 修改为：

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E([X - E(X)]^2) = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

○ 修改说明：注意观察第一个等号之后的平方的位置。

○ 致谢：此错误由读者西交利物浦大学的周若骏同学指出，非常感谢。

57. 位置：333页，正文，倒数第1行

○ 原文：

$$\begin{cases} a_0 &= \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(X)} \\ b_0 &= E(Y) - E(X) \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(X)} \end{cases}$$

○ 修改为：

$$\begin{cases} a_0 &= E(Y) - E(X) \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(X)} \\ b_0 &= \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(X)} \end{cases}$$

58. 位置：334页，正文，第3行

○ 原文：根据 (5.5.8) 式，可得：

○ 修改为：根据 (5.5.7) 式，可得：

59. 位置：334页，正文，第10行

○ 原文： $\text{Var}(Y) + \text{Var}(-b_0X) + 2\text{Cov}(X, -2b_0X)$ (根据协方差的性质 (C6))

○ 修改为： $\text{Var}(Y) + \text{Var}(-b_0X) + 2\text{Cov}(X, -b_0X)$ (根据协方差的性质 (G6))

60. 位置：334页，正文，倒数第2行

○ 原文：又因为 (见 (5.5.8) 式)：

○ 修改为：又因为 (见 (5.5.7) 式)

61. 位置：338页，正文，第2行

○ 原文：其中， $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} y_i$ 。

○ 修改为：其中， $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 。

○ 致谢：此错误由读者西交利物浦大学的周若骏同学指出，非常感谢。

62. 位置：339页，正文，倒数第4行 (略去表格)

○ 原文： (x_i^r, y_i^r) 的顺序组成一队，

○ 修改为： (x_i^r, y_i^r) 的顺序组成一对，

63. 位置：357页，正文，倒数第4行 (公式)

○ 原文： $\log L = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta_i, \dots, \theta_k)$

○ 修改为： $\log L = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_k)$

○ 修改说明：原文中的 θ_i 的角标 i 修改为 1

64. 位置：368页，正文，(6.2.18) 式之下的第1行

○ 原文：若 $\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$ ，

○ 修改为：若 $\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$ ，

- 修改说明：原文中第二个 θ 增加下角标 2

65. 位置：375页，正文，第 12 行

- 原文：则有 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 0.3^2)$ （参见 6.3 节的 (6.3.1) 式），
- 修改为：原文：则有 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1^2)$ （参见 6.3 节的 (6.3.2) 式），

66. 位置：376页，正文，倒数第 6 行（式子 (6.4.2) 之上第 2 行）

- 原文： $Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 0.3^2)$
- 修改为： $Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1^2)$

67. 位置：382页，正文，第 1 行

- 原文：(3) 两个正态总体
- 修改为：**2. 两个正态总体**
- 修改说明：此处应该修改为与 378 页“**1. 一个正态总体**”的标题相对应

68. 位置：387页，正文，第 5 行

- 原文：并且 $n\hat{p}_1 = 56 < 5$ ， $m\hat{p}_2 = 142 < 5$ ，
- 修改为：并且 $n\hat{p}_1 = 56 > 5$ ， $m\hat{p}_2 = 142 > 5$ ，

69. 位置：387页，正文，第 9 行

- 原文：由于 $|\eta| = 6.1133 < 1.96$ ，
- 修改为：由于 $|\eta| = 6.1133 > 1.96$ ，

70. 位置：393页，正文，倒数第 6 行（公式 (6.5.8) 之上第 2 行）

- 原文：..... 是泊松分布中的 α 无偏估计，
- 修改为：..... 是泊松分布中的 λ 无偏估计，

71. 位置：397页，正文，第 1 行

- 原文：再结合 (6.5.11) 和 (6.5.8) 式.....
- 修改为：再结合 (6.5.11) 和 (6.5.9) 式.....

72. 位置：402页，代码段，第6行、第7行

- 原文：

```
1 print(f"P(green ball)=4/9, information: {round(I_green, 4)} bits")
2 print(f"P(yellow ball)=4/9, information: {round(I_yellow, 4)} bits")
```

- 修改为：

```
1 print(f"P(green ball)=3/9, information: {round(I_green, 4)} bits")
2 print(f"P(yellow ball)=2/9, information: {round(I_yellow, 4)} bits")
```

73. 位置：411页，正文，公式 (7.4.4) 式

- 原文：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) Z = E_P(Z) = E_P(-\log(Q(X)) - [-\log(P(X))]) \quad (7.4.4)$$

这说明相对熵是按概率 $P(X)$ 损失的信息的期望.....

- 修改为：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) Z = E_P(Z) = E_P(-\log(Q(x)) - [-\log(P(x))]) \quad (7.4.4)$$

这说明相对熵是按概率 $P(x)$ 损失的信息的期望.....

- 修改说明：将原文中大写的 X 修改为小写的 x

74. 位置：411页，正文，公式 (7.4.5) 式

- 原文：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = E_P \left[\log \left(\frac{P(X)}{Q(X)} \right) \right] \quad (7.4.5)$$

其含义为按概率 $P(X)$ 的 P 和 Q 的对数商的期望。

- 修改为：

$$D_{KL}(P \parallel Q) = E_P \left[\log \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) \right] \quad (7.4.5)$$

其含义为按概率 $P(x)$ 的 P 和 Q 的对数商的期望。

- 修改说明：将原文中大写的 X 修改为小写的 x

75. 位置：412页，正文，第 8 行

- 原文：利用 (7.2.18) 式，
- 修改为：利用 (7.4.7) 式，

76. 位置：412页，正文，第 10 行

- 原文： $H_1(\mathbf{y} \parallel \hat{\mathbf{y}}_1) = -[1 \cdot \log 0.775 + 0 \cdot \log 0.116 + 0 \cdot \log 0.039 + 0 \cdot \log 0.070] \approx 0.3677$
- 修改为： $H_1(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}_1) = -[1 \cdot \log 0.775 + 0 \cdot \log 0.116 + 0 \cdot \log 0.039 + 0 \cdot \log 0.070] \approx 0.3677$

77. 位置：412页，正文，第 12 行

- 原文： $H_2(\mathbf{y} \parallel \hat{\mathbf{y}}_2) = -\log 0.938 \approx 0.0923$
- 修改为： $H_2(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}_2) = -\log 0.938 \approx 0.0923$

78. 位置：412页，正文，第 13 行

- 原文：根据 (7.4.5)
- 修改为：根据 (7.4.8)

79. 位置：413页，公式 (7.4.10)

- 原文： $C = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(q_i) + (1 - y_i) \log(1 - q_i)] \quad (7.4.10)$
- 修改为： $C = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(q_i) + (1 - y_i) \log(1 - q_i)] \quad (7.4.10)$

80. 位置：413页，正文，第 6 行

- 原文：二分类的交叉熵的交叉熵为损失函数，
- 修改为：二分类的交叉熵损失函数，

81. 位置：416页，正文，公式 (7.6.2)

- 原文： $H(\mathbf{X}) = -\int f(x) \log(f(x)) dx \quad (7.6.2)$
- 修改为： $H(\mathbf{X}) = -\int f(\mathbf{x}) \log(f(\mathbf{x})) d\mathbf{x} \quad (7.6.2)$
- 修改说明：将原文中小写 x 加粗

二、修改

2022年3月第1次印刷

1. 位置：164页，公式 (3.5.3) 下第 2 行开始，到公式 (3.5.4) 所在的行为止。

- 说明：这一段内容旨在推导 $\mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j = r_{ij}$ 的结果，原文的推导过程中使用了求和符号，这种记法虽然简介，但不利于不熟悉有关运算的读者理解，故修改如下（原文并没有错误，只是为了更便于理解，修改为下文内容）：
- 修改为：

在 (3.5.3) 式的两边都左乘 \mathbf{q}_i^T ，请注意上面的假设条件： $i \leq j$ ，即 $i = 1, 2, \dots, j-1$ ，那么在 (3.5.3) 式中必然有 $r_{ij}\mathbf{q}_i$ 项，得：

$$\mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j = \mathbf{q}_i^T (r_{1j}\mathbf{q}_1 + r_{2j}\mathbf{q}_2 + \dots + r_{ij}\mathbf{q}_i + \dots + r_{jj}\mathbf{q}_j)$$

利用 (3.5.2) 式，计算可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j &= \mathbf{q}_i^T r_{1j}\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_i^T r_{2j}\mathbf{q}_2 + \dots + \mathbf{q}_i^T r_{ij}\mathbf{q}_i + \dots + \mathbf{q}_i^T r_{jj}\mathbf{q}_j \\ &= r_{1j}\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_1 + r_{2j}\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_2 + \dots + r_{ij}\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_i + \dots + r_{jj}\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_j \\ &= 0 \quad \quad \quad + 0 \quad \quad \quad + \dots + r_{ij} \cdot 1 \quad + \dots + 0 \\ &= r_{ij} \end{aligned}$$

故：

$$\mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j = r_{ij}, \quad (i = 1, 2, \dots, j-1) \quad (3.5.4)$$