

Homework 5 of Introduction to Analysis(II)

AM15 黃琦翔 111652028

March 20, 2024

1. (a) If $x \in A$, $d(x, A) = \|x - x\| = 0$ and $d(x, B) = k > 0$, $\phi(x) = \frac{0}{0+k} = 0$. If $x \in B$, $d(x, A) = l > 0$ and $d(x, B) = 0$, $\phi(x) = \frac{l}{l+0} = 1$. If $x \notin A \wedge x \notin B$, $d(x, A) = l$ and $d(x, B) = k$, $\phi(x) = \frac{l}{l+k} < 1$ and is positive. Thus, $0 \leq \phi(x) \leq 1$ for all $x \in \mathbb{R}^n$.
(b) Let $\phi(x) = (b-a) \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)} + a$. From (a), we can get $\phi(x \in A) = (b-a) \cdot 0 + a = a$, $\phi(x \in B) = (b-a) \cdot 1 + a = b$, and $a \leq \phi(x) \leq b$ for all $x \in A$.
2. If f has more than one fixed point, there exists $x, y \in S$ s.t. $d(f^n(x), f^n(y)) = d(x, y)$ for all $n \in \mathbb{N}$ (contradiction to $a_n \rightarrow 0$). Then, we want to show that f has fixed point.
- 3.