



Set up



Dynamics at the gate  $\rightarrow (0, 0, 0)$   
at origin



$$m\ddot{r}_f^x = T$$

$$\ddot{r}_f^x = \frac{1}{m}T$$

$$\ddot{r}_f^y = 0$$

$$m\ddot{r}_f^z = -mg$$

$$\ddot{r}_f^z = -g$$


# Boundary Conditions.

hovering

1.  $\vec{r}_0$  known
2.  $\dot{\vec{r}}_0 = \vec{0}$
3.  $\ddot{\vec{r}}_0 = \vec{0}$
4.  $\vec{\omega}_0 = \vec{0} \rightarrow \ddot{\vec{r}}_0 = \vec{0}$
5.  $\vec{\alpha}_0 = \vec{0}$

at gate

6.  $\vec{r}_f$  known
7.  $\dot{\vec{r}}_f = (0, \dot{y}, 0)$
8.  $\ddot{\vec{r}}_f = (\frac{T}{m}, 0, -g)$
9.  $\vec{\omega}_f = \vec{0} \rightarrow \ddot{\vec{r}}_f = \vec{0}$
10.  $\vec{\alpha}_f = \dots$



minimum snap trajectory

→ use 7<sup>th</sup>-order polynomial

$$\vec{r}(t) = \sum_{i=0}^7 \vec{a}_i t^i$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \sum_{i=0}^7 i \vec{a}_i t^{i-1}$$

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \sum_{i=0}^7 i(i-1) \vec{a}_i t^{i-2}$$

$$\dddot{\vec{r}}(t) = \sum_{i=0}^7 i(i-1)(i-2) \vec{a}_i t^{i-3}$$

Set up matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & 2 & & & & & \\ & & & 6 & & & & \\ & 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^7 \\ & & 1 & 2t_1 & \dots & 7t_1^6 \\ & & & 2 & \dots & 42t_1^5 \\ & & & & 6 & \dots & 210t_1^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{a}_0 \\ \vec{a}_1 \\ \vec{a}_2 \\ \vec{a}_3 \\ \vec{a}_4 \\ \vec{a}_5 \\ \vec{a}_6 \\ \vec{a}_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{r}_0 \\ \vec{v}_0 \\ \vec{a}_0 \\ \vec{j}_0 \\ \vec{r}_1 \\ \vec{v}_1 \\ \vec{a}_1 \\ \vec{j}_1 \end{bmatrix}$$

$$a : 8 \times 3$$

$$1 \times 8$$

$$t : \begin{bmatrix} 1 & t & \dots & t^7 \end{bmatrix}$$

$$\vec{r}(t) = \begin{matrix} n \times 8 \\ [t] \end{matrix} * \begin{matrix} 8 \times 3 \\ [a] \end{matrix} = \begin{matrix} n \times 3 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ x & y & z \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$