



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시  
 1) 제작연월일 : 2019-08-13  
 2) 제작자 : 교육지대(주)  
 3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초  
 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호  
 되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무  
 단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법  
 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

## 01 / 방정식의 실근의 개수

(1) 방정식  $f(x)=0$ 의 실근의 개수

⇔ 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와  $x$ 축의 교점의 개수

(2) 방정식  $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수

⇔ 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와  $y=g(x)$ 의 그래프의  
 교점의 개수

■ 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하여라.

1.  $\frac{x}{x^2+4} = \frac{1}{5}$

2.  $e^x - x = 1$

3.  $e^x - x - 2 = 0$

4.  $e^x = x - 1$

5.  $e^x - x = 0$

6.  $2x - \sqrt{x-1} = 0$

7.  $x - \sqrt{x+1} + 1 = 0$

8.  $x = \ln x$

9.  $\ln x - 3x = 0$

10.  $x + \sin x = \frac{1}{2}$

11.  $x - \cos x = 0$

■ 다음 방정식이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 상수  $k$ 의 값의 범위를 구하여라.

12.  $e^x = kx \quad (x > 0)$

13.  $e^x - x - k = 0$

14.  $ke^{2x} - e^x + 1 = 0$

15.  $x - \ln x - k = 0$

16.  $\ln x = kx$

17.  $(k-2)e^x = x-2$

18.  $\frac{\ln x}{x} = kx$

■ 다음 물음에 답하여라.

19. 방정식  $\ln x - x - k = 0$ 이 중근을 가질 때,  $k$ 의 값을 구하여라.

20. 방정식  $\ln x - x + 3 - n = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 자연수  $n$ 의 개수를 구하여라.

21.  $x$ 에 대한 방정식  $\ln x - x + n - 15 = 0$ 이 실근을 갖지 않을 때, 자연수  $n$ 의 개수를 구하여라.

22. 닫힌구간  $[-\pi, \pi]$ 에서 방정식  $\sin x = kx$ 가 서로 다른 세 실근을 가지기 위한 상수  $k$ 의 값의 범위를 구하여라.

23. 방정식  $2x^2 - ke^x = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지기 위한 실수  $k$ 의 값의 범위를 구하여라.

24. 곡선  $y = \frac{\ln x}{x^2}$ 와 직선  $y = kx$ 가 서로 다른 두 점에서 만나기 위한  $k$ 의 값의 범위를 구하여라.

25. 방정식  $x^2 = ke^x$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 상수  $k$ 의 값의 범위가  $\alpha < k < \beta$ 일 때,  $\alpha + \beta$ 의 값을 구하여라.

26.  $x$ 에 대한 방정식  $e^x = kx$ 가 오직 하나의 실근을 가질 때, 실수  $k$ 의 값 또는 범위를 구하여라.

27. 방정식  $4x^2e^{-x+2} = k$ 이 서로 다른 세 실근을 가질 때, 정수  $k$ 의 개수를 구하여라.

28. 방정식  $e^{2x} - nx = 0$ 가 실근을 가지지 않도록 하는 정수  $n$ 의 개수를 구하여라.

29. 두 방정식  $\ln x - 2 = kx$ ,  $e^{x+3} = kx$ 가 모두 실근을 갖지 않도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위가  $a < k < b$ 일 때,  $ab$ 의 값을 구하여라.

## 02 부등식에서의 활용

- (1) 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 증명하는 경우  
 $\Rightarrow$  함수  $f(x)$ 에 대하여  $(f(x)$ 의 최솟값) $\geq 0$ 임을 보인다.
- (2)  $x > a$ 에서 부등식  $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 증명하는 경우  
 ① 함수  $f(x)$ 의 극값이 존재할 때  $\Rightarrow x > a$ 에서  $(f(x)$ 의 최솟값) $\geq 0$ 임을 보인다.  
 ② 함수  $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않을 때  $\Rightarrow x > a$ 에서 함수  $f(x)$ 가 증가하고  $f(x) \geq 0$ 임을 보인다.
- (3) 주어진 구간에서 부등식  $f(x) \geq g(x)$ 이 성립함을 증명하는 경우  
 $\Rightarrow h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하고, 그 구간에서  $h(x) \geq 0$ 임을 보인다.

▣ 다음 주어진 부등식이 성립함을 증명하여라.

30. 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $e^x \geq x + 1$ 이 성립함을 증명하여라.

31.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $2\ln x < x + 1$ 가 성립함을 증명하여라.

32.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $\sin x < x^2 + x$ 가 성립함을 증명하여라.

33.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $e^x > \sin x + 1$ 가 성립함을 증명하여라.

34. 모든 실수  $x$ 에 대하여  $2e^x > x + 1$ 이 성립함을 증명하여라.

■ 다음 물음에 답하여라.

35. 양의 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $3x \ln x + x + k \geq 0$ 이 성립할 때, 상수  $k$ 의 최솟값을 구하여라.

36.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $x \ln x \geq a - x$ 가 성립하도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값을 구하여라.

37.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $ex - \ln ax \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 개수를 구하여라. (단,  $e = 2.7$ 로 계산한다.)

38.  $1 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $\alpha x \leq e^x \leq \beta x$ 가 성립하도록  $\alpha, \beta$ 를 정할 때,  $\beta - \alpha$ 의 최솟값을 구하여라.

39.  $e \leq x \leq e^2$ 일 때, 부등식  $x \ln x - 3x + 2 + k \leq 0$ 이 성립하기 위한 상수  $k$ 의 최댓값을 구하여라.

40.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $x \geq \ln ax$ 가 항상 성립하도록 하는 양수  $a$ 의 값의 범위를 구하여라.

41. 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $e^x \geq x + k$ 가 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 최댓값을 구하여라.

42.  $0 < x < 8$ 일 때, 부등식  $2\sqrt{x+1} > x+a$ 가 항상 성립하도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값을 구하여라.

43. 모든 실수  $t$ 에 대하여 부등식  $2t^2 - 4t\cos x + 3\sin x > 0$ 이 성립하도록 하는 실수  $x$ 의 값의 범위를 구하여라. (단,  $0 \leq x < 2\pi$ )

44. 모든 양수  $x$ 에 대하여 부등식  $e^x + \sin x - a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값을 구하여라.

45. 모든 양수  $x$ 에 대하여  $x^2 - 2\ln x - a \geq 0$ 가 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값을 구하여라.

46.  $x > 0$ 일 때, 부등식  $(\ln x)^2 - 4\ln x > a$ 를 만족하는 정수  $a$ 의 최댓값을 구하여라.

### 03 속도와 가속도

#### 1. 직선 운동에서의 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x=f(t)$ 일 때, 시각  $t$ 에서의 점 P의 속도를  $v$ , 가속도를  $a$ 라 하면

$$\textcircled{1} v = \frac{dx}{dt} = f'(t) \quad \textcircled{2} a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$$

#### 2. 평면 운동에서의 속도와 가속도

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $(x, y)$ 가  $x=f(t)$ ,  $y=g(t)$ 일 때, 시각  $t$ 에서의 점 P의 속도와 가속도는

$$\textcircled{1} \text{ 속도: } \left( \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right), \text{ 즉 } (f'(t), g'(t))$$

$$\textcircled{2} \text{ 가속도: } \left( \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right), \text{ 즉 } (f''(t), g''(t))$$

(참고) 속도의 크기(속력)

$$: \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$$

가속도의 크기

$$: \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

■ 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 좌표  $(x, y)$ 에 대하여  $x = \cos t$ ,  $y = \sin 2t$ 일 때, 다음 물음을 구하여라.

47.  $t = \frac{\pi}{6}$ 에서의 속도

48.  $t = \frac{\pi}{6}$ 에서의 속력

49.  $t = \frac{\pi}{6}$ 에서의 가속도

50.  $t = \frac{\pi}{6}$ 에서의 가속도의 크기

■ 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x=f(t)$ 가 다음과 같을 때, [ ]안의 시각  $t$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하여라.

51.  $f(t) = e^t - 2t$  [ $t=3$ ]

52.  $f(t) = 1 - e^{-2t}$  [ $t=1$ ]

53.  $f(t) = 4\sin\frac{\pi}{2}t + 3\cos\frac{\pi}{2}t$  [ $t=5$ ]

54.  $f(t) = 3t - \sin 2t$  [ $t = \frac{\pi}{6}$ ]

55.  $f(t) = 2t + \sin\frac{\pi}{2}t$  [ $t=1$ ]

56.  $f(t) = t + \ln(t^2 + 4)$  [ $t=2$ ]

■ 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가 다음과 같을 때, [ ]안의 시각  $t$ 에서의 점 P의 속력을 구하여라.

57.  $x = t^2 + 1, y = 2t$  [ $t=2$ ]

58.  $x = -t^2 + 2t, y = e^{-2t}$  [ $t=1$ ]

59.  $x = 4t^3, y = 5t + 3$  [ $t=1$ ]

60.  $x = 2t - \frac{1}{t}, y = t + \frac{2}{t}$  ( $t > 0$ ) [ $t=1$ ]

61.  $x = \sqrt{t}, y = 2\ln t$  [ $t=4$ ]

62.  $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$  [ $t=\pi$ ]

63.  $x = 5(1 - \cos t), y = t - \sin t$  [ $t=\pi$ ]

■ 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가 다음과 같을 때, [ ]안의 시각  $t$ 에서의 점  $P$ 의 속도와 가속도를 구하여라.

64.  $x = 3t - 2, y = \frac{2}{3}t^3 - 2$  [ $t = 2$ ]

65.  $x = 1 + \sqrt{t}, y = \ln t$  [ $t = 1$ ]

66.  $x = 2t - 1, y = e^t + e^{-t}$  [ $t = 2$ ]

67.  $x = t - 2\sin t, y = t - 2\cos t$  [ $t = \pi$ ]

68.  $x = 2t - \cos t, y = 1 + \sin t$  [ $t = \frac{\pi}{2}$ ]

69.  $x = e^t + e^{-2t}, y = e^t - e^{-2t}$  [ $t = \ln 2$ ]

■ 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가 다음과 같을 때, [ ]안의 시각  $t$ 에서의 점  $P$ 의 가속도의 크기를 구하여라.

70.  $x = \frac{2}{3}t^3, y = \frac{1}{4}t^4 - 3t^2 + 1$  [ $t = 1$ ]

71.  $x = 20 + \cos 2t, y = 16 + \sin 2t$  [ $t = 10$ ]

72.  $x = 5(1 - \cos t), y = 5(t - \sin t)$  [ $t = \pi$ ]

73.  $x = 2t^2 + \cos 2t, y = 3 - \frac{1}{2} \sin 2t$  [ $t = \frac{\pi}{2}$ ]

74.  $x = t + \cos t, y = 2t - 2 \sin t$  [ $t = \frac{\pi}{6}$ ]

75.  $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$  [ $t = 3$ ]

■ 다음 물음에 답하여라.

76. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치

$x=f(t)$ 가  $f(t)=\sin\frac{t}{3}+\frac{t}{6}$ 일 때, 점 P의 속력이 처음으로 0이 되는 시각을 구하여라.

77. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 좌표가 시각  $t$ 일 때,  $x=-2t^3-3t^2+36t$ 이다. 이 때, 점 P의 운동방향이 바뀌는 시각을 구하여라.

78. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x=f(t)$ 가  $f(t)=3\sin t-4\sin^3 t$ 일 때, 점 P가 처음으로 방향을 바꾸는 시각을 구하여라.

79. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t(t>0)$ 에서의 위치가  $x=2\sqrt{2}t$ ,  $y=t^2-\ln 2t$ 이다. 점 P의 속력이 최소일 때, 시각을 구하여라.

80. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=8t$ ,  $y=2t^2-4t$ 이다. 점 P의 속력이 8일 때의 시각을 구하여라.

81. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=-1+\sin 3t$ ,  $y=\cos 3t+t$ 일 때, 점 P의 속력의 최댓값을 구하여라.

82. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=\frac{1}{2}t^2+t$ ,  $y=t^2-2t-1$ 일 때, 점 P의 속력의 최솟값을 구하여라.

83. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=2t+1$ ,  $y=\frac{1}{2}t^2-\ln t$ 일 때, 점 P의 속력의 최소가 되는 순간의 속도를 구하여라. (단,  $t>0$ )

84. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=t-\sin t$ ,  $y=1-\cos t$ 일 때, 점 P의 속력이 최대가 되는 시각을 구하여라. (단,  $0\leq t\leq 2\pi$ )

85. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x,y)$ 의 시각  $t$ 에서의 좌표가  $x=\frac{t^2}{2}-\ln t$ ,  $y=2t$ 이다. 속력이 최소가 되는 순간의 점 P의 가속도의 크기를 구하여라.



86. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 위치  $(x, y)$ 가  $x = e^t \cos t$ ,  $y = e^t \sin t$ 이다. 점  $P$ 의 속력이  $\sqrt{2}e^3$ 일 때의 시각을 구하여라.

87. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치는  $x = e^t \cos t$ ,  $y = e^t \sin t$ 이다. 점  $P$ 의 속력이  $4\sqrt{2}$ 인 점에서의 가속도의 크기를 구하여라.

88. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 위치  $(x, y)$ 가  $x = 4\sqrt{2}t$ ,  $y = (t+1)^2 - 4\ln(t+1)$ 일 때, 속력이 최소가 되는 시각을 구하여라.

89. 좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x = t + \sin t$ ,  $y = 2\cos t$ 일 때, 점  $P$ 의 속력이 최대가 되는 시각에서의 가속도의 크기를 구하여라.



## 정답 및 해설

1) 2

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x}{x^2+4} \text{라 놓으면}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2+4) - x \times 2x}{(x^2+4)^2}$$


$$f'(x) = \frac{-(x+2)(x-2)}{(x^2+4)^2}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=2 \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)=0$$

함수  $y=f(x)$ 의 증가와 감소를 나타내는 표와 그래프는 다음과 같다.

$x$	$\dots$	$-2$	$\dots$	$2$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$	$0$	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{1}{4}$	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$	$\searrow$



함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $y=\frac{1}{5}$ 이 서로 다른 두 점에서 만나므로 방정식  $\frac{x}{x^2+4}=\frac{1}{5}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.


2) 1

$$\Rightarrow f(x) = e^x - x \text{라 놓으면 } f'(x) = e^x - 1 \text{이고}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0$$

함수  $y=f(x)$ 의 증가와 감소를 나타내는 표와 그래프는 다음과 같다.

$x$	$\dots$	$0$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$1$	$\nearrow$



함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $y=1$ 이 한 점에서 만나므로 방정식  $e^x - x = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.


3) 2

$$\Rightarrow f(x) = e^x - x - 2 \text{라고 하면 } f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0$$

이때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 그래프를 그리면 다음과 같다.

$x$	$\dots$	$0$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$-1$	$\nearrow$



따라서 함수  $f(x) = e^x - x - 2$ 의 그래프와  $x$ 축과의 교점이 2개이므로 방정식  $e^x - x - 2 = 0$ 의 실근의 개수는 2개이다.


4) 0

$$\Rightarrow f(x) = e^x - x + 1 \text{이라고 하면 } f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0$$

이때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 그래프를 그리면 다음과 같다.

$x$	$\dots$	$0$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$2$	$\nearrow$



따라서 함수  $f(x) = e^x - x + 1$ 의 그래프와  $x$ 축이 만나지 않으므로 주어진 방정식의 실근은 없다. 즉, 실근의 개수는 0개다.

5) 0

$$\Rightarrow f(x) = e^x - x \text{라 하면}$$


$$f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0$$

$x$	$\dots$	$0$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$1$	$\nearrow$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{이므로}$$

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 0이다.

6) 1


$\Rightarrow f(x) = 2x - \sqrt{x} - 1$ 이라 하면  $x \geq 0$ 이고

$$f'(x) = 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{4\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } 4\sqrt{x} - 1 = 0, \sqrt{x} = \frac{1}{4} \therefore x = \frac{1}{16}$$

$x$	0	...	$\frac{1}{16}$	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	-1	$\searrow$	$-\frac{9}{8}$	$\nearrow$

이때  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

7) 2

$\Rightarrow f(x) = x - \sqrt{x+1} + 1$ 이라 하면  $x \geq -1$ 이고


$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2\sqrt{x+1} - 1}{2\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } 2\sqrt{x+1} = 1, \sqrt{x+1} = \frac{1}{2}$$

$$x+1 = \frac{1}{4} \therefore x = -\frac{3}{4}$$

$x$	-1	...	$-\frac{3}{4}$	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{1}{4}$	$\nearrow$

이때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식은 서로 다른 두 개의 실근을 갖는다.

8) 0

$\Rightarrow f(x) = \ln x - x$ 라 하면  $x > 0$ 이고


$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \text{이므로}$$

$x$	0	...	1	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\nearrow$	-1	$\searrow$

함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 0이다.

9) 0


$$\Rightarrow f(x) = \ln x - 3x \text{라고 하면 } f'(x) = \frac{1}{x} - 3$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{1}{3}$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	$\frac{1}{3}$	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\nearrow$	$-1 - \ln 3$	$\searrow$

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 이므로 함수  $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 함수  $f(x) = \ln x - 3x$ 의 그래프는  $x$ 축과

만나지 않으므로 방정식  $\ln x - 3x = 0$ 의 실근의 개수는 0개이다.

10) 1

⇒ 방정식  $x + \sin x = \frac{1}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는

곡선  $y = x + \sin x$ 와 직선  $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 개수와 같다.


$f(x) = x + \sin x$ 라 하면

$f'(x) = 1 + \cos x$

$f'(x) \geq 0$ 이므로 함수  $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

이때  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 이므로 함수

$y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

11) 1


⇒  $f(x) = x - \cos x$ 로 놓으면  $f'(x) = 1 + \sin x \geq 0$

( $\because -1 \leq \sin x \leq 1$ )이므로

함수  $f(x)$ 는 실수 전체의 구간에서 증가한다.

이때,  $f(0) = -1 < 0$ ,  $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > 0$ 이므로

함수  $f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



즉, 함수  $f(x) = x - \cos x$ 와  $x$ 축과의 교점이 1개이므로 방정식  $x - \cos x = 0$ 의 실근의 개수는 1개이다.

12)  $k > e$

⇒  $x \neq 0$ 이므로  $e^x = kx$ 의 근은 곡선  $y = \frac{e^x}{x}$ 와 직선

$y = k$ 의 교점의  $x$ 좌표와 같다.

$f(x) = \frac{e^x}{x}$ 라고 하면

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$


$f'(x) = 0$ 에서  $x = 1$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	$e$	↗

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 함수

$f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 방정식  $e^x = kx$ 가 서로 다른 두 실근을 갖는  $k$ 의 범위는  $k > e$ 이다.

13)  $k > 1$

⇒  $f(x) = e^x - x$ 라고 하면  $f'(x) = e^x - 1$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 0$

$x$	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	1	↗

따라서  $k > 1$ 이면 곡선  $y = e^x - x$ 와 직선  $y = k$ 는 서로 다른 두 점에서 만난다.

14)  $0 < k < \frac{1}{4}$

⇒  $e^x = t$ 라 하면  $t > 0$ 이고

$kt^2 - t + 1 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면

$$1 - 4k > 0 \quad \therefore k < \frac{1}{4}$$

또  $k = 0$ 이면  $e^x = 1$ 은 하나의 근을 가지므로  $k > 0$ 이어야 한다.

따라서 구하고자 하는 범위는  $0 < k < \frac{1}{4}$ 이다.

15)  $k > 1$

⇒  $x - \ln x - k = 0$ 에서  $x - \ln x = k$ 이므로 주어진 방정식의 근은 곡선  $y = x - \ln x$ 와 직선  $y = k$ 의 교점의  $x$ 좌표와 같다.

$f(x) = x - \ln x$ 라고 하면  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$


$f'(x) = 0$ 에서  $x = 1$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	1	↗

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 함수

$f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 방정식  $x - \ln x - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는  $k$ 의 범위는  $k > 1$ 이다.

16)  $0 < k < \frac{1}{e}$

$\Rightarrow x \neq 0$ 이므로  $\ln x = kx$ 의 근은 곡선  $y = \frac{\ln x}{x}$ 와 직선  $y = k$ 의 교점의  $x$ 좌표와 같다.

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \text{라고 하면 } f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$


$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = e$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	$e$	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		↗	$\frac{1}{e}$	↘

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이므로 함수

$f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



방정식  $\ln x = kx$ 가 서로 다른 두 실근을 가지는  $k$ 의 범위는  $0 < k < \frac{1}{e}$ 이다.

17)  $2 < k < e^{-3} + 2$

$$\Rightarrow f(x) = (k-2)e^x - x + 2 \text{라 하면}$$

$$f'(x) = (k-2)e^x - 1$$

$$f'(x) = 0 \text{이 되는 } x = \ln \frac{1}{k-2} \text{이므로}$$

$$f\left(\ln \frac{1}{k-2}\right) = 1 - \ln \frac{1}{k-2} + 2 < 0 \text{이 극솟값이자 최}$$

솟값이다.

따라서 이를 만족하는  $k$ 는

$$\ln(k-2) < -3$$

$$\therefore 2 < k < e^{-3} + 2$$

18)  $0 < k < \frac{1}{2e}$

$$\Rightarrow \frac{\ln x}{x} = kx \text{에서 } \ln x = kx^2$$

$$f(x) = \ln x - kx^2 \text{이라 하면}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2kx$$

$$f'(x) = 0, x^2 = \frac{1}{2k} \therefore x = \frac{1}{\sqrt{2k}} (\because x > 0)$$

따라서 최댓값이  $x = \frac{1}{\sqrt{2k}}$ 일 때이므로

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2k}}\right) = \ln \frac{1}{\sqrt{2k}} - k \cdot \frac{1}{2k} < 0 \text{이므로}$$

$$\ln \frac{1}{\sqrt{2k}} > \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 < k < \frac{1}{2e}$$

19) -1

$$\Rightarrow f(x) = \ln x - x \text{라 하면 } f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

$$f'(x) = 0 \therefore x = 1$$

$$\text{따라서 } f(1) = -1 = k \text{이므로 } k = -1$$

20) 2

$$\Rightarrow \ln x - x + 3 - n = 0 \text{에서 } \ln x - x + 3 = n$$

$$f(x) = \ln x - x + 3 (x > 0) \text{이라고 하면}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$


$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	1	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		↗	2	↘

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 이므로 함수

$f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



방정식  $\ln x - x + 3 - n = 0$ 이 실근을 가질 조건은  $n \leq 2$

따라서 자연수  $n$ 은 1, 2로 2개이다.

21) 15

$$\Rightarrow f(x) = \ln x - x \text{라 하면 } f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$


$$f'(x) = 0 \quad \therefore x = 1$$

$f(x)$ 는  $x=1$ 일 때, 극대이므로

$$f(x) = 15 - n > f(1)$$

$$15 - n > -1 \quad \therefore n < 16$$

따라서 자연수  $n$ 의 개수는 15개이다.

22)  $0 \leq k < 1$ 

달한구간  $[-\pi, \pi]$ 에서 방정식  $\sin x = kx$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 함수  $y = \sin x$ 의 그래프와 직선  $y = kx$ 의 교점이 3개이어야 하므로  $k$ 는  $k \geq 0$ 이고, 곡선  $y = \sin x$  위의 점  $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기보다 작아야 한다. 이때,  $y = \sin x$ 에서  $y' = \cos x$ 이므로 점  $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기는  $\cos 0 = 1$ 이다.

따라서 구하는 상수  $k$ 의 값의 범위는  $0 \leq k < 1$ 이다.

23)  $0 < k < \frac{8}{e^2}$ 

$$\Rightarrow f(x) = 2x^2, g(x) = ke^x \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 4x, g'(x) = ke^x$$

$f(x)$ 의  $g(x)$ 의 교점의  $x$ 좌표를  $t$ 라 하면

$$4t = ke^t \text{이고 } 2t^2 = ke^t \text{이므로 } 4t = 2t^2 \text{이다.}$$

$$2t^2 - 4t = 0, 2t(t - 2) = 0$$

$$\therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 2$$

$$\text{i) } t = 0 \text{이면 } k = 0$$

$$\text{ii) } t = 2 \text{이면 } k = \frac{8}{e^2}$$

서로 다른 세 실근을 가지는 실수  $k$ 의 범위는

$$0 < k < \frac{8}{e^2} \text{이다.}$$

24)  $0 < k < \frac{1}{3e}$ 

$$\Rightarrow \text{방정식 } \frac{\ln x}{x^2} = kx \text{에서 } x \neq 0 \text{이므로 양변을 } x \text{로 나}$$

$$\text{누면 } \frac{\ln x}{x^3} = k \text{이고 곡선 } y = \frac{\ln x}{x^3} \text{와 직선 } y = kx \text{가}$$

서로 다른 두 점에서 만나기 위한  $k$ 값의 범위를 구한다.

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^3} \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^3 - \ln x \cdot 3x^2}{x^6} = \frac{1 - 3\ln x}{x^4}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = e^{\frac{1}{3}}$$

$x$	(0)	...	$e^{\frac{1}{3}}$	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		↗	$\frac{1}{3e}$	↘

한편,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이므로

$0 < k < \frac{1}{3e}$ 일 때, 곡선  $y = \frac{\ln x}{x^3}$ 와 직선  $y = kx$ 는 서로 다른 두 점에서 만난다.

따라서  $0 < k < \frac{1}{3e}$ 일 때, 곡선  $y = \frac{\ln x}{x^2}$ 와 직선  $y = kx$ 도 서로 다른 두 점에서 만난다.

25)  $\frac{4}{e^2}$ 


$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{e^x} \text{라 하고 } g(x) = k \text{라 하면}$$

$$f'(x) = \frac{2x \cdot e^x - x^2 \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{x(2-x)}{e^x}$$

$$f'(x) = 0 \text{인 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

$x$	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	0	↗	$\frac{4}{e^2}$	↘

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ 이므로 그래프는



방정식  $x^2 = ke^x$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로 즉  $f(x) = g(x)$ 가 서로 다른 세 실근을 가지므로

$$\therefore 0 < k < \frac{4}{e^2}$$

$$\therefore \alpha + \beta = 0 + \frac{4}{e^2} = \frac{4}{e^2}$$

26)  $k = e$  또는  $k < 0$ 


$\Rightarrow$  방정식  $e^x = kx$ 가 오직 하나의 실근을 가지려면 곡선  $y = e^x$ 과 직선  $y = kx$ 가 한 점에서 만나야 한다.

먼저, 두 함수의 그래프가 접하는 경우를 구해 보

자.

$f(x) = e^x$ ,  $g(x) = kx$ 라 놓으면

$f'(x) = e^x$ ,  $g'(x) = k$



곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=g(x)$ 가 접할 때의 접점의  $x$ 좌표를  $a$ 라 하면 함숫값이 같으므로

$f(a) = g(a)$ 에서  $e^a = ka \cdots \textcircled{1}$

접선의 기울기가 같으므로  $f'(a) = g'(a)$ 에서

$e^a = k \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ ,  $\textcircled{2}$ 에서  $a=1$ ,  $k=e$

즉,  $k=e$ 일 때, 두 함수의 그래프가 접한다.

한편, 두 함수의 그래프로부터  $k < 0$ 일 때 교점이 한 개임을 알 수 있다.

따라서 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=g(x)$ 가 한 점에서 만나도록 하는 실수  $k$ 의 값 또는 범위는  $k=e$  또는  $k < 0$ 이다.

27) 15

$\Rightarrow f(x) = 4x^2e^{-x+2} - k$ 라 하면

$f'(x) = 8xe^{-x+2} + 4x^2(-e^{-x+2}) = 0$  을 만족하는  $x=0$ 과  $x=2$ 이므로

$f(x)$ 는  $x=0$ 에서 극소,  $x=2$ 에서 극대를 갖고

$f(0)f(2) = -k(16-k) < 0$ 이어야 서로 다른 세 실근을 갖는다.

따라서  $k$ 의 범위는  $k(k-16) < 0$ 이므로  $0 < k < 16$ 이고, 정수  $k$ 의 정수는 15개이다.

28) 5

$\Rightarrow f(x) = e^{2x} - nx$ 라 하면  $f'(x) = 2e^{2x} - n$ 이므로

$f'(x) = 0$ 을 만족하는  $x = \frac{1}{2} \ln \frac{n}{2}$

또한  $f''(x) = 4e^{2x} > 0$ 이므로  $x = \frac{1}{2} \ln \frac{n}{2}$ 에서  $f(x)$

는 극솟값을 갖는다.

그러므로

$f\left(\frac{1}{2} \ln 2\right) = \frac{n}{2} - \frac{n}{2} \ln \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \left(1 - \ln \frac{n}{2}\right) > 0$ 을

만족하는  $n$ 은  $1 - \ln \frac{n}{2} > 0$ 이므로  $0 < n < 2e < 5.5$

이고 이에 해당하는 자연수  $n$ 은 5개이다.

29)  $e$

$\Rightarrow$  주어진 두 방정식이 모두 실근을 갖지 않으므로 직선  $y=kx$ 가 두 곡선  $y=\ln x-2$ ,  $y=e^{x+3}$ 과 모두 만나지 않아야 한다.

(i) 직선  $y=kx$ 가 곡선  $y=\ln x-2$ 와 접할 때,

$y=\ln x-2$ 에서  $y' = \frac{1}{x}$ 이므로  $y=\ln x-2$  위의 점  $(t, \ln t-2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (\ln t - 2) = \frac{1}{t}(x - t)$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$-\ln t + 2 = -1 \quad \therefore t = e^3$$

따라서 직선  $y=kx$ 가 점  $(e^3, 1)$ 을 지나므로

$$k = \frac{1}{e^3}$$

(ii) 직선  $y=kx$ 가 곡선  $y=e^{x+3}$ 과 접할 때,

$y=e^{x+3}$ 에서  $y' = e^{x+3}$ 이므로  $y=e^{x+3}$  위의 점  $(s, e^{s+3})$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - e^{s+3} = e^{s+3}(x - s)$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$-e^{s+3} = -s \cdot e^{s+3} \quad \therefore s = 1$$

따라서 직선  $y=kx$ 가 점  $(1, e^4)$ 를 지나므로

$$k = e^4$$

즉 두 방정식이 모두 실근을 갖지 않도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위는  $\frac{1}{e^3} < k < e^4$

$$\therefore ab = \frac{1}{e^3} \times e^4 = e$$

30)  $f(x) = e^x - x - 1$ 이라 하면

$$f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0$$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{이다.}$$

즉, 함수  $f(x)$ 의 최솟값은 0이므로

$$f(x) \geq 0, \text{ 즉 } e^x - x - 1 \geq 0$$

따라서 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $e^x \geq x+1$ 이 성립한다.

31)  $f(x) = 2\ln x - x - 1$ 이라 놓으면  $f'(x) = \frac{2}{x} - 1$


$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 2$$

$x$	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	$2\ln 2 - 3$	$\searrow$

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고 이 함수는  $x=2$ 에서 최댓값  $2\ln 2 - 3$ 을 가진다.

$$2\ln 2 - 3 = \ln 4 - \ln e^3 < 0$$

따라서  $2\ln x - x - 1 < 0$ 이므로  $2\ln x < x+1$ 이다.



32)  $f(x) = \sin x - x^2 - x$ 라고 하면


$$f'(x) = \cos x - 2x - 1$$

$x > 0$ 이고,  $|\cos x| \leq 1$ 이므로  $f'(x) < 0$

또,  $f'(0) = 0$

따라서  $x > 0$ 에서  $f(x) < 0$ 이므로

$$\sin x < x^2 + x$$



33)  $f(x) = e^x - \sin x - 1$ 로 놓으면

$$f'(x) = e^x - \cos x$$

이때, 도함수  $f'(x)$ 는  $x > 0$ 에서  $e^x > 1$ 이고

$-1 < \cos x < 1$ 이므로  $f'(x) > 0$ 이다.

따라서  $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 구간에서 증가한다.

또,  $f(0) = 0$

따라서  $x > 0$ 에서  $f(x) > 0$ 이므로

$$e^x > \sin x + 1$$

34)  $f(x) = 2e^x - x - 1$ 이라 놓으면

$$f'(x) = 2e^x - 1$$


$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -\ln 2$$

$x$	$\dots$	$-\ln 2$	$\dots$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\ln 2$	$\nearrow$

함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고 이 함수는  $x = -\ln 2$ 에서 최솟값  $\ln 2$ 를 가진다.

$$2e^x - x - 1 \geq \ln 2 > 0$$

$$\therefore 2e^x > x + 1$$



35)  $3e^{-\frac{4}{3}}$

$\Rightarrow f(x) = 3x \ln x + x + k$  ( $x > 0$ )라고 하면

$$f'(x) = 3 \ln x + 3x \cdot \frac{1}{x} + 1 = 3 \ln x + 4$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = e^{-\frac{4}{3}}$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	$(0)$	$\cdots$	$e^{-\frac{4}{3}}$	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	$0$	$+$
$f(x)$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

$f(x)$ 의 최솟값은

$$f\left(e^{-\frac{4}{3}}\right) = 3 \cdot e^{-\frac{4}{3}} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) + e^{-\frac{4}{3}} + k = -3e^{-\frac{4}{3}} + k$$

이때  $f\left(e^{-\frac{4}{3}}\right) \geq 0$ 이어야 하므로

$$-3e^{-\frac{4}{3}} + k \geq 0 \quad \therefore k \geq 3e^{-\frac{4}{3}}$$

36)  $-\frac{1}{e^2}$

$\Rightarrow f(x) = x \ln x + x - a$ 로 놓으면

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} + 1 = \ln x + 2$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{1}{e^2}$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	$(0)$	$\dots$	$\frac{1}{e^2}$	$\dots$
$f'(x)$		$-$	$0$	$+$
$f(x)$		$\searrow$	$-\frac{1}{e^2} - a$	$\nearrow$

함수  $f(x)$ 의 최솟값은  $-\frac{1}{e^2} - a$ 이므로  $f(x) \geq 0$

에서  $-\frac{1}{e^2} - a \geq 0$ , 즉  $a \leq -\frac{1}{e^2}$ 이다.

따라서 실수  $a$ 의 최댓값은  $-\frac{1}{e^2}$ 이다.

37) 7

$\Rightarrow f(x) = ex - \ln ax$ 라고 하면

$$f'(x) = e - \frac{a}{ax} = e - \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{1}{e}$$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	$(0)$	$\dots$	$\frac{1}{e}$	$\dots$
$f'(x)$		$-$	$0$	$+$
$f(x)$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

$f(x)$ 의 최솟값은

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = e \cdot \frac{1}{e} - \ln\left(a \cdot \frac{1}{e}\right) = 1 - (\ln a - 1) = 2 - \ln a$$

이므로  $x > 0$ 에서  $f(x) \geq 0$ 려면,

$$f\left(\frac{1}{e}\right) \geq 0, \quad 2 - \ln a \geq 0, \quad \ln a \leq 2$$



$$\therefore 0 < a \leq e^2 \quad (\because x > 0)$$

이때,  $e = 2.7$ 이므로  $e^2 = 7.29$ 이고,

구하는 정수  $a$ 는 1, 2, 3, ..., 7로 7개이다.

$$38) e\left(\frac{e}{2}-1\right)$$

$\Rightarrow 1 \leq x \leq 2$ 이므로  $x \neq 0$ 이다.

따라서  $\alpha x \leq e^x \leq \beta x$ 에서  $x$ 로 나누면,

$$\alpha \leq \frac{e^x}{x} \leq \beta$$

이때,  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ 이라고 하면  $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 1$

$1 \leq x \leq 2$ 에서 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	1	...	2
$f'(x)$	0	+	
$f(x)$	$e$	$\nearrow$	$\frac{e^2}{2}$

최솟값은  $x=1$ 일 때,  $f(1)=e$ ,

최댓값은  $x=2$ 일 때,  $f(2)=\frac{e^2}{2}$

$$\therefore \alpha \leq e, \beta \geq \frac{e^2}{2}$$

따라서  $\beta - \alpha$ 의 최솟값은  $\frac{e^2}{2} - e = e\left(\frac{e}{2} - 1\right)$

$$39) 2e - 2$$

$\Rightarrow f(x) = x \ln x - 3x + 2 + k$ 라고 하면

$$f'(x) = \ln x + 1 - 3 = \ln x - 2$$

$e \leq x \leq e^2$ 에서  $f'(x) \leq 0$ 이므로 함수  $f(x)$ 는 감소한다. 따라서 함수  $f(x)$ 의 최댓값은  $f(e)$ 이고,  
 $f(e) \leq 0$ 에서  $e \ln e - 3e + 2 + k = -2e + 2 + k \leq 0$ ,  
 $-2e + 2 + k \leq 0, k \leq 2e - 2$

따라서 구하는 상수  $k$ 의 최댓값은  $2e - 2$

$$40) 0 < a \leq e$$

$\Rightarrow f(x) = x - \ln ax$ 로 놓으면  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 1$

$x > 0$ 일 때, 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$x$	(0)	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	$1 - \ln a$	$\nearrow$

함수  $f(x)$ 의 최솟값은  $f(1) = 1 - \ln a$ 이므로

$1 - \ln a \geq 0$ , 즉  $\ln a \leq 1$ 이다.

$$\therefore 0 < a \leq e$$

$$41) 1$$

$\Rightarrow f(x) = e^x - x - k$ 라 놓으면  $f'(x) = e^x - 1$

$f'(x) = 0$ 에서  $x = 0$

$x$	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$1 - k$	$\nearrow$

함수  $f(x)$ 의 최솟값은  $f(0) = 1 - k$ 이므로

$$1 - k \geq 0 \quad \therefore k \leq 1$$

따라서 실수  $k$ 의 최댓값은 1이다.

$$42) -2$$

$\Rightarrow f(x) = 2\sqrt{x+1} - x - a$ 라 놓으면

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}} - 1$$

$0 < x < 8$ 에서  $f'(x) < 0$ 이므로 함수  $f(x)$ 는  $0 < x < 8$ 에서 감소하는 함수이다.

$0 < x < 8$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) > 0$ 이 성립하려면  $f(8) = 2\sqrt{9} - 8 - a = -2 - a \geq 0$

$$\therefore a \leq -2$$

따라서 실수  $a$ 의 최댓값은  $-2$ 이다.

$$43) \frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$$

$\Rightarrow$  부등식에서 이차식이 항상 양수가 되려면 이 이차식의 판별식은 0보다 작아야 하므로

$$D/4 = 4(1 - \sin^2 x) - 6\sin x < 0$$

$$(2\sin x - 1)(\sin x + 2) > 0$$

$$\therefore \sin x > \frac{1}{2}$$

따라서 이를 만족하는 범위는  $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$ 가 된다.

$$44) 1$$

$\Rightarrow f(x) = e^x + \sin x$ 라 하고  $f(x) \geq a$ 가 항상 성립하는 것을 확인하면

$f'(x) = e^x + \cos x$ 이고,  $x > 0$ 일 때,  $f'(x) > 0$ 이므로  $f(x)$ 는  $x > 0$ 일 때 증가함수이다.

따라서  $f(0) = 1 \geq a$ 이므로 실수  $a$ 의 최댓값은 1이다.

$$45) 1$$

$\Rightarrow x^2 - 2\ln x \geq a$ 가 성립해야 하므로

$f(x) = x^2 - 2\ln x$ 에서  $x > 0$ 일 때,  $f(x)$ 의 최솟값을 구하면

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$$

$f'(x) = 0$ 인  $x = 1$ 이고, 이때  $f(x)$ 가 최솟값을  $f(1) = 1$ 을 가지므로  $1 \geq a$ 이다.

따라서 정수  $a$ 의 최댓값은 1이다.

$$46) -5$$

$\Rightarrow$  주어진 부등식이 성립하려면

$f(x) = (\ln x)^2 - 4\ln x$ 라 할 때,  $f(x)$ 의 최솟값이  $a$ 보다 커야한다.

$$f'(x) = \frac{2\ln x}{x} - \frac{4}{x} \text{ 이고, } f'(x) = 0 \text{ 인 } x = e^2 \text{ 이다.}$$

$x > 0$  일 때,  $f(x)$  의 최솟값은  $f(e^2) = -4$  이므로  $a < -4$  이다.

따라서 정수  $a$  의 최댓값은  $-5$  이다.

$$47) \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (-\sin t, 2\cos 2t) \text{ 이므로 } t = \frac{\pi}{6} \text{ 를 대입}$$

$$\text{하면 } \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$48) \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \text{ 에서의 속력은 } \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$49) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -2\sqrt{3}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) = (-\cos t, -4\sin 2t) \text{ 이므로 } t = \frac{\pi}{6} \text{ 를 대}$$

$$\text{입하면 } \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -2\sqrt{3}\right)$$

$$50) \frac{\sqrt{51}}{2}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \text{ 에서의 가속도의 크기는}$$

$$\sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + 12} = \frac{\sqrt{51}}{2}$$

$$51) \text{ 속도: } e^3 - 2, \text{ 가속도: } e^3$$

$$\Rightarrow \text{점 } P \text{ 의 시간 } t \text{ 에서의 속도를 } v, \text{ 가속도를 } a \text{ 라 하}$$

$$\text{면 } v = f'(t) = e^t - 2, \quad a = f''(t) = e^t$$

$$\text{이므로 } t = 3 \text{ 에서의 점 } P \text{ 의 속도와 가속도는}$$

$$v = e^3 - 2, \quad a = e^3$$

$$52) \text{ 속도: } \frac{2}{e^2}, \text{ 가속도: } -\frac{4}{e^2}$$

$$\Rightarrow \text{점 } P \text{ 의 시간 } t \text{ 에서의 속도를 } v, \text{ 가속도를 } a \text{ 라 하}$$

$$\text{면}$$

$$v = f'(t) = 2e^{-2t}, \quad a = f''(t) = -4e^{-2t} \text{ 이므로}$$

$$t = 1 \text{ 에서의 점 } P \text{ 의 속도와 가속도는}$$

$$v = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2}, \quad a = -4e^{-2} = -\frac{4}{e^2}$$

$$53) \text{ 속도: } -\frac{3}{2}\pi, \text{ 가속도: } -\pi^2$$

$$\Rightarrow x(t) = 4\sin \frac{\pi}{2}t + 3\cos \frac{\pi}{2}t$$

$$v(t) = 2\pi \cos \frac{\pi}{2}t - \frac{3}{2}\pi \sin \frac{\pi}{2}t$$

$$a(t) = -\pi^2 \sin \frac{\pi}{2}t - \frac{3}{4}\pi^2 \cos \frac{\pi}{2}t$$

$$\text{따라서 } t = 5 \text{ 일 때 속도 } v(5) = -\frac{3}{2}\pi, \quad a(5) = -\pi^2$$

$$\text{이다.}$$

$$54) \text{ 속도: } 2, \text{ 가속도: } 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \text{점 } P \text{ 의 시간 } t \text{ 에서의 속도를 } v, \text{ 가속도를 } a \text{ 라 하}$$

$$\text{면 } v = f'(t) = 3 - 2\cos 2t, \quad a = f''(t) = 4\sin 2t \text{ 이므}$$

$$\text{로 } t = \frac{\pi}{6} \text{ 에서의 점 } P \text{ 의 속도와 가속도는}$$

$$v = 3 - 2\cos \frac{\pi}{3} = 2, \quad a = 4\sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$55) \text{ 속도: } 2, \text{ 가속도: } -\frac{\pi^2}{4}$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2 + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}t, \quad f''(t) = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin \frac{\pi}{2}t$$

$$\text{따라서 } t = 1 \text{ 에서 점 } P \text{ 의 속도는 } f'(1) = 2$$

$$\text{가속도는 } f''(1) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{4}$$

$$56) \text{ 속도: } \frac{3}{2}, \text{ 가속도: } 0$$

$$\Rightarrow \text{시간 } t \text{ 에서 점 } P \text{ 의 속도를 } v(t),$$

$$\text{가속도를 } a(t) \text{ 라고 하면}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 1 + \frac{2t}{t^2 + 4}$$

$$a(t) = \frac{d}{dt}v(t)$$

$$= \frac{2(t^2 + 4) - (2t) \times (2t)}{(t^2 + 4)^2} = -\frac{2(t^2 - 4)}{(t^2 + 4)^2}$$

따라서 점  $P$  의  $t = 2$  에서의 속도와 가속도는

$$v(2) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad a(2) = 0$$

$$57) 2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \text{시간 } t \text{ 에서 점 } P \text{ 의 속도는 } (2t, 2) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } t = 2 \text{ 일 때, 점 } P \text{ 의 속도는 } (4, 2) \text{ 이고,}$$

$$\text{속력은 } \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ 이다.}$$

$$58) \frac{2}{e^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -2t + 2, \quad \frac{dy}{dt} = -2e^{-2t} \text{ 이므로,}$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 4t^2 - 8t + 4, \quad \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 4e^{-4t} \text{ 에서}$$

$$v(t) = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = 2\sqrt{(t-1)^2 + e^{-4t}}.$$

따라서  $t = 1$  일 때의 속력은

$$v(1) = 2\sqrt{(1-1)^2 + e^{-4}} = 2\sqrt{\frac{1}{e^4}} = \frac{2}{e^2}$$

$$59) 13$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 12t^2, \quad \frac{dy}{dt} = 5 \text{ 이므로 } t = 1 \text{ 일 때, 점 } P \text{ 의 속력}$$

은  $\sqrt{144t^4+25}$  에  $t=1$ 을 대입하여 구한다.  
 $\therefore \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13$ 이다.

60)  $\sqrt{10}$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2 - (-1)t^{-2} = 2 + \frac{1}{t^2}, \frac{dy}{dt} = 1 - 2t^{-2} = 1 - \frac{2}{t^2}$$

따라서 속력은

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(2 + \frac{1}{t^2}\right)^2 + \left(1 - \frac{2}{t^2}\right)^2} \\ &= \sqrt{4 + 2 \times 2 \times \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^4} + 1 - 2 \times 1 \times \frac{2}{t^2} + \frac{4}{t^4}} \\ &= \sqrt{5 + \frac{5}{t^4}} \end{aligned}$$

따라서 구하는 시각  $t=1$ 에서 점  $P$ 의 속력은

$$\sqrt{5 + \frac{5}{1}} = \sqrt{10} \text{이다.}$$

61)  $\frac{\sqrt{5}}{4}$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}, \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t} \text{이므로}$$

$$\text{속도 } v \text{는 } v = \left( \frac{1}{2\sqrt{t}}, \frac{2}{t} \right)$$

즉 시각  $t=4$ 에서의 속도는  $\left( \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right)$ 이고,

따라서 시각  $t=4$ 에서의 속력  $|v|$ 는

$$|v| = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

62)  $\sqrt{2}e^\pi$

$$\Rightarrow \vec{v} = \left( \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (e^t(-\sin t + \cos t), e^t(\sin t + \cos t))$$

$$\begin{aligned} \therefore |\vec{v}| &= \sqrt{e^{2t}(-\sin t + \cos t)^2 + e^{2t}(\sin t + \cos t)^2} \\ &= \sqrt{e^{2t}(2\sin^2 t + 2\cos^2 t)} = \sqrt{2}e^t \\ \therefore t = \pi \text{일 때 속력은 } \sqrt{2}e^\pi \end{aligned}$$

63) 속력: 2

$\Rightarrow$  점  $(10, \pi)$ 를 지날 때는  $t=\pi$ 일 때 이므로  
 $t=\pi$ 일 때 속도를 구하면  $(5\sin\pi, 1-\cos\pi)$   
 $= (0, 2)$ 이므로 속력은 2이다.

64) 속도:  $(3, 8)$ , 가속도:  $(0, 8)$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3, \frac{dy}{dt} = 2t^2 \text{이므로 점 } P \text{의 시각 } t \text{에서의 속도는 } (3, 2t^2)$$

따라서  $t=2$ 에서의 점  $P$ 의 속도는  $(3, 8)$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \frac{d^2y}{dt^2} = 4t \text{이므로 점 } P \text{의 시각 } t \text{에서의 가속도는 } (0, 4t)$$

따라서  $t=2$ 에서의 점  $P$ 의 가속도는  $(0, 8)$

65) 속도:  $\left( \frac{1}{2}, 1 \right)$ , 가속도:  $\left( -\frac{1}{4}, -1 \right)$

$$\Rightarrow \left( \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = \left( \frac{1}{2\sqrt{t}}, \frac{1}{t} \right) \text{이므로}$$

$$t=1 \text{을 대입하면 속도: } \left( \frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$\left( \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = \left( -\frac{1}{4t\sqrt{t}}, -\frac{1}{t^2} \right) \text{이므로}$$

$$t=1 \text{을 대입하면 가속도: } \left( -\frac{1}{4}, -1 \right)$$

66) 속도:  $(2, e^2 - e^{-2})$ , 가속도:  $(0, e^2 + e^{-2})$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = e^t - e^{-t} \text{이므로 점 } P \text{의 시각 } t \text{에서의 속도는 } (2, e^t - e^{-t})$$

따라서  $t=2$ 에서의 점  $P$ 의 속도는  $(2, e^2 - e^{-2})$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \frac{d^2y}{dt^2} = e^t + e^{-t} \text{이므로 점 } P \text{의 시각 } t \text{에서의 가속도는 } (0, e^t + e^{-t})$$

따라서  $t=2$ 에서의 점  $P$ 의 가속도는  $(0, e^2 + e^{-2})$

67) 속도:  $(3, 1)$ , 가속도:  $(0, -2)$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 - 2\cos t, \frac{dy}{dt} = 1 + 2\sin t \text{이므로}$$

$$\text{속도는 } (1 - 2\cos t, 1 + 2\sin t)$$

따라서  $t=\pi$ 를 대입하면 속도는  $(3, 1)$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\sin t, \frac{d^2y}{dt^2} = 2\cos t \text{이므로}$$

$t=\pi$ 를 대입하면 가속도는  $(0, -2)$

68) 속도:  $(3, 0)$ , 가속도:  $(0, -1)$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2 + \sin t, \frac{dy}{dt} = \cos t \text{이며}$$

$$t = \frac{\pi}{2} \text{일 때, 속도는 } (3, 0)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \cos t, \frac{d^2y}{dt^2} = -\sin t \text{이므로 가속도는 } (0, -1)$$

69) 속도:  $\left( \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$ , 가속도:  $(3, 1)$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = e^t - 2e^{-2t}, \frac{dy}{dt} = e^t + 2e^{-2t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = e^t + 4e^{-2t}, \frac{d^2y}{dt^2} = e^t - 4e^{-2t}$$

점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 속도는  $(e^t - 2e^{-2t}, e^t + 2e^{-2t})$

$$t = \ln 2 \text{에서의 속도는 } \left( \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right) \text{이고,}$$

가속도는  $(e^t + 4e^{-2t}, e^t - 4e^{-2t})$ 이므로

$t = \ln 2$ 에서의 가속도는  $(3, 1)$ 이다.

70) 5

$$\Rightarrow \text{속도는 } (2t^2, t^3 - 6t), \text{가속도는 } (4t, 3t^2 - 6) \text{이므로}$$

$t=1$ 일 때 가속도는  $(4, -3)$ 이므로

가속도의 크기는  $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 이다.

71) 4

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -2\sin 2t, \frac{dy}{dt} = 2\cos 2t \text{ 이므로}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = (-2\cos 2t) \times 2 = -4\cos 2t$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 2 \times (-\sin 2t) \times 2 = -4\sin 2t$$

따라서  $\vec{a} = (-4\cos 2t, -4\sin 2t)$  이므로

$$|\vec{a}| = \sqrt{16\cos^2 2t + 16\sin^2 2t} = \sqrt{16 \times 1} = 4$$

72) 5

$\Rightarrow$  시각  $t$ 에서의 속도는  $(5\sin t, 5-5\cos t)$ 이고,  
 시각  $t$ 에서의 가속도는  $(5\cos t, 5\sin t)$ 이므로  
 $t = \pi$ 일 때 가속도가  $(-5, 0)$ 이므로 가속도의 크기는 5이다.

73) 8

$$\Rightarrow x = 2t^2 + \cos 2t, \quad y = 3 - \frac{1}{2}\sin 2t$$

 $t$ 초 후의 점  $P$ 의 속도를  $v$ 라고 하면

$$v = \left( \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (4t - 2\sin 2t, -\cos 2t)$$

 $t$ 초 후의 점  $P$ 의 가속도를  $a$ 라고 하면

$$a = \left( \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = (4 - 4\cos 2t, 2\sin 2t)$$

따라서  $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 점  $P$ 의 가속도의 크기는

$$\begin{aligned} \therefore |a| &= \sqrt{(4 - 4\cos \pi)^2 + (2\sin \pi)^2} \\ &= \sqrt{(4 + 4)^2} = 8 \end{aligned}$$

74)  $\frac{\sqrt{7}}{2}$ 75)  $2e^3$ 

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = e^t \cos t + e^t(-\sin t), \quad \frac{dy}{dt} = e^t \sin t + e^t \cos t \text{ 이고}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = e^t \cos t + e^t(-\sin t) + e^t(-\sin t) + e^t(-\cos t)$$

$$= -2\sin te^t$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = e^t \sin t + e^t \cos t + e^t \cos t + e^t(-\sin t) = 2\cos te^t$$

$$\vec{v} = (-2\sin te^t, 2\cos te^t) \text{ 이므로 } |\vec{v}| = 2e^t$$

 $t = 3$ 을 대입하면  $2e^3$ 이다.76)  $2\pi$  $\Rightarrow$  점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 속도를  $v$ 라 하면

$$v = f'(t) = \frac{1}{3}\cos \frac{t}{3} + \frac{1}{6}$$

 $t = a$ 일 때, 점  $P$ 의 속력을 0이라 하면

$$\left| \frac{1}{3}\cos \frac{a}{3} + \frac{1}{6} \right| = 0, \quad \cos \frac{a}{3} = -\frac{1}{2}$$

이때  $a \geq 0$ 이므로

$$\frac{a}{3} = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{8}{3}\pi, \dots$$

따라서 점  $P$ 의 속력이 처음으로 0이 되는 시각은  $2\pi$ 이다.

77) 2

 $\Rightarrow$  주어진 식을  $t$ 에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dt} = -6t^2 - 6t + 36 = -6(t^2 + t - 6) = -6(t-2)(t+3)$$

따라서  $x > 0$ 에서  $\frac{dx}{dt} = 0$ 을 만족하는  $t$ 의 값은

$$t = 2.$$

78)  $\frac{\pi}{6}$  $\Rightarrow$  처음으로 방향을 바꾸는 시각은 처음으로 속도의 부호가 바뀌는 시각을 말한다.

$$v(t) = f'(t) = 3\cos t - 12\cos t \sin^2 t = 3\cos t(1 - 4\sin^2 t)$$

에 대해  $t = 0$ 에서 시작하므로

처음으로 바뀌는 시각은  $\sin t = \frac{1}{2}$  인  $t = \frac{\pi}{6}$  일 때  
 이다.

79)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{2}, \frac{dy}{dt} = 2t - \frac{1}{t} \text{ 이므로 속력의 값은}$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = 2t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{2} \text{ 이며 } 2t = \frac{1}{t} \text{ 일}$$

때, 속력이 최소이다.

$$\therefore t = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

80) 1

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 8, \frac{dy}{dt} = 4t - 4 \text{ 이다.}$$

$P$ 의 속력은  $\sqrt{(4t-4)^2 + 8^2} = 8$ 이므로  
 이때  $t = 1$ 이다.

81) 4

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3\cos 3t, \frac{dy}{dt} = -3\sin 3t + 1 \text{ 이므로 속력은}$$

$$\sqrt{(3\cos 3t)^2 + (1 - 3\sin 3t)^2} = \sqrt{10 - 6\sin 3t} \text{ 이므로}$$

 $\sin 3t = -1$ 일 때 최댓값을 가지므로 4이다.82)  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ 

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = t + 1, \frac{dy}{dt} = 2t - 2 \text{ 이므로 속도 } v \text{는}$$

$$v = (t+1, 2t-2)$$

$$|v| = \sqrt{(t+1)^2 + (2t-2)^2} = \sqrt{5t^2 - 6t + 5}$$

$$= \sqrt{5\left(t - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{16}{5}}$$

따라서  $t = \frac{3}{5}$ 일 때 점  $P$ 의 속력은 최소이고,

$$\text{최솟값은 } \sqrt{\frac{16}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

83) (2, 0)

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = t - \frac{1}{t} \text{ 이므로 속도 } v \text{ 는}$$

$$v = \left( 2, t - \frac{1}{t} \right)$$

$$|v| = \sqrt{2^2 + \left(t - \frac{1}{t}\right)^2} = \sqrt{t^2 + 2 + \frac{1}{t^2}} \\ = \sqrt{\left(t + \frac{1}{t}\right)^2} = t + \frac{1}{t} \quad (\because t > 0)$$

$t > 0$ ,  $\frac{1}{t} > 0$  이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \times \frac{1}{t}} = 2$$

이때 등호는  $t = \frac{1}{t}$  일 때 성립하므로

$$t^2 = 1 \quad \therefore t = 1 \quad (\because t > 0)$$

따라서 점 P의 속력이 최소가 되는 순간의 속도는 시각  $t = 1$  일 때의 속도이므로  $v = (2, 0)$

84)  $\pi$ 

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \frac{dy}{dt} = \sin t \text{ 이므로 속도 } v \text{ 는}$$

$$v = (1 - \cos t, \sin t)$$

$$\text{속력 } |v| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t}$$

$$0 \leq t \leq 2\pi \text{ 에서 } -1 \leq \cos t \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$0 \leq 2 - 2\cos t \leq 4 \quad \therefore 0 \leq |v| \leq 2$$

이때 속력  $|v|$  가 최대가 되는 것은  $2 - 2\cos t = 4$ , 즉  $\cos t = -1$  일 때이다.

따라서 속력이 최대가 되는 시각은  $t = \pi$  이다.

85) 2

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = t - \frac{1}{t}, \frac{dy}{dt} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{속력은 } \sqrt{\left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 4} = t + \frac{1}{t} \text{ 이다.}$$

$$t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{1} = 2 \text{ 이므로 } t = 1 \text{ 일 때 최소이다.}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 1 + \frac{1}{t^2}, \frac{d^2y}{dt^2} = 0 \text{ 이므로 } t = 1 \text{ 일 때,}$$

P의 가속도의 크기는 2이다.

86) 3

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t), \frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t) \text{ 이므로}$$

$$\text{속력은 } \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{2}e^t \text{ 이므로 P의 속력}$$

이  $\sqrt{2}e^3$  일 때의 시각은  $\therefore 3$  이다.

87) 8

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t(\cos t - \sin t)$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t(\cos t + \sin t)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = e^{2t}\{(\cos t - \sin t)^2 + (\cos t + \sin t)^2\} \\ = e^{2t}(2\cos^2 t + 2\sin^2 t) = 2e^{2t} \text{ 이므로,}$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$$

따라서 속력의 크기가  $4\sqrt{2}$  인  $t$ 의 값을 구해보면  $\sqrt{2}e^t = 4\sqrt{2} \Rightarrow e^t = 4 \quad \therefore t = \ln 4$ .

한편,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = e^t(\cos t - \sin t) + e^t(-\sin t - \cos t) = -2e^t \sin t$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = e^t(\cos t + \sin t) + e^t(-\sin t + \cos t) = 2e^t \cos t$$

$$\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 = 4e^{2t}\sin^2 t + 4e^{2t}\cos^2 t = 4e^{2t}$$

$$\therefore \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = 2e^t$$

여기에  $t = \ln 4$ 를 대입하면  $2e^{\ln 4} = 8$ 이다.

88)  $\sqrt{2} - 1$ 

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 4\sqrt{2}, \frac{dy}{dt} = 2(t+1) - \frac{4}{t+1} \text{ 이므로 속력의 크}$$

$$\text{기는 } \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{4(t+1)^2 + \frac{16}{(t+1)^2} - 16 + 32}$$

$$\text{이며 정리하면 } 2(t+1) + \frac{4}{t+1} \geq 2\sqrt{2 \times 4} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{이며 } 2(t+1) = \frac{4}{t+1} \text{ 일 때, 최소가 되므로}$$

$$t = \sqrt{2} - 1 \text{ 이다.}$$

89)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 

$$\Rightarrow x = t + \sin t, y = 2\cos t \text{ 이므로}$$

$$\frac{dx}{dt} = 1 + \cos t, \frac{dy}{dt} = -2\sin t \text{ 이다.}$$

속력의 크기는

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{-3\cos^2 t + 2\cos t + 5} \text{ 이므로}$$

$$\text{최대는 } \cos t = \frac{1}{3} \text{ 일 때이다.}$$

따라서 가속도의 크기는

$$\sqrt{(-\sin t)^2 + (-2\cos t)^2} = \sqrt{\frac{8}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ 이다.}$$