2020년 용인고 수학2 기말고사

1. 함수 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 $\int_{1}^{2} f(x) dx - \int_{5}^{2} f(y) dy$ 의 값은?

① 101 ② 102 ③ 103 ④ 104

⑤ 105

4. 닫힌구간 [-1,1]에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + k$ 의 최솟값이 2일 때,

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12

(5) 13

2. 곡선 $y=x^2+2x$ 와 x축 및 두 직선 x=-1, x=1로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 삼차방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근만 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

3. 곡선 y = f(x) 위의 임의의 점 (x, f(x))에서의 접선의 기울기가 $3x^2-2x+1$ 이다. 이 곡선이 (-1,2)를 지날 때, f(2)의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

6. 두 함수 $f(x) = x^4 + 27x$, $g(x) = 2x^2 + 3x + a$ 가 닫힌구간 [-3,0]에서 부등식 f(x) > g(x)가 항상 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① -44 ② -43 ③ -42 ④ -41 ⑤ -40

7. 지면으로부터 높이가 25m인 지점에서 지면과 수직으로 던져 올린 공의 t초 후의 높이 h(t)m는 $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$ 인 관계가 성립한다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

_____ 〈보기〉 ___

- ㄱ. 던져 올린 공의 가속도는 일정하다.
- ${ t L}$. 공이 지면에 떨어지는 순간의 속도는 -30m/s이다.
- ㄷ. 공의 최고높이에 도달하는 데 걸리는 시간은 2초이다.

- ③ ᄀ, ∟

- ④ ∟, ⊏
- ⑤ ᄀ, ㄴ, ㄸ

- $oldsymbol{8}$. 직선도로를 달리는 자동차가 브레이크를 밟은 후 t초 동안 움직인 거리를 xm라 하면 $x=40t-at^2$ 이라 한다. 브레이크를 밟은 후 정지할 때까지 달린 거리가 100m일 때 양수 a의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

- **9.** 모든 실수 x에 대하여 함수 f(x)가 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = \frac{1}{4}x^4 + x^3 + 2x^2$ 을 만족시킬 때, f(x)의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5


10. 이차함수 f(x)가 f(0) = 0이고 다음 조건을 만족시킬 때, f(2)의

(7)
$$\int_0^1 |f(x)| dx = -\int_0^1 f(x) dx = 3$$

(L)
$$\int_{1}^{3} |f(x)| dx = \int_{1}^{3} f(x) dx$$

- ⑤ 72

11. 그림과 같이 곡선 $y=x^2-6x+k$ 와 x축 및 y축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A,B라 하자. A:B=1:2일 때, 상수 k의 값은? (단, 0 < k < 9)



- ① 2
- (2) 4
- 3 6
- (4) 8
- (5) 10

- 12. 직선 철로 위를 달리는 어떤 열차가 A역을 출발하여 6km를 달리는 동안은 시각 t분에서의 속도가 $\frac{1}{3}t(km/\min)$ 이었고 그 이후로는 속도가 일정하였다고 한다. 4억을 출발한 후 30분 동안 이 열차가 달린 거리는?

- ① 30 ② 36 ③ 48 ④ 50 ⑤ 54

13. 임의의 두 실수 x,y에 대하여 다항함수 f(x)가 f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy 를 만족한다. 함수 <math>G(x)가 $G(x) = \int (x-2)f'(x)dx$ 이고 함수 G(x)의 극값이 존재하지 않을 때, f(10)의 값은?

① 30


2 40

3 50

4 60

⑤ 70

14. 그림과 같이 한 변의 길이가 18인 정삼각형 모양의 종이의 세 꼭짓점에서 합동인 사각형을 잘라내어 뚜껑이 없는 삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 삼각기둥 부피의 최댓값은?



① 108

② 114

③ 128

3 4 138

⑤ 144

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 f(x)에 대하여 함수 g(x)를 $g(x) = \int_0^x f(t)dt + f(x)$ 라 할 때, 함수 g(x)는 x = 0에서 극댓값 0을 갖고, 모든 실수 x에 대하여 g'(-x) = -g'(x)이다. $f(2) \times g(2)$ 의 값은?

① 28

② 29

3 30

④ 31

⑤ 32

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 f(x)가 다음 조건을 모두 만족시킨다. 함수 f(x)의 극댓값을 M, 극솟값을 m이라 할 때, M-m의 값은?

(가) 함수 f(x)는 $x = \alpha$ 에서 극대이고 x = -2에서 극소이다.

(나) 방정식 f(x) = f(0)의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

① 32

② 34


③ 36

④ 38

⑤ 40

17. 함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x + 10$ 의 극댓값이 a이고 극솟값이 b일 때, ab의 값을 구하시오.

18. 삼차함수 f(x)의 도함수 y=f'(x)의 그래프는 그림과 같다. 함수 f(x)의 극댓값이 6이고 f(1)=4일 때, f(x)의 극솟값을 구하시오. (단, f'(0)=f'(2)=0)



- **19.** 지면으로부터 10m의 높이에서 19.6m/s의 속도로 지면과 수직으로 던진 물체의 t초 후의 속도가 $v(t)=19.6-9.8t\,(m/s)$ 이다. 다음 물음에 답하시오.
 - (1) 물체가 최고 높이에 도달하였을 때, 지면으로부터의 높이를 구하시오.
 - (2) 물체를 던진 후 지면에 떨어질 때까지 이 물체가 움직인 거리를 구하시오.

- 1) ④
- 2) ②
- 3) ②
- 4) ⑤
- 5) ③
- 6) ④
- 7) ⑤
- 8) ③
- 9) ①
- 10) ②
- 11) ③
- 12) ⑤
- 13) ④
- 14) ①
- 15) ⑤
- 16) ①
- 17) 130
- 18) 2
- 19) (1) 29.6 (m) (2) 49.2 (m)