2021년 고림고 수학2 기말고사

- **1.** 등식 $\int f(x)dx = 4x^5 5x^2 + C$ (C는 적분상수)를 만족하는 함수 f(x)는? [4.1점]
- (1) $5x^4 2x$
- ② $5x^4 10x$
- (3) $20x^4 2x$
- $\bigcirc 4$ $20x^4 10x$
- (5) $20x^4 10x + 5$

2. $\int_{1}^{3} (2x^3 + 3x^2 - 2x) dx$ 의 값은? [4.1점] ① 34 ② 42 ③ 48 ④ 50 ⑤ 58

- **3.** 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 3x 5$ 의 극댓값은? [4.3점]

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

- **4.** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \ge 0)$ 에서의 위치 x가 $x = -t^3 + 2t^2 + 4t + k (k$ 는 상수)이다. 점 P가 출발한 후 운동방향을 바꿀 때 점 *P*의 위치는 20이다. k의 값은? [4.3점]
- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 25

- **5.** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \ge 0)$ 에서의 속도 v(t)가 $v(t)=2t-t^2$ 일 대, 시각 t=0에서 t=3까지 점 P가 움직인 거리는? [4.5점]
- ① $\frac{4}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

- **6.** 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 2ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a의 개수는? [4.5점]
- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

- **7.** 연속함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 f(-x) = f(x)이고, $\int_{-2}^{2} f(x)dx = 6$, $\int_{0}^{-3} f(x)dx = -4$ 일 때, $\int_{-3}^{2} f(x)dx$ 의 값은?
- ① -1 ② 2 ③ 5 ④ 7 ⑤ 10

- **8.** 연속함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = 6x^2 \int_{-1}^1 f(t)dt$ 를 만족시킬 때, f(1)의 값은? [4.6점]


- ① -3 ② $-\frac{5}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

- **9.** 함수 $f(x)=2x^2-3$ 에 대하여 $\lim_{x\to 3} \frac{\displaystyle\int_3^x f(t)dt}{x^2-9}$ 의 값은? [4.7점]
- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

- $\mathbf{10}$. 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 x^3 + 4x 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.7점]
- ① 구간 (-∞,-1]에서 감소한다.
- ② f(x)가 극값을 갖는 x의 값은 1개다.
- ③ 방정식 f(x) = 0은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- ④ 닫힌구간 [-1,2]에서 함수 f(x)의 최댓값은 2이다.
- ⑤ 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \le k$ 를 만족하는 실수 k가 존재한다.

- **11.** 함수 $f(x) = x^2 (x \ge 0)$ 의 역함수를 g(x)라고 할 때, 두 곡선 y = f(x), y = g(x)로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.8점]
- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

12. 두 점 A(-3,0), B(3,0)에서 x축과 만나는 곡선 $y=9-x^2$ 이 있다. 그림과 같이 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 *ABCD*의 넓이의 최댓값은? [4.8점]



- ① 24
- ② 25
- 3 28
- ④ 30

⑤ 32

- **13.** 모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4 6x^2 8x a^2 + 10a + 8 \ge 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, M-m의 값은? [4.9점]
- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14. 실수 전체에서 연속인 함수 f'(x)가

$$\begin{split} f'(x) = & \begin{cases} 3x^2 + a & (x \leq 0) \\ 2x - 3 & (x > 0) \end{cases} \text{이고, } f(x) 의 국댓값이 5이다. & f(x) 의 국솟값을 <math>m$$
이라 할 때, 40m의 값은? (단, a는 상수) [4.9점]

- **15.** 닫힌구간 [-1,2]에서 함수 $f(x) = \int_{x-1}^{x+1} (t-1)^2 dt$ 의 최솟값은? [5.1점]
- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

- **16.** 함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 f(x+4)=f(x)를 만족시키고 $f(x)=-x^2+4\left(-2\leq x\leq 2\right)$ 이다. $3\int_{-a}^a f(x)dx=86$ 일 때, 상수 a의 값은? [5.1점]
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

- **17.** 원점에서 곡선 $y=x^3-3x^2+2x+k$ 에 서로 다른 2개의 접선을 그을 수 있을 때, 0이 아닌 실수 k의 값은? [5.1점]
- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

18.	함수 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+a$ 에 대하여 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 가
	극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 정수 a의 최솟값은? [5.2점]

19. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x + 4$ 와 실수 k에 대하여 $x \le k$ 에서 f(x)의 최솟값을 m(k)라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

----- 〈보기〉 ----

- $\neg m'(-1) = 00|\Box$
- $L_{.} | m(k) f(k) |$ 의 최댓값은 4이다.
- \Box . 함수 m(k)가 k=a에서만 미분가능하지 않을 때,

 $\int_{0}^{a} m(k) dk = 40 | \Box |.$

- ③ ¬, ⊏

- (1) L (2) ¬, L (4) L, C (5) ¬, L, C

- $\mathbf{20}$. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 f(x)가 다음 조건을 만족시킬 때, f(0)의 값은? [5.2점]
 - $f'(-1) \times f'(1) < 00$ \exists , f'(0) = -40 \exists .
- \circ 함수 |f(x)|는 x=2에서 극댓값 3을 갖는다.
- \circ 함수 |f(x)|는 서로 다른 세 점에서 미분가능하지 않다.
- ① -1 ② 2 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

- **21.** 최고차항의 계수가 -1인 사차함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 f(1-x)=f(1+x)를 만족한다. 구간 [t-1,t]에서 f(x)의 최댓값을 g(t)라고 할 때, $4 \le t \le 5$ 에서 g(t)는 상수함수이다. 이때, $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_{3+h}^{3} g'(t) dt$ 의 값은? [5.3점]
- ① -40 ② -10 ③ 10 ④ 20 ⑤ 40

1) ④

2) ⑤

3) ④

4) ①

5) ③

6) ③

7) ④

8) ⑤

9) ①

10) ⑤

11) ②

12) ⑤

13) ②

14) ④

15) ①

16) ③

17) ③ 18) ②

19) ④

20) ③

21) ①