

Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, « *Calcul fiable et trigonométrie* ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer.

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ?

Indice 3

Étape.

Évalue d'abord ce qui est entre parenthèses ; ensuite seulement les puissances, puis les multiplications, et enfin les additions et soustractions.

Solution

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5.$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16.$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2 = (8 - 6)^2 = 2^2 = 4.$

Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses.

 Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆☆

- (a) Développer $(x + 5)^2$.
- (b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
- (c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser ?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

Indice 3

Étape.

En (a), pense à $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; en (b), à $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$; en (c), le plus grand facteur commun de $4y^2$ et $12y$ est $4y$: mets-le en évidence.

Solution

- (a) $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
- (b) $(3t - 4)(3t + 4) = 9t^2 - 16$.
- (c) $4y^2 + 12y = 4y(y + 3)$.

Piège

Écrire $(x + 5)^2 = x^2 + 25$ (oubli du **double produit** $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

 Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a) $\frac{45}{60}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions équivalentes et simplification, Addition et soustraction de fractions et Produit et quotient de fractions.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la première chose à faire : simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction ?

Indice 3

Étape.

- (a) simplifie par un facteur commun ; (b) prends 24 comme dénominateur commun ; (c) multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ; (d) multiplie par l'**inverse** de la seconde fraction.

Solution

- (a) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
(b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$.
(c) $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.
(d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$.

Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ($\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$).

Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Fractions, décimaux et pourcentages.

- (a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
(b) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, 0, 55, 65 %.
(c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
(d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*.

Indice 2

Question à te poser.

Sous quelle forme commune écrire les nombres de (b) pour pouvoir les comparer ?

En (c) et (d), augmenter ou diminuer d'un pourcentage : est-ce ajouter/retrancher, ou **multiplier** ?

Indice 3

Étape.

Pour (a) et (b), ramène chaque nombre à un décimal. En (c), multiplie 80 par 1,25 puis par 0,75. En (d), écris l'équation $0,80 \cdot x = 96$ et isole x .

Solution

- (a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.
(b) $\frac{3}{5} = 0,60$ et $65\% = 0,65$; d'où $0,55 < \frac{3}{5} < 65\%$.
(c) $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$: **non**.
(d) $0,80 \cdot x = 96$, d'où $x = 96 : 0,80 = 120$.

Piège

Comparer des écritures différentes sans les ramener à une forme commune ; composer des pourcentages par **addition** ($+25 - 25 = 0$) ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

- (a) $\frac{2^5}{2^3}$
- (b) $(3^2)^3$
- (c) 4^{-2}
- (d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la structure de l'expression : un quotient, un produit, une puissance de puissance ? À chaque structure correspond une règle : laquelle ?

Indice 3

Étape.

Applique $a^m : a^n = a^{m-n}$ en (a) ; $(a^m)^n = a^{mn}$ en (b) ; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ en (c) ; en (d), regroupe les exposants du haut et retranche celui du bas.

Solution

- (a) $2^{5-3} = 2^2 = 4$.
- (b) $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$.
- (c) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$.
- (d) $b^{7-3-2} = b^2$.

Piège

Confondre $a^m a^n$ (on **ajoute**) et $(a^m)^n$ (on **multiplie**).

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

Valeur absolue, notation scientifique et ordre de grandeur.

- (a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
- (b) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
- (c) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue, Notation scientifique et Ordres de grandeur et estimations*.

Indice 2

Question à te poser.

Quel est le signe d'une racine d'indice pair ?

Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier pour amener le facteur entre 1 et 10 ? Comment se combinent les puissances de 10 dans un produit ou un quotient ?

Indice 3

Étape.

En (a), $\sqrt{x^2} = |x|$. En (b), compte les déplacements de la virgule pour l'exposant de 10, et vérifie que le facteur est dans $[1, 10[$. En (c), arrondis chaque nombre à un chiffre, puis soustrais les exposants de 10.

Solution

(a) $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$; $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$.

(b) $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$; $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$.

(c) $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2} \approx \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^2} = 2 \times 10^3$.

Piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ (faux si $x < 0$) ; laisser 30×10^{-3} (le facteur doit être dans $[1, 10[$) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

Exercice S.7

Socle · O4 · ★☆☆

(a) Convertir en radians : 60° , 90° , 120° , 270° .

(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π .

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*.

Indice 2

Question à te poser.

À combien de radians correspond un angle plat de 180° ?

Indice 3

Étape.

180° correspond à π rad. Pose la proportion $\frac{\text{degrés}}{180^\circ} = \frac{\text{radians}}{\pi}$ et isole l'inconnue.

Solution

(a) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{2}$.

(b) 30° , 135° , 270° , 360° .

Piège

Multiplier par $\frac{180^\circ}{\pi}$ là où il faut $\frac{\pi}{180^\circ}$ (ou l'inverse).

 Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Cercle trigonométrique et valeurs remarquables.

- (a) Donner $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
- (b) Un point du cercle a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Quel angle $\theta \in [0, 2\pi[$?
- (c) Même question pour $(0, -1)$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables*.

Indice 2

Question à te poser.

Sur le cercle, laquelle des deux coordonnées est le cosinus, laquelle est le sinus ?

Indice 3

Étape.

Le point du cercle d'angle θ est $(\cos \theta, \sin \theta)$. Compare chaque couple donné à la table des valeurs remarquables, et repère le quadrant.

Solution

- (a) $\cos : \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$; $\sin : \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (b) $\theta = \frac{\pi}{3}$ ($\cos = \frac{1}{2}, \sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$).
- (c) $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

Piège

Confondre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ en intervertissant $\cos$ (abscisse) et $\sin$ (ordonnée).

 Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

Signes et symétries.

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos \theta$ et de $\sin \theta$.
- (b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner $\cos$ et $\sin$ de 135° et de $-\frac{\pi}{6}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Signes et Symétries*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel quadrant $\cos$ (resp. $\sin$) est-il positif ? De quel angle remarquable 135° est-il le supplémentaire ? Et $-\frac{\pi}{6}$, de quel angle est-il l'opposé ?

Indice 3

Étape.

Pour $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$, applique $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$. Pour $-\frac{\pi}{6}$, applique $\cos(-\theta) = \cos \theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin \theta$.

Solution

- (a) I : $(\cos > 0, \sin > 0)$; II : $(\cos < 0, \sin > 0)$; III : $(\cos < 0, \sin < 0)$; IV : $(\cos > 0, \sin < 0)$.
(b) $\cos(135^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(135^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.

Piège

Se tromper de signe selon le quadrant ; confondre la symétrie des angles **opposés** et celle des **supplémentaires**.

Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\hat{A})$, $\cos(\hat{A})$ et $\tan(\hat{A})$.
(b) Rappeler $\tan \theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos \theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin \theta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle), Tangente et Identité fondamentale*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans un triangle rectangle, quel rapport de côtés donne le sinus ? le cosinus ? Comment obtient-on la tangente à partir des deux ? Quelle relation lie $\sin^2 \theta$ et $\cos^2 \theta$?

Indice 3

Étape.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$. En (c), tire $\sin \theta$ de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ et fixe son signe par le quadrant.

Solution

- (a) $\sin(\hat{A}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$; $\cos(\hat{A}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$; $\tan(\hat{A}) = \frac{12}{5}$.
(b) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$; non définie pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(c) $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$ (positif dans le quadrant I).

Piège

Inverser opposé et adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
- (b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution, Unités et dimensions et Ordres de grandeur.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle grandeur se conserve entre la solution mère et la solution fille ? La solution fille étant **moins** concentrée, le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

Indice 3

Étape.

Écris la conservation de la quantité de soluté, $C_1 V_1 = C_2 V_2$, puis isole V_1 .

Solution

(a) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{4 \cdot 200}{25} = \frac{800}{25} = 32 \text{ mL}.$

- (b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages (pourcentages successifs).*

Indice 2

Question à te poser.

Deux variations successives en pourcentage, est-ce que ça s'**ajoute** ou est-ce que ça se **multiplie** ?

Indice 3

Étape.

Traduis chaque variation en un facteur : $+10\% \rightarrow \times 1,1$ et $-10\% \rightarrow \times 0,9$, puis multiplie-les.

Solution

- (a) $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95$ €/L : **non**, on ne revient pas à 5 €/L.
(b) $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$: le prix a **baissé de 1 %** au total.

Piège

Croire que $+10\%$ puis -10% s'annulent ($+10 - 10 = 0$).

Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆☆

Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?
(b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur* ?

Indice 2

Question à te poser.

Quelles unités faut-il combiner pour obtenir une masse par jour ? Que reste-t-il à faire pour passer à une masse par **prise** ?

Indice 3

Étape.

Multiplie la posologie (mg / kg / jour) par la masse (kg) pour obtenir des mg par jour, puis divise par le nombre de prises.

Solution

- (a) $5 \cdot 70 = 350$ mg par jour, soit $350 : 2 = 175$ mg par prise.
(b) $17,5$ g = 17 500 mg : c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?
- (b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans le triangle rectangle formé, la rampe est-elle l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé ? La hauteur correspond-elle au côté opposé ou adjacent à l'angle de 30° ?

Indice 3

Étape.

La rampe est l'**hypoténuse** : hauteur = $8 \sin(30^\circ)$ (côté opposé), emprise = $8 \cos(30^\circ)$ (côté adjacent).

Solution

- (a) Hauteur = $8 \sin(30^\circ) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ m.
- (b) Emprise = $8 \cos(30^\circ) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9$ m.

Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; prendre la hauteur plus grande que la rampe.

Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un bras articulé fait un angle **aigu** θ avec l'horizontale. Un capteur donne $\cos \theta = \frac{3}{5}$ (l'angle lui-même n'est pas mesuré).

- (a) Donner $\sin \theta$ sans déterminer θ .
- (b) Le bras mesure 50 cm : quelle **hauteur** son extrémité atteint-elle au-dessus de l'articulation ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Périodicité et identité fondamentale* et *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

Indice 2

Question à te poser.

Connais-tu une relation qui lie $\sin \theta$ et $\cos \theta$ sans passer par l'angle ? L'angle étant **aigu**, quel est le signe de $\sin \theta$?

Indice 3

Étape.

Tire $\sin \theta$ de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ (positif car θ est aigu), puis multiplie la longueur du bras par $\sin \theta$ pour obtenir la hauteur.

Solution

(a) $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ (positif car θ aigu).

(b) Hauteur $= 50 \cdot \sin \theta = 50 \cdot \frac{4}{5} = 40$ cm.

Piège

Prendre $\sin \theta$ négatif alors que θ est aigu ; confondre la hauteur (sin) et la portée horizontale (cos).