


Institut Technique des Ursulines — Mons

6^e année • Mathématiques 4 périodes



Probabilités

6UAA1

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans cette UAA

	Je suis capable de ...	Exercices	Mon niveau de maîtrise	
			en classe	avant le test
Connaître	C1 Reconnaître en contexte, un groupement d'objets (arrangement, combinaison). C2 Associer une probabilité au calcul de fréquences à partir d'un exemple d'expérience aléatoire. C3 Citer, pour une expérience aléatoire donnée, la catégorie d'épreuve, deux événements disjoints, un événement et son contraire, un événement certain et un événement impossible. C4 Représenter l'union, l'intersection, la différence de deux événements à l'aide des diagrammes de Venn et les exprimer en langage courant. C5 Citer les propriétés des probabilités. C6 Citer la règle de calcul d'une probabilité d'un événement dans le cas d'événements équiprobables.			
Appliquer	A1 Identifier l'événement associé à une probabilité donnée à partir d'un arbre, d'un tableau ou de diagrammes de Venn. A2 Extraire d'un arbre, d'un tableau ou de diagrammes de Venn la probabilité d'un événement. A3 Calculer une probabilité (y compris une probabilité conditionnelle) en utilisant : des tableaux / des diagrammes de Venn / des arbres / des formules d'analyse combinatoire. A4 Vérifier si 2 événements sont dépendants ou indépendants. A5 Dénombrer les résultats d'une situation à l'aide d'une liste organisée, d'un arbre, d'un diagramme ou des formules d'analyse combinatoire, en justifiant le choix de la formule. [†] A6 Calculer une probabilité <i>a posteriori</i> à partir de données statistiques ou de simulations. [†]			
Transférer	T1 Résoudre un problème d'analyse combinatoire / de probabilité. T2 Utiliser le calcul des probabilités pour analyser et critiquer des informations chiffrées (santé, presse, jeux de hasard). [†]			

[†] Objectif ajouté à la grille du SEGEC, repris du programme (UAA « Probabilité »).

Comment lire ces notes

Ces notes alternent des **activités de découverte**, où tu construis toi-même la matière en complétant listes, tableaux et arbres, et des encadrés de **théorie**, qui fixent ce qu'il faut retenir. Garde de quoi écrire à portée de main : les activités sont faites pour être remplies, et chaque blanc se complète à partir de ce qui précède dans le texte.

Tu croiseras régulièrement les encadrés suivants :

- Activité** une situation à explorer, avec des blancs à compléter ;
- Définition** le sens précis d'un mot nouveau ;
- Propriété** un résultat important, souvent accompagné de sa justification ;
- Exemple** un calcul entièrement résolu, à imiter ;
- Remarque** un point d'attention ou une précision.

Chaque exercice porte un bandeau indiquant le **processus mathématique** qu'il mobilise, sa **difficulté** — de ☆☆☆ (application directe) à ★★ (situation nouvelle à transférer) — et la **compétence** qu'il entraîne (par exemple **A5**), renvoyant à la grille des pages précédentes. Les exercices marqués **← ⚠ à faire à la maison** se font à domicile ; le site du cours donne pour chacun trois coups de pouce, puis la solution.

Les données utilisées dans les exemples sont réelles ; leur source est indiquée à chaque fois et rappelée à la fin des notes.

Enfin, deux versions de ces notes existent : la **version élève**, avec ses blancs à compléter, et la **version corrigée**, où les réponses apparaissent **en bleu**. Les deux sont produites à partir du même fichier source.

Table des matières

1. Compter sur de petits ensembles	2
1.1. Lister avant de compter	2
1.2. Additionner, multiplier	4
1.3. Arrangements et permutations	7
1.4. Combinaisons	9
1.5. Objets identiques : les anagrammes	11
1.6. Choisir une méthode	13
2. Modéliser le hasard	15
2.1. Fréquences et probabilité	15
2.2. Univers et événements	17
2.3. Le modèle d'équiprobabilité	19
2.4. Propriétés des probabilités	21
2.5. Dénombrer pour calculer	23
3. Probabilité conditionnelle et indépendance	25
3.1. Probabilité conditionnelle	25
3.2. Arbres de probabilités	27
3.3. Lire un test de dépistage	28
3.4. Indépendance	30
3.5. Pour aller plus loin	31
3.6. Sources des données	33

1

Compter sur de petits ensembles

Avant de calculer des probabilités, il faut savoir compter les résultats possibles d'une situation. Sur un petit ensemble, on peut les écrire tous. Les formules de ce chapitre ne sont que des raccourcis de ces listes : chacune se lit sur une liste organisée, un arbre ou un diagramme.

1.1. Lister avant de compter

Activité 1.1 – quatre questions, un seul groupe

Un groupe de quatre élèves : Alice, Bilal, Chloé et Dries, notés A, B, C, D. Pour chaque question, écris d'abord deux résultats possibles, puis la liste complète des résultats, organisée de façon à être sûr de n'en oublier aucun.

a) Élire un délégué et un suppléant.

AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC : 12 résultats (AB : Alice déléguée, Bilal suppléant).

b) Former un binôme.

{A, B}, {A, C}, {A, D}, {B, C}, {B, D}, {C, D} : 6 résultats.

c) Tirer au sort, lundi puis mardi, l'élève qui efface le tableau (le même élève peut être tiré deux fois).

AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD, DA, DB, DC, DD : 16 résultats.

d) Fixer l'ordre de passage des quatre élèves au tableau.

ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, puis 6 ordres commençant par B, 6 par C et 6 par D : 24 résultats.


e) Pourquoi la liste a) est-elle deux fois plus longue que la liste b) ? Complète le schéma : chaque case regroupe les résultats de a) qui donnent le même binôme.

les 12 résultats de a)

AB BA	AC CA	AD DA	BC CB	BD DB	CD DC
----------	----------	----------	----------	----------	----------

1. Compter sur de petits ensembles

Chaque binôme de b), par exemple $\{A, B\}$, donne deux résultats de a) : AB et BA. Dans a), l'ordre compte ; dans b), non. Les 12 résultats se regroupent en 6 paquets de 2 : $12 = 6 \cdot 2$.
f) Quels résultats de c) ne sont pas dans a) ? Complète le diagramme.



AA, BB, CC et DD : en c), un même élève peut revenir ; en a), non. La liste a) est contenue dans la liste c) : $16 = 12 + 4$.

Sur le site du cours : le « dénombreur » liste tous les cas (suites ou groupes, avec ou sans répétition) pour A, B, C, D, les compte et les regroupe en paquets.

Compter en quatre temps.

1. **Décrire.** Écrire deux ou trois résultats possibles. Un résultat est-il une *suite* (l'ordre compte : $AB \neq BA$) ou un *groupe* (l'ordre ne compte pas : $\{A, B\} = \{B, A\}$) ?
2. **Questionner.** Un élément peut-il revenir (répétition) ?
3. **Compter.** Liste organisée, arbre ou diagramme si l'ensemble est petit ; principe multiplicatif ou formule sinon.
4. **Contrôler.** Sur un cas plus petit, lister les résultats et vérifier que le calcul donne le même nombre.

Remarque 1.1

On note une suite entre parenthèses, (A, B) , ou simplement AB ; on note un groupe entre accolades, $\{A, B\}$. Le nombre d'éléments d'un ensemble E se note $\#E$.

Exercice 1.1

Calculer | ★★☆☆ | A5

Écris tous les codes formés d'une lettre parmi X, Y, Z suivie d'un chiffre parmi 1, 2. Combien y en a-t-il ?
 $X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2$: 6 codes.

Exercice 1.2 ← ⚠ à faire à la maison


Calculer | ★★☆☆ | A5

On lance une pièce trois fois de suite et on note la suite des faces obtenues (P pour pile, F pour face). Écris la liste organisée de tous les résultats. Combien de résultats contiennent exactement deux « pile » ?
 $PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF$: 8 résultats. Exactement deux « pile » : PPF, PFP, FPP , soit 3 résultats.

1.2. Additionner, multiplier

Activité 1.2 — un arbre pour compter

On reprend la question d) de l'activité 1.1 : l'ordre de passage des quatre élèves. Voici le début de l'arbre des ordres qui commencent par A.



a) Combien de branches partent de la racine ? de chaque nœud du deuxième niveau ? du troisième ?

4 branches, puis 3 depuis chaque nœud du deuxième niveau, puis 2, puis 1.

b) Pourquoi le nombre d'ordres est-il un produit ?

À chaque étape, le nombre de choix est le même pour toutes les branches : 4, puis 3, puis 2, puis 1. L'arbre a donc $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ feuilles, et chaque feuille est un ordre différent.

Propriété 1.1 — principe multiplicatif

Si un résultat se construit en k étapes successives, avec

- n_1 choix possibles à la première étape,
- n_2 choix possibles à la deuxième étape, quel que soit le choix fait à la première,
- ..., n_k choix possibles à la k -ième étape, quels que soient les choix précédents,

et si deux suites de choix différentes donnent deux résultats différents, alors le nombre de résultats vaut

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k.$$

Exemple 1.1 — plaques belges

Les plaques d'immatriculation belges de la série 1 (mises en circulation à partir de 2010) ont le format 1-ABC-123 : trois lettres, puis un nombre de 001 à 999. La presse annonçait « plus de 17,5 millions de combinaisons possibles » (RTBF, 21/12/2020). Vérifions.

Une plaque est une suite de trois lettres (l'ordre compte, une lettre peut revenir) suivie d'un nombre de 001 à 999. Chaque étape offre toujours le même nombre de choix : 26, 26, 26,

1. Compter sur de petits ensembles

puis 999. Par le principe multiplicatif, il y a $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 999 = 17\,558\,424$ plaques : un peu plus de 17,5 millions.

Remarque 1.2

Les choix peuvent changer d'une branche à l'autre ; c'est leur *nombre* qui doit rester le même. Nombres de trois chiffres distincts : 9 choix pour les centaines (pas 0), puis 9 pour les dizaines (0 redevient possible, mais pas le chiffre des centaines), puis 8 pour les unités : $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$.

Quand les résultats se répartissent en plusieurs cas, on compte chaque cas, puis on rassemble. Un diagramme montre si les cas se recouvrent.


Activité 1.3 – compter une réunion

Parmi les nombres entiers de 1 à 100, on note A l'ensemble des multiples de 2 et B l'ensemble des multiples de 3.

a) Calcule $\#A$, $\#B$ et le nombre de multiples de 6. Que représentent ces derniers dans le diagramme ?

$\#A = 50$; $\#B = 33$ ($3 \cdot 33 = 99$) ; multiples de 6 : 16 ($6 \cdot 16 = 96$). Ce sont les nombres qui sont à la fois dans A et dans B : l'intersection $A \cap B$.

b) Complète le diagramme avec le nombre d'éléments de chaque zone.



c) Combien de nombres de 1 à 100 sont multiples de 2 ou de 3 ? Pourquoi $50 + 33$ est-il faux ?

$34 + 16 + 17 = 67$. Dans $50 + 33 = 83$, les 16 multiples de 6 sont comptés deux fois : une fois dans A , une fois dans B . Donc $\#(A \cup B) = 50 + 33 - 16 = 67$.

Propriété 1.2 – principe additif


Pour deux ensembles finis A et B :

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B).$$

Si A et B n'ont aucun élément commun ($A \cap B = \emptyset$), alors $\#(A \cup B) = \#A + \#B$: on additionne les cas.

Propriété 1.3 – compter par le complémentaire

Si A est une partie d'un ensemble fini E , le nombre d'éléments de E qui ne sont pas dans A vaut $\#E - \#A$.



C'est utile pour compter les résultats qui contiennent « au moins un » élément d'un certain type : on compte tout, puis on retire ceux qui n'en contiennent « aucun ».

Exemple 1.2 – au moins un zéro

Combien de codes PIN à 4 chiffres (de 0000 à 9999) contiennent au moins un 0 ?

Un code est une suite de 4 chiffres, avec répétition : il y en a $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$. Les codes sans aucun 0 ont 9 choix à chaque position : $9^4 = 6561$. Il y a donc $10\,000 - 6561 = 3439$ codes contenant au moins un 0.

Exercice 1.3

Calculer | ★★☆☆ | A5


Pour s'habiller, Mehdi choisit un pull parmi 3 et un pantalon parmi 2. Construis l'arbre des tenues possibles et donne leur nombre.

L'arbre a 3 branches (les pulls), puis 2 branches depuis chaque pull (les pantalons) : $3 \cdot 2 = 6$ tenues.

Exercice 1.4

Représenter | ★★☆☆ | A5

Parmi les nombres entiers de 1 à 60, combien sont multiples de 4 ou de 6 ? Représente la situation par un diagramme de Venn complété.



Multiples de 4 : $\#Q = 15$. Multiples de 6 : $\#S = 10$. Multiples des deux, c'est-à-dire de 12 : 5. Donc $\#(Q \cup S) = 15 + 10 - 5 = 20$.

Exercice 1.5 ← ⚠ à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | A5

1. Compter sur de petits ensembles


Un cadenas a trois roues portant chacune les chiffres de 0 à 9. Combien de codes possèdent au moins un 7 ?

Codes : $10^3 = 1000$. Codes sans 7 : $9^3 = 729$. Codes avec au moins un 7 : $1000 - 729 = 271$.

Exercice 1.6

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. Combien existe-t-il de nombres pairs de trois chiffres distincts ? Indication : distingue deux cas selon le chiffre des unités et représente-les dans un diagramme.



(Z : chiffre des unités 0 ; Q : chiffre des unités 2, 4, 6 ou 8.)

On commence par les unités, qui imposent la parité. Unités 0 : 9 choix pour les centaines, 8 pour les dizaines : $9 \cdot 8 = 72$. Unités 2, 4, 6 ou 8 (4 choix) : 8 choix pour les centaines (ni 0, ni le chiffre des unités), puis 8 pour les dizaines : $4 \cdot 8 \cdot 8 = 256$. Les deux cas n'ont aucun nombre commun : $72 + 256 = 328$.

1.3. Arrangements et permutations

Activité 1.4 – élire un bureau

Le conseil des élèves élit un président, un vice-président et un secrétaire parmi 18 candidats.

a) Décris un résultat. L'ordre compte-t-il ? Un élève peut-il revenir ?

Un bureau est une suite de 3 élèves : (président, vice-président, secrétaire). L'ordre compte, car les fonctions sont différentes. Un élève ne peut pas cumuler deux fonctions.

b) Combien de bureaux différents sont possibles ?

$18 \cdot 17 \cdot 16 = 4896$ bureaux.

c) Et si un même élève pouvait cumuler les fonctions ?

$18 \cdot 18 \cdot 18 = 18^3 = 5832$ bureaux.

Définition 1.1 – arrangements

Un *arrangement* de p éléments pris parmi n est une suite de p éléments choisis parmi n éléments donnés (l'ordre compte).

- **Avec répétition** (un élément peut revenir) : il y en a n^p .
- **Sans répétition** (éléments distincts, $p \leq n$) : il y en a

$$A_n^p = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

Définition 1.2 – factorielle

Pour tout naturel $n \geq 1$, $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$ (lire « factorielle n »). On pose $0! = 1$.

Propriété 1.4

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Démonstration. $\frac{n!}{(n-p)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)\cdot(n-p)\cdots 2\cdot 1}{(n-p)\cdots 2\cdot 1}$: les facteurs de $n-p$ à 1 se simplifient ; il reste les p premiers facteurs, c'est-à-dire A_n^p . ■

Définition 1.3 – permutations

Une *permutation* de n éléments est une façon de les ranger tous dans un ordre : c'est un arrangement sans répétition de n éléments pris parmi n . Il y en a $A_n^n = n!$.


Remarque 1.3

Avec $p = n$, la formule donne $A_n^n = \frac{n!}{0!}$. Pour retrouver $n!$, il faut $0! = 1$: c'est ce qui justifie cette convention. À la calculatrice : touches $x!$ et nPr ; on écrit toujours la formule avant le résultat.

Exercice 1.7

Calculer | ★★☆☆ | A5

Combien de codes PIN à 4 chiffres existe-t-il ? Combien ont leurs quatre chiffres différents ? Représente les deux ensembles de codes par un diagramme.



(T : tous les codes ; D : les codes à quatre chiffres différents.)

Codes : suites de 4 chiffres avec répétition, $10^4 = 10\,000$. Chiffres différents : sans répétition, $A_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Les codes à chiffres différents font partie de tous les codes ; les autres sont $10\,000 - 5040 = 4960$.

1. Compter sur de petits ensembles

Exercice 1.8 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | A5

Douze coureurs prennent le départ d'une course. Combien de podiums (premier, deuxième, troisième) sont possibles ? De combien de façons les douze coureurs peuvent-ils franchir la ligne d'arrivée (sans ex æquo) ?

Un podium est une suite de 3 coureurs distincts : $A_{12}^3 = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$. Un classement complet est une permutation des 12 coureurs : $12! = 479\,001\,600$.

Exercice 1.9

Calculer | ★★☆☆ | A5

Calcule sans calculatrice : $\frac{10!}{8!}$; $\frac{7!}{5! \cdot 2!}$; $\frac{(n+1)!}{n!}$.
 $\frac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$; $\frac{7!}{5! \cdot 2!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$; $\frac{(n+1)!}{n!} = n + 1$.

1.4. Combinaisons

Activité 1.5 – regrouper puis diviser

On choisit une délégation de 3 élèves parmi A, B, C, D, E.

a) Combien de suites de 3 élèves distincts peut-on former ?

$A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

b) Le schéma range ces 60 suites en paquets : chaque paquet contient les suites formées des mêmes trois élèves. Complète-le.

les 60 suites

ABC ACB BAC BCA CAB CBA	ABD ADB BAD BDA DAB DBA	ABE AEB BAE BEA EAB EBA	ACD ADC CAD CDA DAC DCA	ACE AEC CAE CEA EAC ECA
ADE AED DAE DEA EAD EDA	BCD BDC CBD CDB DBC DCB	BCE BEC CBE CEB EBC ECB	BDE BED DBE DEB EBD EDB	CDE CED DCE DEC ECD EDC

Combien de suites contient chaque paquet ? Pourquoi ?

Chaque paquet contient $3! = 6$ suites : les 6 façons d'ordonner trois élèves donnés.

c) Déduis-en le nombre de délégations sans les lister.

Une délégation correspond à un paquet. Les 60 suites se regroupent par paquets de 6 : $\frac{60}{6} = 10$ délégations.

Sur le site du cours : le « dénombreur » liste tous les cas (suites ou groupes, avec ou sans répétition) pour A, B, C, D, E, les compte et les regroupe en paquets.

Définition 1.4 – combinaisons

Une *combinaison de p éléments pris parmi n* est un groupe (sans ordre) de p éléments distincts choisis parmi n . Il y en a

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Remarque 1.4


Les calculatrices (touche nCr) et beaucoup de manuels notent $\binom{n}{p}$ au lieu de C_n^p (attention : n en haut, p en bas).

Propriété 1.5 – symétrie

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$C_n^p = C_n^{n-p}.$$

Démonstration. Choisir le groupe G des p élèves qui partent revient à choisir le groupe des $n - p$ élèves qui restent : c'est la partie de l'ensemble E des n élèves hors de G .



Chaque groupe de p correspond à exactement un groupe de $n - p$, et inversement : il y a donc autant de groupes de p élèves que de groupes de $n - p$ élèves. ■

Exemple 1.3 – Lotto

Au Lotto belge, on coche 6 numéros parmi 45. Combien de grilles différentes ?

Une grille est un groupe de 6 numéros distincts : l'ordre dans lequel on les coche ne compte pas. Il y a $C_{45}^6 = \frac{45!}{6!39!} = 8\,145\,060$ grilles. On retrouve la « chance sur 8 145 060 » de gagner le gros lot citée par la presse (RTBF, 13/12/2024, analyse de F. Vrins, UCLouvain).

Exercice 1.10

Calculer | ★☆☆ | A5

Une classe de 22 élèves choisit 3 délégués. Combien de choix sont possibles si les trois délégués ont le même rôle ? si l'un est délégué, le deuxième suppléant et le troisième secrétaire ?

1. Compter sur de petits ensembles

Même rôle : un choix est un groupe de 3 élèves, $C_{22}^3 = 1540$. Rôles différents : un choix est une suite de 3 élèves distincts, $A_{22}^3 = 9240$.

Exercice 1.11 ← ⚠ à faire à la maison

Calculer | ★☆☆ | A5

Lors d'une réunion, 25 personnes se serrent toutes la main, une fois par paire. Combien de poignées de main sont échangées ?

Une poignée de main correspond à un groupe de 2 personnes (A serre la main de B = B serre la main de A) : $C_{25}^2 = \frac{25 \cdot 24}{2} = 300$.

Exercice 1.12

Calculer | ★☆☆ | A5

Un comité de 5 personnes est formé de 3 filles choisies parmi 8 et de 2 garçons choisis parmi 6. Combien de comités sont possibles ?

Choisir les filles : $C_8^3 = 56$ groupes. Choisir les garçons : $C_6^2 = 15$ groupes. Tout groupe de filles peut être associé à tout groupe de garçons : $56 \cdot 15 = 840$ comités.

Exercice 1.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. On répartit 6 élèves en deux équipes de 3. Combien de répartitions si les équipes s'appellent « rouge » et « bleue » ? si elles ne portent pas de nom ?

Avec noms : choisir l'équipe rouge suffit (la bleue est formée des autres), $C_6^3 = 20$. Sans nom : chaque répartition est comptée deux fois dans les 20 (rouge et bleue échangées) : $\frac{20}{2} = 10$.

1.5. Objets identiques : les anagrammes

Activité 1.6 — les anagrammes de ANNA

Un anagramme de ANNA est un mot de 4 lettres, avec ou sans sens, formé de ces quatre lettres.

a) Écris tous les anagrammes de ANNA.

AANN, ANAN, ANNA, NAAN, NANA, NNAA : 6 anagrammes.

b) Si les deux A et les deux N étaient discernables (A_1, A_2, N_1, N_2), combien y aurait-il de mots ? Le schéma regroupe ceux qui donnent le même anagramme : complète-le.

les 24 mots avec lettres discernables

$A_1N_1N_2A_2$	$A_1N_1A_2N_2$	$A_1A_2N_1N_2$	$N_1A_1N_2A_2$	$N_1A_1A_2N_2$	$N_1N_2A_1A_2$
$A_1N_2N_1A_2$	$A_1N_2A_2N_1$	$A_1A_2N_2N_1$	$N_1A_2N_2A_1$	$N_1A_2A_1N_2$	$N_1N_2A_2A_1$
$A_2N_1N_2A_1$	$A_2N_1A_1N_2$	$A_2A_1N_1N_2$	$N_2A_1N_1A_2$	$N_2A_1A_2N_1$	$N_2N_1A_1A_2$
$A_2N_2N_1A_1$	$A_2N_2A_1N_1$	$A_2A_1N_2N_1$	$N_2A_2N_1A_1$	$N_2A_2A_1N_1$	$N_2N_1A_2A_1$

$4! = 24$ mots. Chaque anagramme provient de $2! \cdot 2! = 4$ mots (on échange les A, on échange les N). Donc $\frac{24}{4} = 6$.

c) Autre méthode : choisis les places des deux A parmi les quatre places.

$C_4^2 = 6$; les N occupent les places restantes.

Propriété 1.6

Le nombre de façons de ranger en ligne n objets, dont k_1 sont identiques entre eux, k_2 identiques entre eux, ..., k_r identiques entre eux, vaut

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}.$$

Exemple 1.4 – URSULINES

Combien d'anagrammes du mot URSULINES ? On répond par deux méthodes.

Le mot compte 9 lettres, dont U deux fois et S deux fois.

Méthode 1. Par la propriété : $\frac{9!}{2! \cdot 2!} = \frac{362880}{4} = 90720$.

Méthode 2. On choisit les places des U ($C_9^2 = 36$), puis celles des S parmi les 7 places restantes ($C_7^2 = 21$), puis on range les 5 autres lettres, toutes différentes ($5! = 120$) : $36 \cdot 21 \cdot 120 = 90720$.

Les deux méthodes donnent le même nombre.

Exercice 1.14

Calculer | ★★☆☆ | A5

Combien d'anagrammes du mot MONS ? du mot BELGIQUE ? Parmi ces derniers, combien commencent par B ?

MONS : 4 lettres différentes, $4! = 24$. BELGIQUE : 8 lettres, dont E deux fois, $\frac{8!}{2!} = 20160$.

Commençant par B : on range les 7 autres lettres (E deux fois), $\frac{7!}{2!} = 2520$.

Exercice 1.15 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | A5

Combien d'anagrammes du mot MISSISSIPPI ? Réponds par deux méthodes.

11 lettres : M une fois, I quatre fois, S quatre fois, P deux fois. Méthode 1 : $\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = 34650$.

Méthode 2 : places des I, $C_{11}^4 = 330$; des S parmi les 7 restantes, $C_7^4 = 35$; des P parmi les 3 restantes, $C_3^2 = 3$; M à la dernière place : $330 \cdot 35 \cdot 3 = 34650$.

Exercice 1.16

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. Sur un quadrillage, on va du coin inférieur gauche au coin supérieur droit d'un rectangle de 4 cases sur 3, en ne se déplaçant que d'une case vers la droite (D) ou vers le haut (H). Combien de chemins sont possibles ?

Un chemin est un mot de 7 lettres contenant 4 D et 3 H. Il suffit de choisir les places des H : $C_7^3 = 35$ chemins.

1.6. Choisir une méthode

Situations de référence. On décrit un résultat, puis on se pose deux questions.

	L'ordre compte (suite)	L'ordre ne compte pas (groupe)
Répétition possible	n^p	hors programme
Sans répétition	A_n^p ; si $p = n : n!$	C_n^p

Objets identiques à ranger (anagrammes) : $\frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$. Plusieurs cas sans élément commun : on additionne. « Au moins un » : tout moins « aucun ».

Remarque 1.5

Erreurs fréquentes, à vérifier avant de rendre une réponse :

- *erreur d'ordre* : utiliser A_n^p pour des groupes, ou C_n^p pour des suites ;
- *erreur de répétition* : oublier qu'un élément peut revenir, ou l'autoriser à tort ;
- *erreur d'objets* : confondre ce que l'on choisit (les élèves ? les places ? les boîtes ?) ;
- *liste non organisée* : oublis ou doublons ; organiser par premier élément.

Exercice 1.17

Reconnaître | ★★☆☆ | C1

Pour chaque situation, dis si l'ordre compte, si la répétition est possible, et donne la formule qui compte les résultats.

a) Les trois premiers d'une course de 12 coureurs, dans l'ordre. b) Quatre livres à emporter en vacances parmi dix. c) Le code d'un cadenas à trois roues de chiffres (de 0 à 9). d) L'ordre de cinq livres sur une étagère.

a) Ordre, sans répétition : $A_{12}^3 = 1320$. b) Sans ordre, sans répétition : $C_{10}^4 = 210$. c) Ordre, répétition : $10^3 = 1000$. d) Permutation : $5! = 120$.

Exercice 1.18

Reconnaître | ★★☆☆ | C1

Sans calculer, associe à chaque situation la formule qui convient : 5^3 , A_5^3 , C_5^3 , C_6^3 .

a) Ranger 3 lettres différentes dans 5 boîtes, au plus une lettre par boîte. b) Choisir 3 élèves parmi 6 pour former l'équipe « rouge » ; les autres forment l'équipe « bleue ». c) Poster 3 lettres différentes, chacune dans l'une de 5 boîtes aux lettres (une boîte peut en recevoir plusieurs). d) Colorier en noir 3 cases d'une rangée de 5 cases.

a) $A_5^3 = 60$: on choisit, dans l'ordre des lettres, une boîte distincte pour chacune. b) $C_6^3 = 20$: un groupe de 3 élèves. c) $5^3 = 125$: chaque lettre a 5 choix, une boîte peut revenir. d) $C_5^3 = 10$: un groupe de 3 cases.

Exercice 1.19 ← △ à faire à la maison

Résoudre un problème | ★★☆☆ | T1

Six élèves, dont Alice et Bilal, se placent en ligne pour une photo. Combien de placements sont possibles ? Dans combien d'entre eux Alice et Bilal sont-ils côte à côte ?

Placements : $6! = 720$. Côte à côte : on considère le bloc « Alice et Bilal » comme un seul objet ; on range 5 objets, $5! = 120$ façons, puis on ordonne Alice et Bilal dans le bloc, 2 façons : $120 \cdot 2 = 240$.

2

Modéliser le hasard

Un phénomène est aléatoire quand on ne peut pas prévoir son résultat. On peut pourtant mesurer ses chances de deux façons : par l'expérience, en observant des fréquences, ou par un raisonnement, en posant un modèle.

2.1. Fréquences et probabilité

Activité 2.1 – la punaise

On lance une punaise : elle retombe pointe en haut ou sur le côté.


a) Peut-on prévoir, par un raisonnement, la chance qu'elle retombe pointe en haut ?

Non : la punaise n'est pas symétrique. Aucun argument ne permet d'affirmer que les deux résultats ont la même chance.

b) Chaque binôme lance 20 fois la punaise. On cumule les résultats de la classe et on calcule la fréquence relative : nombre de « pointe en haut » divisé par le nombre de lancers.

Lancers (cumul)	20	40	60	80	100	120	140
Pointe en haut (cumul)							
Fréquence relative							

c) Représente la fréquence relative en fonction du nombre de lancers. Que constates-tu ?



Les fréquences varient beaucoup au début, puis de moins en moins : elles se stabilisent autour d'une valeur.

d) On simule des lancers d'un dé équilibré au tableur avec la formule =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6), recopiée sur 1 000 lignes. Que suppose-t-on en simulant ainsi ? On suppose que les six faces ont la même chance (dé équilibré). La simulation reproduit ce modèle ; elle ne le démontre pas.

Sur le site du cours : simulation (lancers d'un dé) – fréquence du 6 quand on répète les lancers. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Définition 2.1 – probabilité *a posteriori*

Quand on répète un grand nombre de fois une expérience dans les mêmes conditions, la fréquence relative d'un résultat se stabilise autour d'un nombre : c'est la *probabilité* de ce résultat. La fréquence observée sur un grand nombre d'expériences en est une estimation, appelée probabilité *a posteriori*.

Exemple 2.1 – nés un 29 février

Au 1^{er} janvier 2019, la Belgique comptait 11 431 406 habitants, dont 7 145 avaient leur anniversaire le 29 février (Statbel).

a) Estimons la probabilité qu'un habitant choisi au hasard soit né un 29 février : $\frac{7145}{11431406} \approx 0,000625$, soit environ 0,0625 %.

b) Si les naissances étaient réparties uniformément sur les jours, cette probabilité vaudrait $\frac{1}{1461} \approx 0,000684$: sur 4 ans, il y a $4 \cdot 365 + 1 = 1461$ jours, dont un seul 29 février. Les données donnent un peu moins : le modèle « naissances uniformes » n'est qu'une approximation.

c) La proportion vaut 0,068 % en Hainaut et 0,053 % dans le Limbourg (Statbel). Ces seuls chiffres ne permettent pas d'expliquer l'écart ; ils montrent qu'une probabilité estimée dépend de la population observée.

2. Modéliser le hasard

Avec les données de la classe (activité 2.1), estime la probabilité qu'une punaise retombe pointe en haut. Pourquoi cette estimation est-elle plus fiable que celle d'un seul binôme ? On prend la fréquence relative sur l'ensemble des lancers de la classe. Elle repose sur beaucoup plus de lancers que celle d'un binôme ; or les fréquences se stabilisent quand le nombre de lancers augmente.

Exercice 2.2 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | A6

En Hainaut, 0,068 % des habitants sont nés un 29 février (Statbel, 2019). Parmi 10 000 Hennuyers choisis au hasard, combien peut-on s'attendre à en trouver ?
 $10\,000 \cdot 0,00068 = 6,8$: environ 7 personnes.

Exercice 2.3

Interpréter | ★★☆☆ | C2

Avec le simulateur du site, lance une pièce 10 fois, puis 100 fois, puis 1 000 fois, et note chaque fois la fréquence de « pile ». Recommence une deuxième série. Qu'observes-tu ? Quelle probabilité associes-tu à « pile » ?

Sur le site du cours : simulation (lancers d'une pièce). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Après 10 lancers, les fréquences des deux séries peuvent être très différentes ; après 1 000 lancers, elles sont proches l'une de l'autre et proches de 0,5 . On associe à « pile » la probabilité $\frac{1}{2}$, valeur autour de laquelle la fréquence se stabilise.

2.2. Univers et événements

Définition 2.2 — expérience aléatoire, issue, événement

- Une *expérience aléatoire* est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude.
- Chaque résultat possible est une *issue* (ou *épreuve*).
- L'ensemble de toutes les issues est l'*univers*, noté Ω . Le programme dit aussi *catégorie d'épreuves*.
- Un *événement* est une partie de Ω . Il est *réalisé* si l'issue obtenue lui appartient.

Exemple 2.2 — un dé

On lance un dé et on note le nombre obtenu : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'événement A « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$; l'événement B « obtenir au moins 5 » est $B = \{5, 6\}$.


En mots	Notation	Avec le dé
événement élémentaire	$\{\omega\}$	$\{3\}$
événement certain	Ω	« obtenir au plus 6 »

En mots	Notation	Avec le dé
événement impossible	$\emptyset$	« obtenir 7 »
contraire de A (non A)	$\overline{A}$	{1, 3, 5}
A et B	$A \cap B$	{6}
A ou B (au moins l'un des deux)	$A \cup B$	{2, 4, 5, 6}
A mais pas B	$A \setminus B$	{2, 4}
A et B disjoints (incompatibles)	$A \cap B = \emptyset$	{1} et B


Activité 2.2 – représenter des événements

Dans chaque diagramme, hachure la zone qui représente l'événement indiqué, puis traduis-le en mots pour le dé de l'exemple 2.2.


a) $A \cup B$




b) $A \cap B$



c) $A \setminus B$



d) $\overline{A}$



a) « obtenir un nombre pair ou au moins 5 » : {2, 4, 5, 6} . b) « obtenir un nombre pair et au moins 5 » : {6} . c) « obtenir un nombre pair, mais pas au moins 5 » : {2, 4} . d) « obtenir un nombre impair » : {1, 3, 5} .

Exercice 2.4

Reconnaître | ★★☆☆ | C3


On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Donne le nombre d'issues. Cite deux événements disjoints, un événement et son contraire, un événement certain et un événement impossible. $\# \Omega = 52$. Par exemple : « tirer un cœur » et « tirer un pique » sont disjoints ; « tirer une carte rouge » a pour contraire « tirer une carte noire » ; « tirer une carte » est certain ; « tirer le 11 de trèfle » est impossible.

Exercice 2.5

Représenter | ★★☆☆ | C4

On choisit un élève au hasard dans l'école. F : « l'élève fait du football » ; M : « l'élève fait de la musique ». Écris en mots les événements $F \cap M$, $F \cup M$, $M \setminus F$ et $\overline{F \cup M}$, puis hachure $M \setminus F$.

2. Modéliser le hasard




$F \cap M$: « l'élève fait du football et de la musique ». $F \cup M$: « l'élève fait du football ou de la musique (au moins l'un des deux) ». $M \setminus F$: « l'élève fait de la musique, mais pas de football ». $\overline{F \cup M}$: « l'élève ne fait ni football ni musique ».

Exercice 2.6 ← △ à faire à la maison

Représenter | ★★☆☆ | C4

On lance un dé. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au moins 3 » ; C : « obtenir 6 ».
Écris en extension $A \cap B$, $B \setminus A$, $\overline{B}$ et $A \cap \overline{C}$. Représente A , B , C dans un diagramme où chaque issue est placée dans sa zone.



$A \cap B = \{4, 6\}$; $B \setminus A = \{3, 5\}$; $\overline{B} = \{1, 2\}$; $A \cap \overline{C} = \{2, 4\}$. Dans le diagramme : 6 est dans les trois ensembles, 4 dans A et B , 2 dans A seulement, 3 et 5 dans B seulement, 1 hors des trois.

2.3. Le modèle d'équiprobabilité

Activité 2.3 — la somme de deux dés

Avant tout calcul. On lance deux dés et on additionne les deux nombres. Quelle somme est la plus probable ? Quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

Réponses de la classe.

On distingue les dés : un rouge et un blanc. Complète le tableau des sommes.

rouge \ blanc	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

- a) Combien de couples (rouge, blanc) ? Combien donnent 7 ?
 $6 \cdot 6 = 36$ couples, dont 6 donnent 7 : (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).
- b) Pourquoi la réponse « 1 chance sur 11 » est-elle fautive ?
 Les 36 couples ont la même chance si les dés sont équilibrés, mais pas les 11 sommes : 2 ne s'obtient que d'une façon, 7 de six façons. La probabilité d'obtenir 7 vaut $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Sur le site du cours : simulation (somme de 2 dés) — somme de deux dés. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Définition 2.3 — probabilité *a priori* (règle de Laplace)

Si l'on suppose que toutes les issues d'un univers fini Ω ont la même probabilité (*hypothèse d'équiprobabilité*), la probabilité d'un événement A vaut

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}.$$

Remarque 2.1

L'équiprobabilité est une *hypothèse de modélisation*. On la justifie (symétrie du dé, tirage « au hasard ») et on l'écrit dans la solution : « on suppose que... ». Elle porte sur des issues bien choisies : ici les 36 couples, pas les 11 sommes.

Exemple 2.3 — le problème du duc de Toscane

Avec trois dés, 9 et 10 s'obtiennent chacun de six façons si l'on ne tient pas compte de l'ordre. Pour 9 : 1+2+6, 1+3+5, 1+4+4, 2+2+5, 2+3+4, 3+3+3 ; pour 10 : 1+3+6, 1+4+5, 2+2+6, 2+3+5, 2+4+4, 3+3+4. Pourtant, les joueurs constataient que 10 sort plus souvent. Galilée l'a expliqué.

Avec des dés distingués, on suppose les $6^3 = 216$ suites équiprobables. Une somme sans ordre correspond à 6, 3 ou 1 suites selon que les trois nombres sont tous différents, deux égaux ou tous égaux.

- Pour 9 : $6 + 6 + 3 + 3 + 6 + 1 = 25$ suites, donc $P(9) = \frac{25}{216} \approx 0,116$.
- Pour 10 : $6 + 6 + 3 + 6 + 3 + 3 = 27$ suites, donc $P(10) = \frac{27}{216} = 0,125$.

10 est donc un peu plus probable que 9.

Sur le site du cours : simulation (somme de 3 dés) — somme de trois dés. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.7

Calculer | ★★☆☆ | A3

On lance deux dés équilibrés. Calcule la probabilité d'obtenir a) une somme d'au moins 10 ; b) un double ; c) au moins un 6.

On suppose les 36 couples équiprobables. a) (4, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6) : $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
 b) 6 doubles : $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. c) Aucun 6 : $5 \cdot 5 = 25$ couples, donc au moins un 6 : $36 - 25 = 11$ couples, $P = \frac{11}{36}$.

Exercice 2.8 ← à faire à la maison

Résoudre un problème | ★★☆☆ | T1


Une famille a trois enfants. On suppose qu'à chaque naissance, fille et garçon ont la même probabilité, indépendamment des autres naissances. Quelle est la probabilité d'avoir exactement deux garçons ? Pourquoi la réponse $\frac{1}{8}$ (« 3, 2, 1 ou 0 garçon ») est-elle fausse ?
 Issues équiprobables : les 8 suites GGG, GGF, GFG, FGG, GFF, FGF, FFG, FFF. Deux garçons : GGF, GFG, FGG, donc $P = \frac{3}{8}$. Les quatre compositions ne sont pas équiprobables : elles correspondent à 1, 3, 3 et 1 suites.

2.4. Propriétés des probabilités

Activité 2.4 — probabilité d'une réunion

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au moins 4 ».

a) Écris A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$ en extension, et place les issues dans le diagramme.



$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$, $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$.

b) Compare $P(A \cup B)$ et $P(A) + P(B)$. D'où vient la différence ?

$P(A \cup B) = \frac{4}{6}$ et $P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6}$. Les issues 4 et 6 sont comptées deux fois ; par le principe additif (propriété 1.2), $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$.

c) Que vaut $P(\overline{A})$?

$\overline{A} = \{1, 3, 5\}$: $P(\overline{A}) = \frac{3}{6} = 1 - P(A)$.

Propriété 2.1 — propriétés des probabilités

Pour tous événements A et B :

- $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$;
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$;
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si A et B sont disjoints, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Remarque 2.2

Ces propriétés viennent d'être obtenues en comptant, sous l'hypothèse d'équiprobabilité. Elles sont aussi vraies pour les fréquences, donc pour les probabilités *a posteriori* : on les admet pour toute probabilité.

« **Au moins un** ». Pour calculer la probabilité de « au moins un... », on passe souvent par le contraire « aucun... » : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$.

Exemple 2.4 — les paris du chevalier de Méré

Le chevalier de Méré pensait que ces deux paris étaient favorables (probabilité de gagner supérieure à $\frac{1}{2}$) : obtenir au moins un 6 en lançant 4 fois un dé ; obtenir au moins un double six en lançant 24 fois deux dés. Pascal en discuta avec Fermat.

Premier pari. Une issue est une suite de 4 résultats : on suppose les $6^4 = 1296$ suites équiprobables. Contraire « aucun 6 » : $5^4 = 625$ suites. $P = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} \approx 0,518$: le pari est favorable.

Second pari. Une issue est une suite de 24 couples : $\#\Omega = 36^{24}$. Contraire « aucun double six » : 35^{24} suites. $P = 1 - \frac{35^{24}}{36^{24}} \approx 0,491$: le pari est défavorable.


Sur le site du cours : simulation (4 lancers de un dé) — premier pari de Méré. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Sur le site du cours : simulation (24 lancers de deux dés) — second pari de Méré. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.9

Calculer | ★★☆☆ | A2

On sait que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,1$. Complète le diagramme avec la probabilité de chaque zone, puis calcule $P(A \cup B)$ et la probabilité que ni A ni B ne soit réalisé.



Zones : A seulement $0,5 - 0,1 = 0,4$; B seulement $0,4 - 0,1 = 0,3$. $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,1 = 0,8$. « Ni A ni B » est le contraire de $A \cup B$: $1 - 0,8 = 0,2$.

Exercice 2.10 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | C5

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. C : « tirer un cœur » ; R : « tirer un roi ». C et R sont-ils disjoints ? Calcule $P(C \cup R)$ et $P(\overline{C})$.

On suppose les 52 cartes équiprobables. $C \cap R = \{\text{roi de cœur}\}$: C et R ne sont pas disjoints.
 $P(C \cup R) = \frac{13}{52} + \frac{4}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$. $P(\overline{C}) = 1 - \frac{13}{52} = \frac{3}{4}$.

2.5. Dénombrer pour calculer

Exemple 2.5 – Lotto

Au Lotto, on coche une grille de 6 numéros parmi 45 ; 6 numéros sont tirés. Calculons la probabilité a) de cocher les 6 bons numéros ; b) d'en cocher exactement 3.

Une issue est le groupe des 6 numéros tirés : $\#\Omega = C_{45}^6 = 8\,145\,060$ tirages, que l'on suppose équiprobables.

a) Un seul tirage est favorable : $P = \frac{1}{8\,145\,060}$.

b) On choisit 3 numéros parmi les 6 cochés et 3 parmi les 39 non cochés : $C_6^3 \cdot C_{39}^3 = 20 \cdot 9139 = 182\,780$ tirages favorables. $P = \frac{182\,780}{8\,145\,060} \approx 0,0224$, environ une chance sur 45.

Sur le site du cours : simulation (nombre de bons numéros au Lotto) – nombre de bons numéros d'une grille. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exemple 2.6 – anniversaires

Dans une classe de 25 élèves, quelle est la probabilité qu'au moins deux élèves aient le même anniversaire ? On suppose les 365 jours équiprobables et on ignore le 29 février.

Une issue est la suite des 25 anniversaires : $\#\Omega = 365^{25}$. Contraire « tous différents » : A_{365}^{25} suites. $P = 1 - \frac{A_{365}^{25}}{365^{25}} \approx 0,569$. C'est plus d'une chance sur deux.

Sur le site du cours : simulation (anniversaires dans un groupe de 25 personnes) – classe de 25 élèves. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.11

Calculer | ★★☆☆ | A3

Au Lotto (6 numéros tirés parmi 45), quelle est la probabilité que le numéro 7 soit tiré ?
 On suppose les C_{45}^6 tirages équiprobables. Tirages contenant le 7 : on choisit les 5 autres numéros parmi 44, C_{44}^5 . $P = \frac{C_{44}^5}{C_{45}^6} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

Exercice 2.12 ← à faire à la maison

Calculer | ★★☆☆ | T1

Reprends le problème des anniversaires pour une classe de 20 élèves.
 On suppose les 365 jours équiprobables. $P = 1 - \frac{A_{365}^{20}}{365^{20}} \approx 0,411$.

Exercice 2.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. Un comité de 5 personnes est tiré au sort parmi 8 filles et 6 garçons. Quelle est la probabilité qu'il compte exactement 3 filles ?

Une issue est un groupe de 5 personnes parmi 14 : $C_{14}^5 = 2002$ groupes, supposés équiprobables. Groupes de 3 filles et 2 garçons : $C_8^3 \cdot C_6^2 = 56 \cdot 15 = 840$ (exercice 1.12). $P = \frac{840}{2002} \approx 0,420$.

Exercice 2.14

Interpréter | ★★☆☆ | T2

Jouer 1-2-3-4-5-6 au Lotto, est-ce moins probable que de jouer une autre grille ?

Non. Si le tirage se fait au hasard, les C_{45}^6 tirages sont équiprobables : chaque grille a la même probabilité, $\frac{1}{8\,145\,060}$.

3

Probabilité conditionnelle et indépendance

Une information peut changer une probabilité. La question à se poser devient : *parmi* quels cas calcule-t-on la proportion ?

3.1. Probabilité conditionnelle

Activité 3.1 — le Titanic

Le tableau donne le nombre de personnes à bord du Titanic selon la classe et la survie (Dawson, 1995, d'après l'enquête officielle britannique de 1912).

	Survivants	Décédés	Total
1 ^{re} classe	203	122	325
2 ^e classe	118	167	285
3 ^e classe	178	528	706
Équipage	212	673	885
Total	711	1 490	2 201

On choisit au hasard une personne parmi les 2 201. On note S : « elle a survécu » et C : « elle voyageait en 1^{re} classe ».

a) Calcule $P(S)$.

$$P(S) = \frac{711}{2201} \approx 0,323.$$

b) Parmi les passagers de 1^{re} classe, quelle proportion a survécu ?

$$\frac{203}{325} \approx 0,625.$$

c) Parmi les survivants, quelle proportion voyageait en 1^{re} classe ?

$$\frac{203}{711} \approx 0,286.$$

d) Les réponses b) et c) ont le même numérateur. Qu'est-ce qui change ?

La population de référence : les 325 passagers de 1^{re} classe en b), les 711 survivants en c).

e) Écris la réponse b) comme quotient de deux probabilités calculées sur les 2 201 personnes.


$$\frac{203}{325} = \frac{203/2201}{325/2201} = \frac{P(S \cap C)}{P(C)}.$$

Définition 3.1 – probabilité conditionnelle

Soit B un événement tel que $P(B) \neq 0$. La probabilité de A sachant B est

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Sous l'hypothèse d'équiprobabilité, $P(A | B) = \frac{\#(A \cap B)}{\#B}$: on remplace l'univers Ω par B .



Sachant B , seules comptent les issues de B (zone hachurée) ; parmi elles, celles de A sont dans $A \cap B$.

Lire une probabilité conditionnelle. « Parmi les B , quelle proportion de A ? » se note $P(A | B)$. On écrit toujours l'événement en mots avant le symbole. Beaucoup de manuels notent aussi $P_B(A)$.

Remarque 3.1

En général, $P(A | B) \neq P(B | A)$. Au Titanic, $P(S | C) \approx 0,625$ alors que $P(C | S) \approx 0,286$.

Exercice 3.1

Calculer | ★★★ | A1

Au Titanic, on note E : « faire partie de l'équipage ». Écris en mots, puis calcule $P(S | E)$ et $P(E | S)$.

$P(S | E)$: parmi les membres d'équipage, proportion de survivants, $\frac{212}{885} \approx 0,240$. $P(E | S)$: parmi les survivants, proportion de membres d'équipage, $\frac{212}{711} \approx 0,298$.

Exercice 3.2 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★★★ | A2


Au Titanic, on note D : « voyager en 2^e classe ». Calcule $P(D)$, $P(S | D)$ et $P(D | S)$. Quelle probabilité répond à la question « un survivant choisi au hasard voyageait-il probablement en 2^e classe ? » ?

$P(D) = \frac{285}{2201} \approx 0,129$; $P(S | D) = \frac{118}{285} \approx 0,414$; $P(D | S) = \frac{118}{711} \approx 0,166$. La question porte sur les survivants : c'est $P(D | S)$; un survivant voyageait rarement en 2^e classe.


3.2. Arbres de probabilités

Activité 3.2 — des effectifs aux probabilités

On ne distingue plus que la 1^{re} classe (C) et les autres personnes ($\bar{C}$). Voici l'arbre des effectifs.



On divise chaque effectif par celui du nœud dont il part : les branches portent des probabilités. Complète l'arbre.



a) Que représente la fraction $\frac{203}{325}$?

$P(S | C)$: la probabilité de survivre sachant qu'on voyageait en 1^{re} classe.

b) Calcule $\frac{325}{2201} \cdot \frac{203}{325}$. Que retrouve-t-on ?

$\frac{203}{2201} = P(C \cap S)$: le produit le long du chemin donne la probabilité de l'intersection.

c) Comment obtenir $P(S)$ à partir de l'arbre ?

En additionnant les chemins qui mènent à S : $\frac{203}{2201} + \frac{508}{2201} = \frac{711}{2201}$.

Propriété 3.1 — calculer sur un arbre


- Sur une branche issue d'un nœud B , on écrit une probabilité sachant B . Les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1.
- La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches : $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$.
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent :

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B}).$$

Exercice 3.3

Calculer | ★★☆☆ | A2

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire une boule, on ne la remet pas, puis on en tire une deuxième. Complète l'arbre, puis calcule la probabilité de tirer deux boules rouges et celle que la deuxième boule soit rouge.



On suppose que chaque boule a la même chance d'être tirée. $P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.
 $P(R_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

Exercice 3.4 ← ⚠ à faire à la maison

Calculer | ★★★ | A3

Même urne, mais on remet la première boule avant de tirer la deuxième. Construis l'arbre et calcule la probabilité de tirer deux boules de la même couleur.

Avec remise, les branches du deuxième niveau portent $\frac{3}{5}$ (rouge) et $\frac{2}{5}$ (bleue) quel que soit le premier tirage. $P(\text{même couleur}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{25} + \frac{4}{25} = \frac{13}{25}$.

3.3. Lire un test de dépistage

Activité 3.3 – un test positif

Ce problème a été posé à 160 gynécologues lors d'une formation (Gigerenzer et al., 2007) :

On pratique un dépistage du cancer du sein par mammographie dans une région. Pour les femmes de cette région, on sait que la probabilité d'avoir un cancer du sein est de 1 %. Si une femme a un cancer, la probabilité que sa mammographie soit positive est de 90 %. Si elle n'en a pas, la probabilité que sa mammographie soit quand même positive est de 9 %. Une femme a une mammographie positive. Quelle est la meilleure réponse ?


- A. La probabilité qu'elle ait un cancer est d'environ 81 %.
- B. Sur 10 femmes dont la mammographie est positive, environ 9 ont un cancer.
- C. Sur 10 femmes dont la mammographie est positive, environ 1 a un cancer.
- D. La probabilité qu'elle ait un cancer est d'environ 1 %.

a) Choisis une réponse sans calculer.

Réponse de chacun.

b) Complète l'arbre des effectifs pour 1 000 femmes.

3. Probabilité conditionnelle et indépendance




c) Parmi les femmes positives, quelle proportion a un cancer ?

$9 + 89 = 98$ femmes sont positives, dont 9 ont un cancer : $\frac{9}{98} \approx 0,092$, soit environ 9 %. La meilleure réponse est C : sur 10 femmes positives, environ 1 a un cancer. Seuls 21 % des gynécologues l'ont choisie avant la formation.

d) Pourquoi cette probabilité est-elle si faible ?

La maladie est rare (1 %) : les femmes positives sans cancer, prises parmi 990 femmes non malades (89), sont bien plus nombreuses que les femmes positives avec un cancer (9).

Pour lire la probabilité « à l'envers », on regroupe les mêmes quatre cases selon le résultat du test : c'est l'arbre double.



En remontant depuis le nœud « 98 positives », on lit $P(\text{cancer} \mid \text{positive}) = \frac{9}{98}$; en descendant depuis « 10 malades », on lit $P(\text{positive} \mid \text{cancer}) = \frac{9}{10}$.

Remarque 3.2

Même calcul avec des probabilités. M : « avoir un cancer » ; T : « test positif ». $P(M \cap T) = 0,01 \cdot 0,9 = 0,009$; $P(T) = 0,009 + 0,99 \cdot 0,09 = 0,0981$; $P(M \mid T) = \frac{0,009}{0,0981} \approx 0,092$. Les effectifs rendent ce calcul lisible.

Exercice 3.5

Calculer | ★★☆☆ | A3

On reprend le dépistage avec une proportion de 10 % de femmes malades (mêmes pourcentages de tests positifs). Construis l'arbre des effectifs pour 1 000 femmes et calcule $P(M \mid T)$.
 Sur 1 000 femmes : 100 malades, dont $100 \cdot 0,9 = 90$ positives ; 900 non malades, dont $900 \cdot 0,09 = 81$ positives. $P(M \mid T) = \frac{90}{90+81} = \frac{90}{171} \approx 0,526$.

Exercice 3.6 ← △ à faire à la maison

Interpréter | ★★☆☆ | T2

Un article affirme : « ce test est fiable à 90 % ». Quelles informations manque-t-il pour savoir ce que signifie un résultat positif ?

Il manque la proportion de malades dans la population testée et la proportion de tests positifs chez les non-malades. $P(M | T)$ en dépend fortement : environ 9 % pour 1 % de malades, environ 53 % pour 10 % (activité 3.3 et exercice 3.5).

3.4. Indépendance🔍 **Activité 3.4 – une information change-t-elle la probabilité ?**

a) Au Titanic, compare $P(S)$ et $P(S | C)$. Savoir qu'une personne voyageait en 1^{re} classe change-t-il la probabilité qu'elle ait survécu ?

$P(S) \approx 0,323$ et $P(S | C) \approx 0,625$: oui, fortement.

b) On lance un dé rouge et un dé blanc. A : « le rouge donne 6 » ; B : « le blanc donne 6 ». Compare $P(A)$ et $P(A | B)$.

On suppose les 36 couples équiprobables. $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(A | B) = \frac{\#(A \cap B)}{\#B} = \frac{1}{6}$. Savoir que B est réalisé ne change rien.

c) Dans ce dernier cas, compare $P(A \cap B)$ et $P(A) \cdot P(B)$.

$P(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = P(A) \cdot P(B)$.

Définition 3.2 – événements indépendants

Deux événements A et B sont *indépendants* si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Sinon, ils sont *dépendants*.


Propriété 3.2

Si $P(B) \neq 0$: A et B sont indépendants $\iff P(A | B) = P(A)$.

Démonstration. $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ vaut $P(A)$ si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. ■

Remarque 3.3

Indépendants ne veut pas dire disjoints. Avec un dé, « obtenir 1 » et « obtenir 6 » sont disjoints : $P(\{1\} \cap \{6\}) = 0$, alors que $P(\{1\}) \cdot P(\{6\}) = \frac{1}{36}$. Ils sont donc *dépendants* : savoir qu'on a obtenu 6 rend « obtenir 1 » impossible.



3. Probabilité conditionnelle et indépendance

Remarque 3.4

L'erreur du joueur. À la roulette, après cinq « rouge » consécutifs, « noir » n'est pas plus probable : les tirages successifs sont indépendants.

Exemple 3.1 — retour au chevalier de Méré

Les 4 lancers d'un dé sont indépendants : $P(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$. On retrouve le résultat obtenu en comptant (exemple 2.4).

Exercice 3.7

Calculer | ★☆☆ | A4

On lance un dé rouge et un dé blanc. A : « la somme vaut 7 » ; B : « le rouge donne 6 » ; D : « la somme vaut 12 ». A et B sont-ils indépendants ? D et B ?

On suppose les 36 couples équiprobables. $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{6}$, $A \cap B = \{(6, 1)\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{36} = P(A) \cdot P(B)$, donc A et B sont indépendants. $P(D) = \frac{1}{36}$, $D \cap B = \{(6, 6)\}$: $P(D \cap B) = \frac{1}{36} \neq \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{6}$, donc D et B sont dépendants.

Exercice 3.8

Calculer | ★☆☆ | A4

Au Titanic, les événements S et C sont-ils indépendants ?

$P(S \cap C) = \frac{203}{2201} \approx 0,092$ et $P(S) \cdot P(C) = \frac{711}{2201} \cdot \frac{325}{2201} \approx 0,048$. Ces deux nombres sont différents : S et C sont dépendants.

Exercice 3.9 ← △ à faire à la maison

Calculer | ★☆☆ | A4

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. C : « tirer un cœur » ; R : « tirer un roi ». C et R sont-ils indépendants ? Sont-ils disjoints ?

On suppose les 52 cartes équiprobables. $P(C \cap R) = \frac{1}{52}$ et $P(C) \cdot P(R) = \frac{13}{52} \cdot \frac{4}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{52}$: C et R sont indépendants. Ils ne sont pas disjoints : le roi de cœur est dans les deux.

Exercice 3.10

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. On reprend l'urne de l'exercice 3.3 (3 rouges, 2 bleues, deux tirages sans remise). Les événements R_1 : « la première boule est rouge » et R_2 : « la deuxième boule est rouge » sont-ils indépendants ? Et avec remise ?

Sans remise : $P(R_2) = \frac{3}{5}$ (exercice 3.3) et $P(R_2 | R_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{5}$: dépendants. Avec remise : $P(R_2 | R_1) = \frac{3}{5} = P(R_2)$: indépendants.

3.5. Pour aller plus loin

Ces activités se font si le temps le permet (voir le plan du cours).

Activité 3.5 – le problème de Monty Hall


Dans un jeu télévisé, une voiture est cachée derrière l'une de trois portes, des chèvres derrière les deux autres. Le joueur choisit une porte. Le présentateur, qui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, derrière laquelle se trouve une chèvre, puis propose au joueur de changer de porte.

a) Vaut-il mieux garder sa porte ou changer ? Réponds d'abord sans calculer, puis simule un grand nombre de parties.

Sur le site du cours : simulation (jeu de Monty Hall). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

La simulation montre qu'en changeant, on gagne environ deux fois sur trois.

b) Explique ce résultat par un arbre.



Au premier choix, le joueur désigne la voiture avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et une chèvre avec la probabilité $\frac{2}{3}$. S'il a choisi une chèvre, le présentateur ouvre l'autre porte à chèvre et changer mène à la voiture. $P(\text{gagner en changeant}) = \frac{2}{3}$; $P(\text{gagner en gardant}) = \frac{1}{3}$. La simulation estime ce résultat dans un modèle ; l'arbre le démontre.

Activité 3.6 – jeux à gratter : gain moyen

Selon une analyse publiée par la RTBF (13/12/2024, F. Vrans, UCLouvain), un billet Subito à 10 € rapporte en moyenne 7,28 € de gains.

a) Que signifie « en moyenne » ? Estime le total des gains pour 1 000 billets achetés. Sur un grand nombre de billets, le total des gains divisé par le nombre de billets est proche de 7,28 €. Pour 1 000 billets (10 000 € de mises), les gains totaux sont d'environ $1000 \cdot 7,28 = 7280$ €.

b) Quel est le gain net moyen par billet ? En pourcentage de la mise ? $7,28 - 10 = -2,72$ € par billet, soit $-27,2\%$ de la mise : le joueur perd en moyenne un peu plus du quart de ce qu'il mise.

Exercice 3.11

Résoudre un problème | ★★★ | T1

À l'EuroMillions, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 « étoiles » parmi 12 (La finance pour tous, 23/07/2026). Calcule la probabilité de trouver les 5 numéros et les 2 étoiles, et compare-la à celle du gros lot du Lotto.

On suppose les tirages équiprobables. Grilles : $C_{50}^5 \cdot C_{12}^2 = 2\,118\,760 \cdot 66 = 139\,838\,160$, donc $P = \frac{1}{139\,838\,160}$. Au Lotto, $P = \frac{1}{8\,145\,060}$: le gros lot de l'EuroMillions est environ 17 fois moins probable.

3.6. Sources des données

Dawson, R. J. M. (1995). The « unusual episode » data revisited. *Journal of Statistics Education*, 3(3).

Gigerenzer, G., Gaissmaier, W., Kurz-Milcke, E., Schwartz, L. M., & Woloshin, S. (2007). Helping doctors and patients make sense of health statistics. *Psychological Science in the Public Interest*, 8(2), 53-96.

La finance pour tous (23/07/2026). Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ?

RTBF (21/12/2020). Les nouvelles plaques d'immatriculation débutant par 2 seront sur les routes fin janvier.

RTBF (13/12/2024). Lotto ou jeux à gratter : ce que les probabilités nous disent vraiment (analyse de F. Vrms, UCLouvain).

Statbel. Naissances et fécondité (personnes nées un 29 février, au 1^{er} janvier 2019).

Statbel. Au 1^{er} janvier 2019, la Belgique comptait 11 431 406 habitants.