


りょうし 量子コンピューターの ふしぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA^2 で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

きょう 今日のゴール：ブロックをならべると「消える／へんしん 変身する」を見つけよう



キュービット君

この自由研究でやること

- QA^2 であそぶ
- ブロック=命令の動きを観察する
- 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐ QA^2

☐ このプリント

☐ えんぴつ


☐ いろえんぴつ

なまえ

がくねん くみ
学年・組

■ キュービット君と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



キュービット君

- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に **+** をわたすと…… **xじく** を中心にくるっと回転！ (→南極) もう一回 **+** をわたすと…… また **xじく** で回って **元に戻った**！



- 5 元に戻った = **+** を2回わたす意味がない。だから **++** のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。 **++** = **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA² で **+** を2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

かんさつ 観察メモ よそう 予想： ☐ 消える ☐ 消えない

けっか 結果： _____

き 気づいたこと：

■ ブロック（量子ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわるじくとまわる量のちがいを、よく観察しよう。

まずは半周のブロック



X ブロック



xじくのまわりを半周



は+マーク。xじくで半周するよ。



Y ブロック



yじくのまわりを半周

yじくで半周。と、まわる向きがちがうんだ。



Z ブロック



zじくのまわりを半周

たてのzじくで半周。北極・南極は動かないよ。

ななめに半周



H ブロック



ななめじくのまわりを半周

xじくとzじくのまん中のななめじくで半周。

小さい回転



S ブロック



zじくのまわりを4分の1周

zじくを4分の1周。2つあつまるとに変身！



T ブロック




zじくのまわりを8分の1周

zじくを8分の1周。2つでに変身！

■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？


かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。ぜんぶ消えるときは「消える」とかこう。

X² Xが2こ  → ここに書く 消える ↑ 書き方の例	はんしゅう (180°) x じく ・ 半周 (180°)  さいしよの向き のあと のあと やじるしがもとどおりだから消える
Y² Yが2こ  → ここに書く ?	はんしゅう (180°) y じく ・ 半周 (180°)  さいしよの向き のあと のあと
Z² Zが2こ  → ここに書く ?	はんしゅう (180°) z じく ・ 半周 (180°)  さいしよの向き のあと のあと
H² Hが2こ  → ここに書く ?	はんしゅう (180°) ななめじく ・ 半周 (180°)  さいしよの向き のあと のあと
S² Sが2こ  → ここに書く ?	よんぶんのいっしゅう (90°) z じく ・ 4分の1周 (90°)  さいしよの向き のあと のあと
T² Tが2こ  → ここに書く ?	はちぶんのいっしゅう (45°) z じく ・ 8分の1周 (45°)  さいしよの向き のあと のあと


■ **H** ではさむと、まん中が変身する

そと 外がわの **H** 2つがき えて、まん 中のブロックがべつ へのブロックにへんしん するよ。まえ 前のページとおな 同様にかんが 考えよう。


HXH H・X・H



HZH H・Z・H



HYH H・Y・H



ようそう・きづいたこと

H ではさむと **+** は ____ になる

H ではさむと **Z** は ____ になる


H ではさむと **Y** は ____ になる

そのほか きづいたこと：


■ S ・ T ではさむと？

おな 同じように、そと 外がわの2つではさんでかんさつしよう。ぜんぶ消えることもあるよ。前のページと同じように考えよう。


SXS S・X・S



SYS S・Y・S




SZS S・Z・S





■ T ではさんでみよう

TST T・S・T



■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つの道（レーン）をいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると、はなれた2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



ながいあみだくじをつくってマッチさせると、QA²では高くてん！いろんなつながかたをためして、いままでの消えるマッチをSWAPごしにそろえてみよう。

みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：_____

使ったSWAP：____こ

きづいたこと：



なまえ _____


ひづけ _____

■ この教材の背景（おとなの方へ）

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。