متى ترضعين طفلك ؟

عند الولادة ... اطلبي حمل طفلك مباشرة بعد الولادة (خلال الساعة الأولى) وملامسة جلده بجلدك، إن ذلك سيهدئ من روع الطفل، وسيعمل على تنظيم تنفسه ويبقيه دافئًا.

إن ملامسة الجلد بالجلد ستسمح للبكتيريا النافعة بالانتقال من جلدك إلى طفلك وستمنع إصابته بالبكتيريا الضارة.

يعد هذا الوقت هو الأنسب للبدء في الرضاعة الطبيعية، حيث سيكون طفلك متيقظًا ومتنبهًا ويرغب في الرضاعة. يمكنك طلب المساعدة من الطبيبة أو القابلة.



بعد الولادة القيصرية أو الولادة الصعبة ... فور استعادتك للوعي وقدرتك على احتضان الطفل، اطلبي حمله بحيث يلامس جلده جلدك و ابدئي في إرضاعه. إن واجهت صعوبة اطلبي المساعدة. أما إذا لم تتمكني من إرضاعه لوجود الطفل في وحدة العناية المركزة مثلًا، قومي بشفط الحليب بأسرع وقت ممكن (خلال الساعتين الأولى من الولادة).



بعد خروجك من المستشفى قللي من تناول الأدوية المسكنة (ما عدا الباراسيتامول) حيث إن بعضها قد تقلل من إنتاج الحليب.

خلال الأربع و العشرين ساعة الأولى من بعد الولادة...

غالبًا ينام الطفل خلال اليوم الأول لساعات طويلة مما يجعله يرضع قليلًا، وهذا أمر طبيعي.
إذا طالت مدة نومه (أكثر من ثلاث ساعات) حاولي إيقاظه بـالطرائق الآتية :

- نزع ملابسه.
- حمله بحيث يكون جلده ملامساً لجلدك.
- اعرضي عليه الثدي باستمرار.

ستكون سعادة طفلك أكبر في حال أبقيتِه إلى جانبك وأرضعتِه كلما أبدى رغبته في الرضاعة، إن هذا سيحفز جسمك على إدرار كميات أكبر من الحليب.

في البداية تكون معدة طفلك صغيرة جدًا (بحجم حبة الكرز) لذا فهي بحاجة لكمية قليلة من حليبك بشكل متكرر. قد تصل عدد الرضعات التي يرضعها بعض الأطفال إلى 15 مرة يوميًا. قومي بإرضاعه حسب الفترة الزمنية التي يحتاجها ولا تختصريها .

بعد اليوم الأول من الولادة ... سيبدأ طفلك بالاستيقاظ أكثر في اليوم الثاني، أرضعيه حسب طلبه (على الأقل 8 – 12 مرة) خلال الأربع والعشرين ساعة.

سعة معدة الطفل



يمر الأطفال بفترات نمو مفاجئة (غالباً في الأسبوع الثاني أو الثالث ثم في الأسبوعين السادس والثاني عشر و الشهر الثالث وعلى الشهر السادس) وتستغرق عدة أيام في كل مرة، قد تزداد رغبتهم في الرضاعة خلال هذه الفترة أكثر من العادة، لذلك من المهم مراعاة الإرضاع عند الطلب.

رضاعة أكثر = إنتاج حليب أكثر