فوائد شفط الحليب :

- عند احتقان الثدي بشكل غير مريح اشفطي حتى الإحساس بالراحة
- لزيادة إنتاج الحليب.
- في حالة عدم مص الطفل للثدي بشكل جيد وحاجته للمزيد من حليبك.
- لتوفير الحليب للطفل عند غياب الأم كالمرض أو العمل أو أي سبب آخر ، كما أن الشفط يساعد على استمرارية إنتاج الحليب.
- لتغذية الطفل الخديج أو المولود قليل الوزن أو الطفل المريض

معلومات مهمة حول شفط الحليب :



- من الضروري غسل اليدين جيداً قبل شفط الحليب.
- قومي بغسل أدوات الشفط والعبوات المستخدمة بالماء الساخن والصابون ثم شطفها جيداً (تحتاج العبوات للتعقيم) .
- استعملي عبوات صغيرة الحجم (50 – 80 ملل) لحفظ الحليب المشفوط، وذلك لتسهيل تدفئته أو تذويبه، ولتجنب خسارة رمي المتبقى في العبوة.
- يمكنك شفط الحليب باليد أو بواسطة شفاط يدوي أو كهربائي (تتوفر هذه الأجهزة لدى جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية).

- لا تقومي بملء العبوة بالحليب حيث إن السوائل تتمدد بالتجميد.

- عند الإنتهاء من عملية الشفط، قومي بتغطية العبوة ودوني عليها تاريخ الشفط ثم احفظيها في الثلاجة.



- تأكدي من وضع عبوة الحليب المشفوط في العمق وليس في باب الثلاجة أو المجمدة (الفريزر) لتجنب تعرض الحليب لحرارة هواء الغرفة.

- يمكنك إضافة الحليب المشفوط حديثاً لحليب آخر مشفوط في نفس اليوم ومحفوظ في الثلاجة، ولكن عليك تبريده في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل الإضافة.

- تجنبي إرضاع الطفل حديث الولادة بواسطة قنينة الرضاعة لتلافي تعرضه لإلتباس الحلمات، كما يمكنك إعطاء الطفل الحليب المشفوط باستخدام الكوب أو الملعقة.

عملية شفط الحليب غير مؤلمة، إذا أحسست بالألم اطلبي المساعدة من أصدقاء الرضاعة الطبيعية.

كيف تشفطين الحليب ؟

قبل البدء بالشفط ، من المفيد تحفيز إدرار الحليب لتسهيل عملية الشفط.

لتحفيز إدرار الحليب، يمكنك:

- الاسترخاء والتفكير في طفلك أو النظر إلى صورته.
- تدفئة الثديين باستخدم كمادات دافئة أو أخذ حمام دافيء.
- تدليك الثدي كاملاً برفق وبحركات دائرية صغيرة.
- المسح بكف اليد مع الضغط برفق على الثدي باتجاه الحلمة .

من المفيد تعلم كيفية شفط الحليب باليد، (حتى لو كنت تستخدمين جهازاً لشفط الحليب).

عند الشفط باليد :

- ابدئي بالانحناء قليلاً إلى الأمام مع توجيه الحلمة ناحية وعاء تجميع الحليب.
- ضعي يدك تحت ثديك مع جعل إصبع الإبهام فوق الثدي على بعد 3 – 4 سم من الحلمة.



- يكون إصبع السبابة والإبهام متقابلين، بحيث يشكلان الحرف C (نصف دائرة) حول الثدي .
- اضغطي بيدك للداخل باتجاه القفص الصدري.
- اضغطي بإصبعي السبابة و الإبهام لعصر الحليب من قنوات الحليب إلى الخارج ثم أوقفي الضغط، أعيدي ما سبق مرة تلو أخرى بشكل متناغم..
- قد يمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الحليب بالتدفق.
- عندما تقل سرعة تدفق الحليب، أديري الإبهام والسبابة لعصر الحليب من قنوات أخرى.
- تأكدي من عصر الحليب من جميع القنوات.



الخطوة 1 2 3 4

(صور الثدي هي لأغراض توضيحية وتعليمية)

تخزين الحليب المشفوط *

المكان	درجة الحرارة (سيليزي)	مدة الحفظ
بالتبريد		
الغرفة	C ° 32 - ° 25 C ° 24 - ° 20 C ° 19 - ° 16	حتى أربع ساعات حتى ست ساعات حتى ثماني ساعات
حقيبة التبريد مع 3 قوالب ثلج	C ° 15 – ° 4	يوم واحد
البراد (الثلاجة)	C ° 4 – ° 0	من ثلاثة إلى خمسة أيام
الرف العلوي المغلق من الثلاجة ذات الباب الواحد	متغير	حتى أسبوعين
بالتجميد		
المجمدة (الفريزر)	C ° 18-	من ثلاثة إلى ستة أشهر
مجمدة مستقلة	C ° 20 -	من ستة أشهر إلى سنة
الحليب الذائب (المجمد سابقًا)		
المذوب في الثلاجة	C ° 4 – ° 0	يوم واحد في الثلاجة
تحت الماء الجاري	فاتر	استخدامه خلال ساعة واحدة



* References
http://kellymom.com
http://www.nhmrc.gov.au
http://www.cdc.gov/breastfeeding
http://www.nhs.uk

كيفية إذابة وتدفئة الحليب المحفوظ:

• تأكدي من تاريخ الشفط قبل استعمال العبوة، استخدمي التاريخ القديم أولاً.

• قومي بإذابة الحليب المجمد ببطء في الثلاجة (تستغرق 12 ساعة تقريباً) أو سريعاً بوضعه تحت الماء الفاترالجاري.

• **لتدفئة الحليب**، ضعي عبوة الحليب تحت الماء الفاتر الجاري أو بداخل إناء به ماء دافئ مع مراعاة عدم ملامسة غطاء العبوة للماء.

• ينفصل حليب الأم عند التخزين، حيث تطفو القشدة على السطح، حركي الزجاجة بلطف بشكل دائري لمزج الطبقات قبل تدفئته.

• لا تستخدمي "الميكروويف" أبداً لتسخين الحليب؛ لأنه يسخن الحليب بطريقة غير متساوية قد تحرق الطفل، كما أن التسخين الزائد يقضي على القيمة الغذائية للحليب.

• دائماً قومي باختبار حرارة الحليب على رسغ يدك من الداخل قبل إعطائه لطفلك (يجب أن يكون الحليب دافئاً وليس ساخناً).



تجنبي إعادة تجميد الحليب مرة أخرى

مساوئ عدم إرضاع الطفل طبيعيًا

الأطفال الذين لم يتم إرضاعهم طبيعياً يكونون أكثر عرضة للاصابة بـالأمراض التالية :

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)

نمو الفك بشكل غير طبيعي

التهابات المعوية (الإسهال)



سرطان دم الأطفال (اللوكيميا)

الالتهابات البولية

حساسية الجلد

الربو

التهابات الصدر

البدانة

التهابات الأذن

السكري

تدني مستوى الذكاء

رائحة البراز الكريهة

أعراض أخرى مثل المغص، الغازات، الإمساك

رضعة صناعية واحدة فقط قد تضر، قد تسبب الحساسية وستغير من البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء.

الأمهات اللاتي لا يرضعن أطفالهن طبيعيًا يكنّ أكثر عرضة للإصابة بـ:

• النزيف بعد الولادة : تعمل الرضاعة الطبيعية على انكماش الرحم وإعادته إلى حجمه الطبيعي قبل الحمل.

• البدانة : تعود الأم التي ترضع طبيعياً إلى وزنها الطبيعي أسرع من الأمهات اللاتي لا يرضعن طبيعياً، وذلك باستخدام الدهون التي تم تخزينها خلال فترة الحمل، حيث تستهلك الرضاعة الطبيعية ما يقارب 500 - 700 سعرة حرارية في اليوم.

• سرطان الثدي.
• سرطان المبيض.
• هشاشة العظام.
• السكري.



تبدأ فوائد الرضاعة الطبيعية منذ الرضعة الأولى.
وكلما أرضعت لفترة أطول كانت الفوائد أكبر.