

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRƯỜNG ĐỨC
Phòng khám Mắt

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA THUỐC ATROPIN 0,5%

Atropin 0,5% là thuốc có tác dụng làm liệt điều tiết, giúp xác định chính xác tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị).

Số lần tra: Tra 2 mắt Atropin 0,5% . Tra 1 lần 1 ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ trong 5 ngày liên tục, sau đó khám lại.

Cách tra: Vành mi dưới, tra một giọt thuốc vào mắt, lấy bông thấm hết thuốc tràn ra ngoài mí mắt rồi dùng bông chèn vào điểm lệ ở góc trong của mắt khoảng 2 phút để bông thấm hết thuốc thừa, tránh tác dụng phụ không mong muốn của thuốc.

Lưu ý:

- Thuốc có tác dụng làm liệt điều tiết và giãn đồng tử nên sau tra thuốc, khi nhìn gần mắt sẽ bị mờ và lóa mắt. Khoảng 2 tuần sau các hiện tượng nói trên sẽ hết.
- Nếu sau khi tra thuốc có hiện tượng như: sốt, đỏ mắt, khô họng, tim đập nhanh cần uống thêm nhiều nước, ngừng tra thuốc và hỏi ý kiến bác sỹ.
- **ĐỀ NGHỊ ĐẾN KHÁM LẠI ĐÚNG HẸN VÀ TRẢ LẠI THUỐC CÒN THỪA CHO BỆNH VIỆN.**